

- 18(1) Abdomen plus ou moins roux ;
- 19(40) Hanches postérieures noires, du moins à la base ;
- 20(29) Abdomen noir, n'ayant de roux que la marge des segments ;
- 21(24) Aréole plus ou moins pédiculée ;
- 22(23) Face postérieure du métathorax striée transversalement 11. **infumata**, 370.
- 23(22) Face du métathorax pleine et sans stries transversales. 22. **dubitata**, 787.
- 24(21) Aréole sessile ;
- 25(26) Tarière presque aussi longue que l'abdomen. 9. **sessilis**, 370.
- 26(25) Tarière courte, moins du quart de l'abdomen ;
- 27(28) Thorax court et trapu, aréole triangulaire 10. **marginata**, 370.
- 28(27) Thorax allongé, linéaire ; aréole pentagonale 25. **brevicauda**, *n. sp.*
- 29(20) Abdomen avec un ou plusieurs segments roux ;
- 30(37) Jambes postérieures sans petit anneau blanc à la base ;
- 31(32) Toutes les hanches noires. 21. **nigricoxa**, 786.
- 32(33) Les 4 hanches antérieures rousses ou jaunes ;
- 33(34) Cuisses postérieures noires ; métathorax excavé et strié transversalement en arrière ♂ 26. **crassicornis**, *n. sp.*
- 34(33) Cuisses postérieures rousses ; métathorax non excavé ;
- 35(36) Aréole pédiculée 15. **fusiformis**, 371.
- 36(35) Aréole sessile 27. **compacta**.
- 37(30) Jambes postérieures avec un petit anneau blanc à la base ;
- 38(39) Thorax allongé ; métathorax sans aréole centrale distincte. 16. **flaviricta**, 362.
- 39(38) Thorax assez court et trapu ; métathorax avec une aréole conique ; antennes souvent roussâtres à l'extrémité 13. **dentata**, 373.

40(

41(

42(

43(

44(

45(

46(

47(5

48(4

49(4

50(4

51(4

52(5

53(5

54 4

n. sp.

dibu

avec

corp

très

sa fa

desec

culéc

même

antér

large

- 40(19) Hanches postérieures rousses ;
 41(54) Face noire ;
 42(45) Jambes postérieures noires avec un anneau blanc au milieu ;
 43(44) Le scape noir ; toutes les hanches rousses 23. *distincta*, 787
 44(43) Le scape jaune en dessous : les 4 hanches antérieures blanches 13. *flavipes*, 371.
 45(42) Jambes postérieures rousses, sans anneau blanc ;
 46 51) Toutes les hanches rousses ;
 47(50) Tarière du quart de l'abdomen environ ; aréole petite, droite ;
 48(49) Abdomen en massue ; aréole à peine pédiculée 12. *clavata*, 371.
 49(48) Abdomen allongé, linéaire ; aréole très petite, très longuement pédiculée 17. *ruficoxa*, 372.
 50(47) Tarière à peine sortante ; aréole petite, oblique 18. *pallipes*, 372.
 51(46) Les 4 hanches antérieures jaunes ou blanches ;
 52(53) Abdomen noir à segments marginés de roux 14. *basilaris*, 371.
 53(52) Abdomen roux, n'étant que peu ou point taché de noir 28. *pilosula*, *n. sp.*
 54 41) Face blanche 20. *sericea*, 373.

24. *Limnérie de Guignard* — *Limneria Guignardi*, *n. sp.*

♀ — Long. 32 pœ. Noire avec les pattes rousses. Les mandibules, les palpes, les écailles alaires, les 2 hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Antennes plus courtes que le corps, leur scape roussâtre en dessous. Thorax court, robuste, très finement ponctué, le métathorax à lignes soulevées distinctes, sa face postérieure striée transversalement. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures et le stigma, noir, l'aréole petite, pédiculée, en parallélogramme oblique. Pattes d'un beau roux de même que leurs hanches excepté les antérieures ; les 4 jambes antérieure blanches en avant, les postérieures noires avec un large anneau blanc au milieu et un autre plus petit à la

base, leurs cuisses terminées par un petit anneau noir, leurs tarses noir avec le premier article blanc à la base. Abdomen fort, médiocrement comprimé, entièrement noir, tarière à peine sortante.

♂—Avec les 4 hanches antérieures blanches, le scape des antennes aussi blanc en dessous. Ottawa.

Nous dédions avec plaisir cette jolie espèce à M. J. A. Guignard; zélé intomologiste d'Ottawa, qui l'a obtenue ♂ et ♀ de chenilles de *Notodonta concinna*.

25. Limnérie à-queue-courte. *Limneria brevicauda*, n. sp.

♀—Long. .20 pcc. Noire variée de roussâtre. Les mandibules, les palpes, les écailles alaires avec un point en avant, les 4 hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Antennes assez longues, filiformes. Métathorax à lignes soulevées distinctes, couvert inférieurement, de même que la face, d'une pubescence blanche. Le thorax court, trapu. Ailes hyalines, les nervures noires, l'aréole petite, sessile, pentagonale. Pattes d'un roux brunâtre sale, les hanches postérieures noires, leurs jambes et leurs tarses, plus ou moins obscur, les premières plus pâles au milieu. Abdomen en massue comprimée à l'extrémité, les segments 2 et 3 marginés de roux au sommet; tarière à peine sortante.—Ottawa (Guignard).

Bien reconnaissable par sa petite aréole pentagonale et sessile.

26. Limnérie à-cornes-épaisses. *Limneria crassicornis*, n. sp.

♂—Long. .35 pcc. Noire avec l'abdomen plus ou moins roux, la face avec le métathorax et le bas des flancs, avec pubescence blanche. Les mandibules, les palpes, avec les 4 hanches antérieures et leurs trochanters, jaune pâle. Métathorax excavé et strié transversalement. Ailes hyalines, les nervures noires, le stigma très étroit, à peine distinct, l'aréole triangulaire, grande, distinctement pédiculée, les écailles alaires noires. Pattes d'un roux pâle, les postérieures noires. Abdomen en massue comprimée à l'extrémité, à pédicule long et grêle, noir avec les segments 3, 4 et 5 roux.—CapRouge.

Espèce d'un faciès tout particulier; ♀ encore inconnue.

27
—Can.

♀

Les ma
teunes f
avant, l
triangu
à la bas
avec un
Tarière
ment.—

Se

28

♀

Les ma
tache ex
ters, bl
cence, r
flancs d
corps, l
le méta
Ailes hy
ment p
rieures,
tarses n
cule, le
tarière

♂

pattes a

Se

roux, et

12

La

♀

des ant

l'abdom

27. Limnérie compacte. *Limneria compacta*, Prov.
—Can. Ent. XVII, 116.

♀ — Long. .23 pcc. Noire avec les pattes et l'abdomen roux. Les mandibules, les palpes, avec les écailles alaires, blanc. Antennes filiformes. Thorax court et trapu, le mésothorax gibbeux en avant, le métathorax déclive. Ailes légèrement enfumées, à aréole triangulaire sessile. Pattes rousses, les hanches postérieures noires à la base en dedans. Abdomen formant une petite massue allongée avec un pédicule long et grêle, noir à la base et à l'extrémité. Tarière du quart de l'abdomen environ, recourbée supérieurement. — Vancouver (Taylor).

Se distingue surtout de la *ruficoxa* par son aréole sessile.

28. Limnérie poilue. *Limneria pilosula*, nov. sp.

♀ — Long. .30 pcc. Noire avec les pattes et l'abdomen roux. Les mandibules, les palpes, les écailles alaires avec une double tache en avant, et les 4 hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Face à pubescence argentée courte, la même pubescence, mais beaucoup plus longue, se montrant aussi sur les flans du métathorax. Antennes filiformes, de la longueur du corps, le scape plus ou moins blanc en dessous. Thorax robuste, le métathorax déclive, ponctué, ses côtés munis de poils blancs. Ailes hyalines, les nervures noires, aréole triangulaire, brièvement pédiculée. Pattes rousses, y compris les hanches postérieures, les jambes de cette dernière paire brunâtres et leurs tarses noirs. Abdomen roux, noir seulement à la base du pédicule, les segments terminaux formant une massue fusiforme; tarière à peine du quart de l'abdomen, ses valves noires.

♂ — Semblable à la ♀, avec le scape blanc en dessous et les pattes antérieures plus pâles. — Ottawa, Cap Rouge.

Se distingue de la *ruficoxa* par son abdomen entièrement roux, et du *pallipes* par ses tarses postérieurs noirs.

12. Limneria clavata, Prov. p. 371.

La description donnée est celle du ♂, ci-suit celle de la ♀.

♀ — Abdomen en massue, le sommet des segments 2 et 3 et des autres plus ou moins, roux. Tarière redressée, de la moitié de l'abdomen environ. — Cap Rouge.