

### Anhang.

Verzeichniss der auf der zweiten Reise nach Kleinasien (1897) gesammelten Ameisen, mit einer Neubeschreibung von Prof. Dr. C. Emery, Bologna.

*Camponotus maculatus* subsp. *sylvaticus* Ol. (Uebergang zu *dichrous* Forel.) Biledjik, subsp. *dichrous* var. *Baldacri* Em. Biledjik, subsp. *Oertzeni* Forel. var. *Escherichi* Em. v. nov. ♀ pechbraun, bei kleineren Exemplaren der Thorax etwas heller, die Fühler und Beine hellroth; L. ♀ max. 8 mm., ♀ min.  $4\frac{1}{2}$ —5 mm.

Erinnert durch die Farbe an subsp. *aethiops* v. *concava* For., während die Grösse und die Thoraxform sie mit *Oertzeni* näher verbinden. Diese neue Varietät vervollständigt, wie Forel bemerkt, den durch var. *andria* ange-deuteten Uebergang von *Oertzeni* zu *aethiops*. — Permato, Biledjik.

*Camponotus maculatus* subsp. *aethiops* var. *concava* Forel. (Brussa), *lateralis* Ol. (Brussa).

*Formica gagates* Latr. (Brussa), *fusca* var. *rufobaroides* For. (Permata).

*Lasius alienus* Först. Brussa, Biledjik etc. *flavus* Fbr.

*Tapinoma erraticum* Latr. (Brussa).

*Plagiolepis pygmaea* Latr. (Brussa).

*Myrmecocystus viaticus* Fb. (Brussa).

*Leptothorax unifasciatus* Ltr. (Brussa).

*Tetramorium caespitum* L. (forma typ.) (Brussa), subsp. *punicum* For. (Brussa), subsp. *semilaeve* André (Brussa). Uebergänge zwischen *punicum* und *semilaeve*.

*Messor structor* Latr., *barbarus* var. *sordida* For. und Uebergänge zu var. *meridionalis* And. (Biledjik).

*Aphaenogaster subterranea* Latr. (Brussa), *testaceopilosa* Luc. (Brussa).

*Pheidole pallidula* Nyl. (Brussa, Biledjik).

*Crematogaster sordidula* var. *Flachi* For. (Eskishehir).

*Solenopsis fugax* Ltr. (Eskishehir).