

202

Sur les Chrysidides de la région de Mendoza,
appartenant à M. Esben Petersen,

par
R. du Buysson.

Monsieur Esben Petersen m'a communiqué un lot de Chrysidides, (P. Jørgensen leg.) provenant des environs de Mendoza, dans la République argentine. Leur étude m'a procuré le plaisir de trouver le mâle de la *Chrysis Charruana* Brèthes qui était inconnu et de revoir l'*Hedychrum discoidale* Buyss. découvert dans le même pays par M. A. C. Jensen-Haarup. Voisi la liste de tout ce qui m'a été soumis.

Notozus Gayi Spin. — Pedregal, XII, 1906.

Holophris iridescens Norton. — Chacras de Coria, II et VII 1907.

Holopyga Boutheryi Brèthes. — Pedregal, XI et XII 1906.

Hedychrum discoidale Buyss. — Pedregal, XII 1906 et I 1907.

Chrysogona Saussurei Mocs. — Pedregal, XI et XII 1906.

Dichrysis Taschenbergi Mocs. ♂ ♀. — Pedregal, XI et XII 1906; Chacras de Coria, II et III 1907.

Trichrysis mucronata Brullé. — Chacras de Coria, XII 1906 et II 1907.

Trichrysis punctatissima Spin. — Potrevillas, I, 1907; Pedregal, XI et XII 1906; Punta del Agua, 1906.

Trichrysis lagopus Buyss. — Pedregal, XI et XII 1906 et Chacras de Coria, II 1907.

Trichrysis lagopus var. *ancilla* Buyss. — Pedregal, XII, 1906.

Trichrysis morosa Buyss. ♂ ♀. — Pedregal, XI et XII, 1906.

Trichrysis distinctissima Dahlb. ♂ ♀. — Pedregal, XI et XII 1906; Chacras de Coria, III 1907; Potrevillas, I 1907.

Trichrysis Charruana Brèthes ♂. — Pedregal, 31 X 1906. Le mâle resté inconnu, est semblable à la femelle, mais avec le 3e tergite abdominal assez différent: les trois émarginaturas sont subégales, celle du milieu un peu plus profonde, mais non pas triangulaire ni particulièrement profonde comme chez la ♀, les côtés du segment sont arqués-arrondis régulièrement jusqu'aux dents externes qui sont précédées d'un sinus. Le ventre est recouvert de gros poils blancs, tres épais sur le 3e segment. Long. 7 mill.

Trichrysis gibba Brullé. — Pedregal, XI et XII 1906.

Hexachrysis lateralis Brullé. — Pedregal, XI et XII 1906.