

Материалъ по мирмекологической фаунѣ Кавказа и Крыма.

М. РУЗСКАГО.

Ueber die Ameisenfauna des Kaukasus und der Krim.

М. РУЗСКУ.

Мирмекологическая фауна Кавказа изучена мало. Отрывочные сведения о некоторыхъ представителяхъ ея имѣются въ трудахъ Майра¹⁾, Смита, Андрэ²⁾ и въ одной изъ моихъ работъ, напечатанной въ трудахъ Казанск. Общ. Естеств.³⁾. Наиболѣе полный списокъ кавказскихъ муравьевъ былъ данъ проф. Н. В. Насоновымъ въ его работе о муравьяхъ Россіи⁴⁾. Тамъ для Кавказа названный авторъ указываетъ всего 43 формы муравьевъ. Работа Н. В. Насонова опубликована была въ 1889 г. и съ тѣхъ поръ никакихъ сообщеній о кавказскихъ муравьяхъ въ печати не появлялось. Это обстоятельство побудило меня заняться изслѣдованіемъ мирмекологиче-

¹⁾ G. Mayr, Beitrag zur Ameisenfauna Russland's, 1859; Die europäischae Formiciden, 1861; Путешествіе въ Туркестанъ Федченко. Зоог. изсл. ч. V. Муравьи, 1877. Formiciden aus Tibet. T. P. Э. О. т. XXIV.

²⁾ Egn. André. Species des Formicides d'Europe, 1881—82.

³⁾ См. тр. Казанск. Общ. Ест., т. XXVIII, вып. 5. 1895.

⁴⁾ Изв. И. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этн. Моск. Унив., т. LVIII, вып. 1 1889.

ской фауны Кавказа во время моихъ двухъ поездокъ туда, произведенныхъ въ 1899 и 1900 годахъ по порученію Кавказскаго Общества Естествоиспытателей. Первая поездка имѣла въ общихъ чертахъ слѣдующій маршрутъ: 1) г. Петровскъ — Темиръ-Ханъ-Шура — Гунибъ; 2) Т. Х. Шура — Чиръ-Юртъ — Владикавказъ; 3) Изъ Владикавказа я проѣхалъ степью паралельно подножію Кавказскаго хребта на ст. Ардонскую, затѣмъ на Алагиръ, а оттуда по Военно-осетинской дорогѣ, слѣдуя теченію р.р. Ардона и Риона до Кутаиса, пересѣкъ главный кавказскій хребетъ по Мамисонскому перевалу близъ ледника г. Адай-Хохъ на выс. 10.000 ф. (вершина горы Адай-Хохъ достигаетъ 15,000 ф.); 4) Изъ Кутаиса черезъ Аджаро-Тріалетскій хребетъ по Зекарскому перевалу я проѣхалъ въ Абастуманъ, далѣе мой путь шелъ на Ахалцыхъ, Боржомъ, Тифлісъ, Баку, Дербентъ и Астрахань.

Въ 1900 г. я изъ Царицына отправился въ г. Пятигорскъ, откуда черезъ Владикавказъ въ Тифлісъ, перѣѣхавъ вторично главный хребетъ по Военно-грузинской дорогѣ. Проживъ въ Тифлісѣ довольно долго съ цѣлью изученія фауны его окрестностей (Коджоры, оз. Лисье, Авчалы, Мцхетъ, Манглісъ и др.¹), я затѣмъ проѣхалъ въ Батумъ, а оттуда въ г. Новороссійскъ, посѣтивъ на пути нѣкоторые пункты Черноморскаго побережья (Поти, Н. Аѳонъ, Туапсе); изъ Новороссійска черезъ Крымъ вернулся въ Симбирскъ, а затѣмъ въ Казань.

Собранная мной во время этихъ экскурсій коллекція муравьевъ была затѣмъ значительно пополнена благодаря любезной помощи К. А. Сатунина, Г. А. Кожевникова, В. А. Караваева и нѣкоторыхъ другихъ лицъ. Особенно цѣннымъ для меня было содѣйствіе г. Сатунина, доставившаго мнѣ коллекцію муравьевъ изъ такихъ мѣстностей Кавказа, которыхъ мнѣ посѣтить не удалось (Елизаветпольск. губ., Талышъ, Ленкорань, Араксъ, окр. оз. Гокчи, Аралыхъ и подножія Бол. и Мал. Ааратовъ, юго-восточ. Дагестанъ, горн. луга ок. Казбека и др.). Благодаря г. Кожевникову, прив.-доц. Московск.

¹) Нѣсколько экскурсій тамъ было сдѣлано мной совмѣстно съ К. А. Сатунинымъ, которому приношу глубокую благодарность за дружескую помощь, имъ мнѣ оказанную при собираніи зоологического матеріала.

Унив., я имѣлъ возможность получить муравьевъ изъ разныхъ пунктовъ Кавказа (Кисловодскъ, Кубанская обл., Тифлисъ, Манглизъ, Ленкоранскій у., Новороссійскъ, Кубинск. у. и др.), собранныхъ какъ имъ самимъ, такъ и другими лицами (А. Завадскій, С. Захаровъ, Н. А. Горбачевъ, баронъ О. В. Розенъ, Н. В. Воронковъ). О. А. Караваевъ, прив.-доц. Киевскаго Унив., прислалъ мнѣ муравьевъ, собранныхъ имъ около Кисловодска, Тифлиса и Мцхетъ. Затѣмъ я получилъ еще небольшіе сборы муравьевъ отъ г. Крживоблоцкаго (Араксъ и Муганская степь), отъ проф. Г. П. Кириллова (Квишхеты, Горійск. у. Тифл. губ.) и отъ Т. П. Гордѣева (Геленджикъ).

Мирмекофауна Крыма изслѣдована еще менѣе, чѣмъ Кавказа. Н. В. Насоновъ въ выщечитированной своей работе приводитъ для Крыма всего только 17 формъ. Нужно еще замѣтить, что какъ относительно крымскихъ муравьевъ, такъ и кавказскихъ, намъ ничего не было известно ни о распределеніи ихъ, ни о характерѣ мѣстообитанія. Въ систематическомъ отношеніи большинство формъ также или вовсе не изучены, или изучены недостаточно.

Кромѣ своихъ очень небольшихъ сборовъ, я имѣю изъ Крыма муравьевъ отъ А. И. Смирнскаго, Н. Л. Трубникова, В. А. Караваева, П. И. Александрова, Г. А. Кожевникова, В. Муралевича¹⁾, В. Н. Радакова и отъ прив.-доц. Казанск. Унив. Е. П. Головина.

Всѣмъ поименованнымъ лицамъ, доставившимъ мнѣ матеріаль по мирмекологической фаунѣ Кавказа и Крыма, выражая искреннюю благодарность.

Имѣя въ виду въ недалекомъ будущемъ изложить подробнѣ результаы своихъ мирмекологическихъ изслѣдований Кавказа и Крыма, я въ предлагаемомъ краткомъ отчетѣ Казанскому Обществу Естествоиспытателей ограничиваюсь только сообщеніемъ списка найденныхъ формъ кавказскихъ и крымскихъ муравьевъ, число которыхъ въ настоящее время достигаетъ 119.

При обозначеніи мѣстонахожденій той или другой формы я привожу фамилію лица, которымъ она была найдена;

¹⁾ Муравьи, собранные В. Муралевичемъ, получены мной отъ Г. А. Кожевникова, и какъ и кавказскіе, присланные имъ-же, принадлежать Зоологическому музею Московскаго Университета.

у тѣхъ-же формъ, которыхъ я самъ лично наблюдалъ и до-
былъ, я ставлю восклицательный знакъ и притомъ—или
одинъ (!), когда данная форма въ указанной мѣстности рѣдка
и наблюдалась только однажды, или два (!!), когда она встрѣ-
чалась неоднократно и можетъ быть признана обычновенной.

20. IX. 1902. Казань.

Fam. Formicarii.

1. Subf. Camponotini For.

1. *Camponotii.*

1. *Camponotus herculeanus*, Lin.

Кавказъ: Ленкорань (Насоновъ¹⁾); Терская обл., поясъ сосны ок. ф. Св. Николая (!! 1899); елово—пихтов. лѣсъ южн. склона главн. хребта (!! 1899); Зекарскій перевалъ, поясъ березы (!! 1899); Абастуманъ (!! 1899); Кубанская обл.. Теберда сосн. б., (баронъ Розенъ, 1900); Черноморск. окр., между Балаганнымъ и Красною Поляною, на перевалѣ (баронъ Розенъ, 1900). Обыкновененъ въ поясъ хвойныхъ лѣсовъ главнаго хребта; рѣже попадался въ борахъ Закавказья.

2. *Camp. ligniperdus*, Latr.

Кавказъ: Терская обл., окр. Владикавказа (! 1899); Боржомъ (! 99); Новороссійскъ (! 1900). Упоминается также Н. В. Насоновымъ, но безъ указанія мѣстонахожденія (loc. cit., стр. 10). Рѣдокъ. Болѣе пріуроченъ къ лиственнымъ лѣсамъ.

3. *Campon. vagus*, Scop.

Кавказъ: окр. Сухума, Тифлисъ (Насоновъ); Понтійская обл., Они, Кутаисъ (!! 1899); Нов. Аeonъ, Туапсе, Новорос-

¹⁾ Н. В. Насоновъ, Энтомологич. изслѣдованія, 1892 г. Къ фаунѣ муравьевъ Россіи, стр. 12.

сійскъ (!! 1900); Квишхеты (Кирилловъ, 1898); Кубанская обл., стан. Псебайская (бар. Розенъ). Тифлисъ (! 1899). Живеть въ лиственныхъ лѣсахъ долинъ и склоновъ.

Крымъ: Феодосія (! 1900).

4. *Camp. maculatus, F. subsp. aethiops, Latr.*

Кавказъ: Кутаисъ (Насоновъ); Дагестанъ, Терская обл., ф. Св. Николая на сѣв. склонѣ главн. хребта. (!! 1899); Понтійская область, Кутаисъ (!! 1899), Батумъ (!! 1900), Абастуманъ, Ахалцыхъ, Боржомъ, Тифлисъ и окр. (!! 1899 и 1900); Нов. Аeonъ, Туапсе (!! 1900); Манглизъ (! 1900; С. Захаровъ, 1901); Пятигорскъ и окр. (!! 1900); Кубанская обл. (бар. Розенъ), Квишхеты (Кирилловъ); Тифлисъ, садъ Муштаидъ (К. Сатунинъ); Эриванск. губ., Джеватск. у. Бакинск. губ. (Сатунинъ, 1894); Пасанауръ, Коби (онъ-же, 1901); Царскіе колодцы, Сигнахск. у. (онъ-же, 1901); Джебраилъ (онъ-же, 94); Кахетія (онъ-же, 1893); Лагодехи, Кусары Кубинск. у., Закатальск. окр. с. Кахъ, Муганская степь (А. Завадский); Геленджикъ (Т. Гордѣевъ, 1902); Новороссійскъ (Завадский); между Майкопомъ и Сочи (бар. Розенъ). Очень обыкновененъ на Кавказѣ. Достигаетъ предѣла сосны на главн. хребтѣ. Крылатыя особи въ VI и VII.

Крымъ: Феодосія (! 1900); Старый Крымъ и Колонія Герценбергъ (Муралевичъ); Алушта (Головинъ); Севастополь (Смиренскій); Яйла надъ Магарацемъ, 2000 ф. (Караваевъ).

Тоже весьма обыкновененъ. Раньше еще былъ указанъ Ниландеромъ и Майромъ и Форелемъ, но безъ указанія точного мѣстонахожденія. Крылатыхъ В. А. Караваевъ нашелъ въ маѣ.

— var. *concavus, For.* *Кавказъ*: Абастуманъ, Ликаны, Ахалцыхъ (!! 1899); Батумъ (! 1900). *Крымъ*: Феодосія (!).

— var. *silvatico-aethiops, For.* *Крымъ*: Алушта (Головинъ). Указанъ былъ также Форелемъ¹⁾. *Кавказъ*: Кутаисъ (!! 1899).

¹⁾ A. Forel, Etudes myrmecologiques en 1886. Ann. d. la Soc. Entom. de Belgique, tome XXX, p. 150.

5. *Camp. maculatus*, F. subsp. *silvaticus*, Ol.

Кавказъ: Чаква, бл. Батума (! 1900). *Крымъ*: окр. Севастополя (Насоновъ).

— var. *silvaticoides*, For. *Кавказъ*. Найденъ мной въ ок. Туапсе въ 1900 г. Гнѣздался въ норахъ подъ камнемъ, на берегу моря.

6. *Camp. marginatus*, Latr.

Кавказъ. Найденъ мной въ Тифлисѣ (въ саду Муштаидь) на орѣхѣ; крылат. ♂—въ концѣ июля 1900 г. Указанъ также Н. В. Насоновымъ безъ точнаго обозначенія мѣстности.

Вѣроятно водится и въ Крыму.

7. *Camp. lateralis*, Ol.

Кавказъ: Мцхетъ, крыл. ♂ и ♀—VII. 1899 (!!); Нов. Аeonъ (! 1900). Н. В. Насоновымъ указанъ для *Крыма* (окр. Ялты).

— var. *atricolor*, Nyl. Эта разновидность обыкновенна на *Кавказѣ*, особенно въ Дагестанѣ (!! 1899) и въ Закавказье (!! 1899 и 1900; Сатунинъ, 1898 и 1900); Кубанская обл. (бар. Розенъ); Новороссийскъ (Завадскій); въ окрестностяхъ Тифлиса даже многочисленъ (оз. Лисье, Авчалы), где его наблюдали я и К. А. Сатунинъ. Крылатыхъ ♂ и ♀ я наблюдалъ 10. VII. 1899 г. ок. Они, Кутаисск. губ. Любить места сухія, каменистые, степного характера.

Въ *Крыму* найденъ ок. Стар. Крыма (Муралевичъ) и Севастополя (Смиренскій); также указанъ А. Форелемъ (loc. cit., p. 208).

— var. *merula*, Losana.

Кавказъ: Абастуманъ (! 1899); Квишхеты (Кирилловъ). *Крымъ*: Феодосія (! 1900).

8. Camp. (*Colobopsis*) *truncatus*, Spin.

Кавказъ: Нов. Аeonъ (! 1900); Тифлисъ, садъ Муштаидъ (Сатунинъ, 1901); Сочи, Черноморск. губ. (Завадский).

Крымъ: окр. Магарача (Караваевъ, 1896). Н. В. Насоновъ нашелъ его ок. Мухалатки на южн. берегу. Въ лѣсахъ.

9. Camp. *interjectus*, Mayr.

Кавказъ: Дагестанъ (! 1899). До сихъ поръ былъ извѣстенъ только въ Туркестанѣ.

2. *Formicini*.

10. *Polyergus rufescens*, Latr.

На *Кавказѣ* муравей-амазонка обыкновененъ въ Дагестанѣ (Темиръ. Х. Шура, хреб. Атлы-Буюнъ, Гунибъ !! 1899). Въ Закавказье я нашелъ его ок. Манглиза (! 1900). Живеть вмѣстѣ съ *Formica fusca*, но чаще *rufibarbis*. Лиственные лѣса по склонамъ горъ. Сосновые боры. Вообще для Кавказа указанъ Н. В. Насоновымъ.

11. *Mutmecocystus cursor*, Fonsc. var. *caspius*, Ruzsky.

Кавказъ: Дагестанъ (!! 1899. крыл. ♂—27. VI; К. Сатунинъ); Алагиръ (!!); окр. Тифлиса, Мцхетъ (!!); Ставропольск. губ. (Сатунинъ); Муганская степь и Араксъ (Крживоблоцкий); Пятигорскъ, Машукъ (!! 1900); Кубанская обл. (бар. Розенъ); Муравъ—Дагъ, предгор. (Сатунинъ); Сальяны, окр. Гокчи, Нов. Балзетъ, Аралыхъ, Сардаръ-Булакъ ок. Арапатъ (Сатунинъ); Карская обл. (Сатунинъ); Ленкоранск. у. (Завадский). На Кавказѣ указанъ былъ Майромъ и Насоновымъ.

Степи и предгорія сѣвернаго Кавказа, область горныхъ степей Дагестана и Арmenіи; Муганская степь. Въ горахъ по безлѣснымъ плоскогоріямъ, склонамъ и вершинамъ горъ поднимается до высоты 7,000—8,000 ф.

Въ Крыму найдемъ ок. Севастополя (Насоновъ); Феодосия (! 1900; Муралевичъ).

12. *Myrmecosyst. viaticus*, F. subsp. *setipes*, For.

Указанъ для Кавказа (Майръ, Насоновъ) и Крыма (Майръ). Я находилъ его въ окр. Тифлиса и Баку. Доставленъ былъ мнѣ изъ различныхъ пунктовъ Закавказья (Сатунинъ, Крживоблоцкій, Караваевъ, Завадскій, Горбачевъ и Воронковъ). Крылатыя особи я находилъ 23. VII (Авчалы !!); Сатунинъ добылъ ихъ изъ гнѣзда 25. VI (окр. Тифлиса).

Распространенъ только въ Закавказье. Держится въ безлѣсныхъ или покрытыхъ кустарникомъ, сильно каменистыхъ мѣстностяхъ; въ рѣчныхъ долинахъ и на ихъ склонахъ; въ песчаныхъ степяхъ, нерѣдко среди зарослей тамарика и *Cal-ligonum*. Въ горахъ доходитъ до 6000 ф. (Муравъ - Дагъ). Повидимому ограничивается областью Куры и Аракса.

Самцы и самки этой формы не описаны. Самцы рыжаго или красновато-желтаго цв., иногда съ болѣе темнымъ коричневатымъ оттенкомъ; грудь снизу черноватая и нерѣдко съ черными пятнами на бокахъ, на среднеспинкѣ и щитикѣ. *Hypopygium* на заднемъ концѣ снабженъ двумя по бокамъ зубцами, между которыми лежитъ острозакругленная лопасть, иногда съ небольшой выемкой на концѣ. Голова и грудь тонко морщинистыя съ рѣдкимъ, мелкимъ пунктиромъ и съ отстоящими длинными рѣдкими волосками. Прилегающіе волоски на груди блѣдоватые. Брюшко съ оч. тонкой поперечной морщинистостью, слабо блестящее. Голова и thorax матовые. Ножки черноватые. Крылья съ буроватымъ оттенкомъ и съ темно-коричневыми жилками. Чешуйка толстая, низкая, не широкая и сверху закругленная.

Самки окрашены какъ рабочіе. Брюшко у нихъ довольно блестящее. Отстоящіе волоски рѣдки. Чешуйка относительно высокая, къ вершинѣ суженная на бокахъ, съ задней поверхностью слегка вогнутой, а передней выпуклой. Щетинки на лапкахъ частыя и сильныя. Крылья у ♀ и у ♂—безъ дискоидальной клѣточки.

13. *Formica rufa*, Lin.

Найденъ на Кавказѣ мнай ок. Владикавказа и Абастумана (въ соснов. бору), К. А. Сатунинымъ ок. Сары-Камыши на выс. 7.000 ф. въ Закавказье. По Насонову—ок. Эссентукъ. Рѣдокъ.

Обитаетъ лиственные лѣса и сосновые боры горнаго пояса.

Въ Крыму пока не найденъ.

14. *Form. pratensis*, De Geer.

Кавказъ: Дагестанъ, отъ Темиръ Х. Шуры до Гуниба (!! 1899); Южн. склонъ Аджаро-Тріалетскаго хребта, Абастуманъ (!! 1899); сѣверн. склонъ главн. хребта (! 1899); Пятигорскъ, на Машукѣ (! 1900); Кисловодскъ (Кожевниковъ); Манглизъ (! 1900). Н. В. Насоновъ указываетъ для Кисловодска, Эсентукъ и сѣверн. склона Арагата.

Живеть въ лиственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ, поднимаясь до ихъ предѣла. Крылатыя особи наблюдались мнай 6. VII (ф. Св. Николая).

Крымъ: Яйла, выс. 2000 ф. (Караваевъ); Старый Крымъ (Муралевичъ); Ай-Петри (Кожевниковъ).

15. *Form. truncicola*, Nyl.

На Кавказѣ найденъ мнай въ Дагестанѣ, ок. Дербента.

16. *Form. exsecta*, Nyl.

Для Кавказа указанъ былъ Майромъ. Я встрѣчалъ его въ Дагестанѣ, въ листвен. лѣсу на Гунибѣ. Рѣдокъ.

— f. interm. *exsecto-pressilabris*, For. Дагестанъ (!!); чаще, чѣмъ типичный видъ. Пирдаугданск. перевалъ, па выс. 7000—8000 ф. (Сатунинь).

17. *Form. pressilabris*, Nyl.

На Кавказъ очень обыкновененъ. Кубанская и Терская обл. (!!; бар. Розенъ, Караваевъ); Дагестанъ (!!; Сатунинъ, Завадскій). Закавказье (!!; Сатунинъ). Указывается и Н. В. Насоновымъ на Айриджъ, выс. 6370 ф.

Мѣстообитаніемъ этого муравья служатъ: каменистая степь, окраины лѣсовъ по склонамъ горъ, горные луга отъ 4000 до 8000 ф. выс. Крылатые ♂ и ♀ наблюдались мной въ іюнѣ.

18. *Form. sanguinea*, Latr.

На Кавказъ обыкновененъ, какъ въ Дагестанѣ (!!), такъ и въ центральной и западной частяхъ главнаго хребта (!!; Розенъ, Кожевниковъ) и въ Закавказии (!!; Завадскій, Кириловъ, Захаровъ).

Характеренъ для пояса лиственныхъ лѣсовъ (дубовыхъ и буковыхъ); рѣже встречается въ сосновыхъ борахъ на выс. 5—6000 ф. Чаще всего былъ находимъ живущимъ вмѣстѣ съ *Form. rufibarbis*, рѣже съ *Form. fusca*.

Крылатыя особи—въ іюлѣ (Боржомъ, Манглизъ !!).

19. *Form. fusca*, Lin.

Очень обыкновененъ на Кавказъ, повидимому повсюду въ лѣсномъ поясѣ горъ, и въ альпійской области на горныхъ лугахъ, до границы ледниковъ. Указанъ былъ Н. В. Насоновымъ. Миѣ былъ доставленъ изъ разныхъ пунктовъ (Сатунинъ, бар. Розенъ, Завадскій, Захаровъ). Крылатые ♂ и ♀—въ іюлѣ (!!).

Крымъ: Магарацъ (Караваевъ).

20. *Form. rufibarbis*, F.

Н. В. Насоновымъ указанъ для Кавказа и Крыма.

Одинъ изъ самыхъ обыкновеннѣйшихъ муравьевъ на Кавказѣ (!!; Сатунинъ, Завадскій, бар. Розенъ, Захаровъ, Крживоблоцкій, Кириловъ, Караваевъ, Кожевниковъ). Крылатыя экз.—въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ.

Живеть при разнообразныхъ условіяхъ; начиная отъ степей Сѣвернаго Кавказа, побережья Каспійскаго и Чернаго морей и рѣчныхъ долинъ поднимается на горахъ до альпійскаго пояса включительно. Крайніе пункты нахожденія: около Мамисонскаго перев. на выс. 10000 ф. въ поясѣ рододендрона (! 1899); альпійскіе луга ок. Гудаура и Казбека, 7.—8000 ф. (Сатунинъ); сел. Зоръ и Сардаръ-Булакъ, на сѣдловинѣ Араатовъ, 8000 ф. (Сатунинъ); Сары-Камышъ Карск. обл. (Сатунинъ); Зекарскій перев. (!); с. Судуръ, Кубин. у., горн. луга (Завадскій); Пирдаугданскій пер. Зангез. у. 6.—8.000 ф. (Сатунинъ).

Крымъ: Яйла надъ Магарацемъ, 2000 ф. (Караваевъ); Старый Крымъ (Муралевичъ); Феодосія (!).

— *var. fusco-rufibarbis*, *For. Кавказъ*: Дагестанъ, Гунибъ; Пятигорскъ; Манглизъ (!!).

— *var. subpilosa*, *Ruzsky*.

Кавказъ: Тифлисъ и окр., Мцхетъ (!! 1899 и 1900); сѣверн. склонъ главнаго хребта (!!); Дагестанъ (!! 1899).

21. *Form. cinerea*, Mayr.

Кавказъ: (Майръ, Насоновъ). Обыкновенна въ степяхъ, на кустарниковыхъ склонахъ, на скалахъ и плоскогоріяхъ, покрытыхъ травянистой растительностью (!!; Сатунинъ, Кирilloвъ, баронъ Розенъ, Кожевниковъ). Рѣже встречается въ березовыхъ лѣсахъ ниже альпійскаго пояса (7.—8.000 ф.). Крылатыя формы—въ іюлѣ.

— *var. imitans*, *Ruzsky*.

Въ *Крыму* найдена ок. Алушты (Трубниковъ) и Старого Крыма (Муралевичъ).

На *Кавказѣ*—въ Дагестанѣ (!); Терская обл. (!, Кожевниковъ); Кубанская (бар. Розенъ); Черноморск. окр. (!!), Батумъ (!), Манглизъ и Авчалы близъ Тифлиса (!!); Ларсь и

Дарьяльское ущелье (!); Пасанауръ (Сатунинъ); Кахетія (Сатунинъ).

Въ горахъ поднимается до 5.—6.000 ф. Крылатыя ♂ и ♀ — 6. VII. 99 въ сосновомъ бору у ф. Св. Николая на съвер. склонѣ главнаго хребта.

22. **Form. gagates, Latr.**

Крымъ: Алушта (Трубниковъ); Герценбергъ (Муралевичъ); Ай-Петри (Кожевниковъ).

На Кавказѣ обыкновененъ (Майръ). Дагестанъ (!! 1899; Сатунинъ); Мамисонскій перевалъ (!! 1899); Салаватскій перев. (Завадскій); Муравъ-Дагъ, Айриджа (Сатунинъ).

Характеренъ для альпійской области Большого и Малаго Кавказа; живетъ среди горныхъ луговъ и зарослей рододендрона, выс. 7.000—10.000 ф. н. мор. Ниже—на каменистыхъ, обнаженныхъ горахъ и склонахъ.

— var. *transcaucasica*, Nessonow.

Кавказъ (Насоновъ); Дагестанъ (! 1899 V) горные луга, до 7.000 ф.

23. **Form. subrufa, Rog.**

Для Кавказа только указанъ Майромъ, что сомнительно. Видъ этотъ принадлежитъ крайнему западу Европы. Возможно, что смѣшивался съ *Formica rufibarbis*, var. *subpilosa*, Ruz.

24. **Form. (Proformica, m.) nasuta, Nyl.**

На Кавказѣ это довольно обыкновенный муравей. Водится въ степахъ на равнинѣ, затѣмъ по предгоріямъ, на каменистыхъ склонахъ и вершинахъ горъ, поднимаясь въ Дагестанѣ до высоты 5.—6.000 ф., на главн. хрѣбтѣ до 4.000 ф. Указанъ былъ Н. В. Насоновымъ (Тифлисъ). Дагестанъ, до Гуниба (!! 1899); Алагиръ и Садонскій рудн. (!), Тифлисъ и окрестн. (!!; Сатунинъ, Караваевъ, Завадскій);

Ленкоранск. у. (Загадский); Коби (Сатунинъ); Кубанская обл. (Розенъ); Пятигорскъ на Машукѣ (!!). У этого вида имѣются большие и малые рабочіе. *Крымъ: Феодосія* (!!).

25. *Lasius fuliginosus*, Latr.

Кавказъ (Насоновъ): Туапсе, Новороссійскъ (!! 1800); Кисловодскъ (Кожевниковъ). Въ *Крыму*—на Яйлѣ (Караваевъ). Въ лиственныхъ лѣсахъ.

26. *Lasius flavus*, Dez Geer.

На *Кавказѣ* былъ найденъ Н. В. Насоновымъ. Мнѣ былъ доставленъ изъ Кубанской обл. (баронъ Розенъ), Тифлисской губ., съ Гудаура и Пасанаура, изъ Закавказья, Эриванск. губ. (Сатунинъ). Я наблюдалъ его въ Дагестанѣ отъ Темиръ Х. Шуры до Гуниба, на обоихъ склонахъ главнаго хребта по дорогѣ изъ Владикавказа въ Кутаисъ и Тифлисъ, ок. Пятигорска на горахъ Машукѣ и Бештау, и въ Манглизѣ (!!).

Обыкновененъ. Живетъ въ обычныхъ холмикахъ и подъ камнями на травянистыхъ пространствахъ среди лѣсовъ до ихъ предѣла и въ горныхъ лугахъ до границы вѣчнаго снѣга.

Крылатые ♂ и ♀ наблюдались въ юль (!!), августѣ (Розенъ) и сентябрѣ (Сатунинъ).

Въ *Крыму* неизвѣстенъ, но вѣроятно найдется.

27. *Lasius flavus myops*, For.

На *Кавказѣ* найденъ мной въ горныхъ лугахъ на Зекарскомъ перевалѣ.

— var. *flavoides*, For. *Кавказъ:* горные луга альпийской обл. на главн. хребтѣ (!! 1899 и 1900).

28. *Lasius umbratus*, Nyl.

Кавказъ: Дагестанъ, Петровскъ (!! 1899); Тифлисъ, Муштаидъ (Сатунинъ; !!); Кисловодскъ (Кожевниковъ).

— var. *exacutus*, nov. var. II ~~также видов~~ . 88.

Найденъ К. А. Сатунинымъ въ Закавказье, именно на склонѣ Мал. Араката, на выс. 8000 ф. (10. IX. 1900 г.).

Отличается высокой чешуйкой, съуженной сверху, даже пріостренной слегка, съ закругленнымъ верхнимъ краемъ. Форма головы нѣсколько иная, съ болѣе закругленными задними углами. Рукоять усиковъ съ отстоящими тонкими и рѣдкими волосками, (но съ частыми и густыми прилегающими); голени безъ отстоящихъ волосковъ или съ мелкими и тонкими очень рѣдкими. Однообразно блѣдно-желтаго цвѣта съ буроватымъ оттенкомъ.

29. *Lasius mixtus*, Nyl.

Кавказъ: окрестности Тифлиса (!! 1899; Сатуни); Кисловодскъ (Кожевниковъ); Пятигорскъ, Бештау (! 1900).

30. *Lasius affinis*, Schenk.

Кавказъ: Дагестанъ. Тем.—Х.—Шура, крыл. ♀ и ♂—23 VI. 1899 (!!); Военно осетинская дор., ф. Св. Николая (!); Кубанская обл., хреб. Кошхъ (баронъ Розенъ).

Обитаетъ лѣса преимущественно нижняго пояса; встрѣчается и выше, въ поясѣ сосны, но рѣдокъ.

— var. *mixto-affinis*, m. На Кавказѣ, окр. Боржома (! 1899).

30. *Lasius bicornis*, Foerst.

Кавказъ: Дагестанъ, Темир.—Х.—Шура и Гунибъ (!! 1899). Крылатыя экземпляры наблюдались тамъ-же 25 июня.

32. *Lasius carniolicus*, Mayr.

Кавказъ: Эриванск. губ., близъ Сардаръ-Булака на сѣдловинѣ между Б. и М. Аракатами, на выс. ок. 8.000 ф.; крылат. ♀—11. IX. 1900 г. (Сатуни).

33. *Lasius niger*, Lin.

Для Кавказа и Крыма указанъ Майромъ и Насоновымъ. Мною наблюдался не рѣдко въ горныхъ лѣсахъ Большого Кавказа и Закавказья. Кроме того еще доставленъ былъ г. Кожевниковымъ, бар. Розенъ, Завадскимъ.

Крылатыя особи въ юль.

Изъ Крыма я имѣю его отъ г. Кожевникова (Севастополь).

— var. *alieno-niger*, For.

Кавказъ: Кисловодскъ (Караваевъ); Боржомъ (! 1899). Крымъ: Феодосія (Муралевичъ); колонія Герценбергъ (онъ-же).

34. *Lasius alienus*, Foerst.

Для Крыма и Кавказа указанъ Насоновымъ.

По моимъ изслѣдованіямъ на Кавказѣ очень обыкновенъ какъ на равнинѣ, такъ и въ горахъ, гдѣ доходитъ до области вѣчнаго снѣга. Станціи: степь, сосновые боры, заросли кустарниковъ нижняго пояса, опушки и поляны лѣсовъ, скалы, заросли рододендрона, горные луга. Крылат. экз. съ юна по сентябрь.

Доставленъ кроме того Сатунинъ, Захаровъ, Кирилловъ, Караваевъ, Кожевниковъ, Завадский.

Крымъ: Алушта (Трубниковъ, Головинъ, Радаковъ); Магарачъ, берегъ моря (Караваевъ); Симферополь (Кожевниковъ); колонія Герценбергъ (Муралевичъ); Феодосія (!); Балаклава (Александровъ).

35. *Lasius emarginatus*, Ol.

Кавказъ: Лѣса Кубанской и Терской обл. (!! 1899 и 1900; Кожевниковъ, Розенъ); Понтійская обл. (!!); Ленкорань и Талышъ (Сатунинъ), Манглизъ (!!; Захаровъ); Квишхеты (Кирилловъ).

Обитаетъ повсюду въ лиственныхъ лѣсахъ Закавказья, сѣверного и южного склона западн. и центральной частей главнаго хребта, Понтійской области и всего западнаго Черноморского побережья. Въ горахъ высоко не поднимается, не переходя границы буковъ и дуба. Крылатые экземпляры съ апрѣля по юль.

Въ Крыму найденъ Н. В. Насоновымъ.

36. *Lasius brunneus*, Latr.

Для Кавказа указанъ Насоновымъ и Смитомъ¹⁾; для Крыма—Насоновымъ.

Мною наблюдался въ Дагестанѣ, Владикавказѣ, на сѣверномъ и южномъ склонахъ главнаго хребта, сѣверн. склонѣ Аджаро-Тріалетскаго хребта, въ окрестн. Пятигорска (Машукъ и Бештау) и по черноморскому побережью (Сухумъ, Поти, Н. Аѳонъ). Кромѣ того полученъ мной изъ Закавказья, Эчміадзинъ, Ленкорань и Талышская низм., Пасанауръ (Сатунинъ); окр. Кисловодска (Кожевниковъ).

Характеренъ для лиственныхъ лѣсовъ (дубъ, чинаръ, букъ и др.) преимущественно восточной части Кавказа, встрѣчаясь на равнинахъ, въ низменностяхъ, долинахъ и въ горахъ, не переходя въ вертикальномъ направленіи ни въ какомъ случаѣ за границу названныхъ лѣсовъ. Крылатыя формы наблюдались мной въ юлѣ.

Крымъ: Ялта (Насоновъ); Балаклава (Александровъ).

— var. *emarginato-brunneus*, For.

Кавказъ: Черноморское побережье, Батумъ, Нов. Аѳонъ; Кутаисъ, Багдатъ; окр. Пятигорска (!! 1899—1900).

— var. *pallidus*, Latr.

Кавказъ: Кутаисъ, Поти, Боржомъ (! 1899). Лѣсъ.

— var. *alieno-brunneus*, For.

Кавказъ: Дагестанъ, Ходжалъ—Маха, Гунибъ (!! 1899).

37. *Prenolepis nitens*, Mayr.

Кавказъ: окр. Новороссійска (! 1900); Кутаисъ (! 1899).

¹⁾ Smith, Catalogue of Hymenopterous Insects of British Museum Formicidae. 1858. p. 7.

3. *Plagiolepidii.*

38. *Acantholepis frauendorfii*, Mayr.

Кавказъ: Понтійская обл., Кутаисъ, Багдатъ (! 1899), Дагестанъ, Левашъ (! 1899). Каменистая степь.

39. *Plagiolepis pygmaea* Latr.

Майръ и Насоновъ указываютъ для *Кавказа*; Форель— для *Крыма*. По моимъ наблюденіямъ очень обыкновененъ на Кавказѣ. Дагестанъ; бассейнъ Риона, Мцхетъ, Тифлисъ; Батумъ, Пятигорскъ, Новороссійскъ, Баку (!! 1899 — 1900); Эриванск. губ., Джеватъ, Гасанризъ, Бакин. г.; Ленкорань, Тифлисъ (Сатунинъ); Кубанск. обл., хребетъ Кошхъ (баронъ Розенъ); Геленджикъ (Гордѣевъ). Экспедиціей гр. Зичи найденъ въ Тифлисѣ¹⁾. Живетъ на степныхъ участкахъ, по каменистымъ предгоріямъ и склонамъ горъ, въ рѣчныхъ долинахъ и на ихъ склонахъ, въ садахъ, виноградникахъ. Предпочитаетъ открытые местности. Вертикальное распространение—до 7.000 ф. на безлѣсныхъ плоскогоріяхъ (особенно въ Закавказье). Крылатыя формы найдены 26. VIII. 1900 г. (Манглизъ!).

Крымъ: Магарачъ, крыл. 6—31. VII. 96 г. (Караваевъ); Старый Крымъ и Феодосія (Муралевичъ); Симферополь (Кожевниковъ); Алушта (Головинъ).

— *var pallescens*, For.

Кавказъ: Боржомъ (! 1899); окр. Тифлиса (Сатунинъ).

2. subf. *Dolichoderini*, For.

40. *Dolichoderus quadripunctatus*, Lin.

Насоновъ указываетъ для *Кавказа*. Мною найденъ тамъ окр. Кутаиса, Владикавказа, Новороссійска, Боржома, Тифли-

¹⁾ Zichy Ionö Gröf, HarmadiK ázsiai utazása, II kötet, Budapest, 1901. s. 132.

са (садъ Муштаидъ), Батума и на съверномъ склонѣ Аджаро-
Триалетскаго хребта!!

Живеть въ лиственныхъ (дубовыхъ, буковыхъ и пр.) лѣсахъ.

41. *Bothriomyrmex meridionalis*, Rog.

Кавказъ: Боржомъ (! 1899); Авчалы близъ Тифлиса
 (!! 1900); Квишхеты (Кирилловъ); Ленкоранскій у., постъ
 Кяльвазъ на персидск. границѣ (Сатунинъ, 3. VI. 1878).

Крылатыя формы—въ іюнѣ.

Живеть на каменистыхъ мѣстахъ, поросшихъ кустарни-
комъ, степью или рѣдкимъ лѣсомъ, чаще на склонахъ не-
высокихъ горъ.

Для Крыма указанъ Форелемъ.

42. *Liometopum microcephalum*, Panz.

Указанъ Н. В. Насоновымъ для Кавказа (Тифлисъ).

43. *Tapinoma erraticum*, Latr.

Указывается для Кавказа (Насоновъ) и Крыма (Насо-
новъ, Форель). На Кавказѣ чрезвычайно обыкновенна и ра-
спространена повсюду (!! 1899—1900; Сатунинъ, Кожевни-
ковъ, бар. Розенъ, Завадскій).

Крылатыя формы въ маѣ, іюнѣ и іюль.

Мѣстообитанія довольно разнообразны; но главн. образ.
живеть въ лѣсахъ низменностей, долинѣ, ущелій и пологихъ
склоновъ горъ. Предпочитая лиственные лѣса всѣмъ прочимъ,
видъ этотъ однако попадается и въ хвойныхъ, какъ чистыхъ,
такъ и смѣшанныхъ. Наблюдалъ я его и въ сосновыхъ бо-
рахъ (Абастуманъ, Манглизъ). Въ Дагестанѣ и на главномъ
хребтѣ достигаетъ верхняго пояса лѣсовъ (сосна, береза) до
выс. 7.000—8.000 ф. На открытыхъ мѣстахъ предпочитается
каменистую почву, дѣлая норы подъ камнями.

Крымъ: Старый Крымъ и Колонія Герценбергъ (Мура-
левичъ); Яйла, 2000 ф. (Караваевъ).

44.. *Tapinoma nigerrimum*, Nyl.

На Кавказъ указывается Насоновымъ. Мной была найдена въ лиственныхъ лѣсахъ по теченію р. Алагира (сѣверн. склонъ главн. хребта), въ окрестн. Тифлиса и въ Манглизѣ, на опушкѣ сосноваго бора. К. А. Сетунинымъ доставлена изъ Кяльваза, Ленкоронск. у. и Эчміадзина..

Крылатыя ♀ и ♂ наблюдались въ маѣ (Сатунинъ).

3. subf. *Myrmicini*, Lep.

1. *Myrmecia*.

45. *Myrmecina latreillei*, Curtis.

Кавказъ: Терская обл., окр. Владикавказа (!!); Садонскій рудникъ, на сѣверн. склонѣ главнаго хребта (!! 1899) въ верхн. теченіи р. Алагира.

Живетъ въ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсахъ (букъ, грабъ, дубъ и др.).

46. *Formicoxenus nitidulus*, Nyl.

Кавказъ: Дагестанъ, окр. Темиръ—Ханъ—Шуры, и сѣверный склонъ главнаго хребта, ок. ф. Св. Николая (!! 1899). Найденъ въ гнѣздахъ *Formica pratensis*, De Geer.

47. *Leptothorax acervorum*, F.

Кавказъ: Понтійская обл., южный склонъ главнаго хребта, истоки р. Ріона (!! 1899); Зекарскій перевалъ (!), Манглизъ (!! 1900). Склонъ М. Арапата (Сатунинъ).

Живетъ въ березовыхъ лѣсахъ верхняго пояса (6.000—8.000 ф.) и въ елово-пихтовыхъ (съ *Abies nordmanniana*) на южномъ склонѣ главнаго хребта.

48. *Leptoth. muscorum*, Nyl.

Кавказъ: Военно-грузинская дор. ст. Казбекъ (Сатунинъ); окр. Владикавказа и Пятигорска (!! 1899); южный склонъ главнаго хребта; Зекарскій перевалъ (!!); Абастуманъ (!).

Обитаетъ въ лѣсахъ Кавказа отъ предгорій и до ихъ верхняго предѣла; заходитъ и въ нижнеальпійскую область.

49. *Leptoth. tuberum*, F.

Кавказъ: Дагестанъ, Левади, Ходжалъ-Маха (!! 1899); Черноморскій округъ, Нов. Аeonъ, Батумъ (!! 1900); Кисловодскъ (Кожевниковъ). Степи, кустарники.

Крымъ: Алушта (Головинъ).

— *var. nigriceps*, Mayr.

Кавказъ: Манглизъ (! 1900); Пятигорскъ, Машукъ (!); Желѣзноводскъ (! 1900). Лѣсъ.

— *var. affinis*, Mayr.

Кавказъ: Тифлисъ, садъ Муштаидъ (! 1900).

— *var. exilis*, Em.

Кавказъ: Манглизъ (! 1900); Гудамакарское ущелье близъ Пасанаура по Военно-грузинской дор. (Сатунинъ, 1901).

— *var. corticalis*, Schenk.

Кавказъ: сѣверный склонъ главнаго хребта, форть Св. Николая (!! 1899). Сосновый боръ.

50. *Leptoth. unifasciatus*, Latr.

Кавказъ: ст. Намыжволъ, на южн. склонѣ главнаго хребта и окр. Кутаиса (!! 1899); Манглизъ (! 1900). Дагестанъ, Гунибъ (!! 1899); Боржомъ (! 1900); Талышск. низм. (Сатунинъ). Степь, боръ, березовый лѣсъ.

— var. *anoplogynus*, Em.

Кавказ; Багдатъ, Кутаисск. губ. (! 1899); Поти (! 1900).

— var. *tauricus*, nov. var.

♀. Между mesonotum и metanotum проходитъ небольшое углубленіе. Шипы на заднеспинкѣ широкіе при основанії, острые, изогнутые, направленные вверхъ, равные почти половинѣ основной поверхности.

Цвѣтъ тѣла блѣдный красновато-желтый; брюшко, усики и ножки желтые; на верхней поверхности брюшка проходить поперечная свѣтло-коричневая полоска, занимающая заднюю треть первого сегмента. Булава усиковъ желтая. Тупые отстоящие волоски болѣе частые на брюшкѣ. Дл. 2—2,5 mill.

Крымъ: Яйла надъ Магарачемъ, 2.000 ф. н. мор. (Караева). Найденъ въ лѣсу „въ кучѣ гнѣзда“ *Formica pratensis*, de Geer, въ іюнѣ 1896 г.

51. *Leptoth. alpinus*, nov. sp.

♀. Усики 12-члениковые. Thorax съ профилемъ прямымъ, безъ углубленія между meso-metanotum. Шипы заднеспинки оч. короткіе, широкіе, въ видѣ острыхъ зубдовъ, равные $\frac{1}{3}$ основной поверхности заднеспинки. Первый узелокъ стебелька съ короткой цилиндрической частью, острозакругленъ сверху, передняя покатая его поверхность вогнута, задняя выпуклая.

Голова продолговатая, удлиненная, по длини почти равняется длини груди. Личной щитокъ слабо выпуклый съ продольными морщинками. Верхняя поверхность головы и лобъ съ частыми продольными штрихами, бока головы позади глазъ тотчено - морщинистые. Грудь грубо морщинистая, узелки стебелька съ болѣе мелкими морщинками и точками. Тѣло матовое; брюшко гладкое и блестящее.

Челюсти съ 5 зубчиками, изъ коихъ два передніе крупнѣе остальныхъ; поверхность челюстей почти гладкая и только съ небольшими продольными морщинками.

Тѣло покрыто отстоящими волосками, крупными и тупозакругленными; кроме того на головѣ, ножкахъ,

усикахъ и частью нижней поверхности тѣла частые, тонкіе не плотно прилегающіе волоски, довольно длинные и блѣдножелтаго цвѣта.

Цвѣть тѣла довольно темный, коричневато-красный, голова и булава усиковъ черно-коричневыя, брюшко—темно-коричневое, иногда съ красноватымъ оттенкомъ при основаніи. Голени и бедра коричневыя; усики, челюсти и лапки болѣе свѣтлые (желтокоричневые). Длина тѣла 2—3 mill. Видъ этотъ очень близокъ къ *Leptoth. tuberum*, отъ которого главн. образомъ отличается большой удлиненной головой и цвѣтомъ; можетъ быть даже окажется расой или подвидомъ послѣдняго.

Кавказъ: Мамисонскій перевалъ и аулъ Лисри (!! 1899); Гудауръ (Сатунинъ, 1901).

Живетъ среди скаль на горныхъ лугахъ альпійской области центральнаго Кавказа, 7.000—10.000 ф. Гнѣздится въ норкахъ подъ камнями.

52. *Leptoth. nylanderi*, Foerst.

Кавказъ: окр. Пятигорска, горы Бешту и Машукъ; Кисловодскъ, Владикавказъ (!! 1900); верховья р. Ардона на сѣверномъ склонѣ главнаго хребта (!! 1899); Манглизъ (!! 1900).

Крылатыя формы наблюдались мной въ муравейникахъ 17 и 18. VII. 1900 г. (Бешту). Живетъ въ лѣсахъ лиственныхъ и сосновыхъ борахъ.

— *var. parvulus*, Schenk.

Кавказъ: около Манглиза, въ сосновомъ бору (! 1900).

— *var. nylanderio-tuberum*, m.

Кавказъ: Пасанауръ, Военно-грузинская дорога (Сатунинъ); окр. Владикавказа (! 1899). Лѣсъ.

Въ общемъ какъ *Leptoth. nylanderi*, но съ очень слабо-или едва выраженной перетяжкой между средне и заднен-спинкой.

53. *Leptothele satunini*, Ruzsky.

♀. Дл. тѣла 2—2,5 mill. Усики 12 члениковые съ рукоятью слабо выгнутой, недостигающей до заднаго края головы. Верхнія челюсти съ зубчиками.

Голова, какъ и брюшко блестящая, грудь и стебель матовые. Лобная площадка гладкая и блестящая. Первый узелокъ стебелька сверху довольно остро закругленный, короткий; второй узелокъ сверху правильно овально закругленъ.

Голова на бокахъ, начиная отъ лобныхъ валиковъ, съ продольными морщинками, а сверху на лбу и темени гладкая и блестящая. Личной щитокъ слабо выпуклый, въ задней части своей (между точками прикрепленія усиковъ) гладкій, спереди покрытъ рѣдкими продольными морщинками, изъ которыхъ средняя наиболѣе развита, съ переднимъ краемъ ровнымъ, закругленнымъ.

Лобныя валики хорошо развиты, продолженіемъ ихъ служатъ продольныя морщинки, ограничивающія съ боковъ блестящій лобъ и темя.

Иногда на затылкѣ и задней части темени замѣтна очень тонкая и нѣжная сѣтчатость.

Голова продольно четырехугольная съ закругленными углами.

Грудь тонко сѣтчато (шагреневидно) морщинистая, съ болѣе грубыми морщинками на бокахъ. Узелки стебелька нѣжно тотчено морщинисты. Брюшко гладкое и блестящее.

Спинной профиль слабо выпуклый съ едва замѣтнымъ углубленіемъ между meso-metanotum. Покатая поверхность между шипами поперечноморщинистая.

Шипы очень короткіе, въ видѣ острыхъ зубчиковъ, направленныхъ вверхъ, равныхъ въ длину не болѣе $\frac{1}{3}$ основной поверхности заднеспинки.

Тѣло покрыто отстоящими тупыми волосками, довольно рѣдкими.

Цвѣтъ тѣла желтый; брюшко иногда въ задней половинѣ съ коричневатымъ оттенкомъ; глаза черные. У нѣкоторыхъ экземпляровъ цвѣтъ не чисто желтый, а съ слабымъ темноватымъ (грязноватымъ) оттенкомъ, и на задней поверхности брюшка тогда выступаетъ ясно блѣдно коричневая полоса. Булава усиковъ желтая.

Самцы и самки пока неизвѣстны.

Найденъ въ Закавказье: Эриванск. губ., Аралыхъ около 3.000 ф., въ паркѣ подъ тамариксомъ и на немъ, 7. IX. 1900 (Сатунинъ).

54. *Leptoth. nigritus*, Em.

Кавказъ: южный склонъ главнаго хребта, около Они и Кутаиса (!! 1899); съверный склонъ Аджаро-Тріалетскаго хребта, на пути къ Зекарскому перевалу (! 1899); Батумъ (! 1900).

55. *Leptoth. (Temnonthorax) recedens*, Nyl.

Кавказъ: окр. Кутаиса (! 1899), въ дубовомъ лѣсу, по полянамъ и опушкамъ. Рѣдокъ.

56. *Leptoth. (Temnothorax) rogeri*, Em.

Кавказъ: окр. Мцхетъ (! 1900); Боржомъ (! 1899). Живеть на мѣстахъ сухихъ, каменистыхъ по склонамъ горъ, занятыхъ кустарникомъ и степью.

Гнѣздится подъ камнями. Рѣдокъ.

Крымъ: Феодосія (!).

57. *Monomorium pharaonis*, Lin.

Найденъ мною въ Тифлисѣ и Батумѣ. Живеть въ домахъ и нападаетъ на сахаръ.

58. *Monomor. salomonis*, Lin.

Кавказъ: Ахалцыхъ (! 1899); Аралыхъ, близъ Ааратовъ (Сатунинъ, 1900).

Живеть въ мѣстностяхъ сухихъ, песчаныхъ и каменистыхъ, пустынно-степного характера. Гнѣздится подъ камнями.

59. *Cardiocondyla elegans*, Em.

Кавказъ: Тифлисъ и его окрестности (!! 1899—900; Сатунинъ); Квишхеты (Кирилловъ); Батумъ, Поти (!! 1900); Аралыхъ, Эриванск. губ. о. Ааратовъ (Сатунинъ).

Живеть на каменистыхъ мѣстахъ и на песчаномъ берегу моря, въ норахъ.

60. *Pheidole pallidula*, Nyl.

Кавказъ. Указана тамъ Майромъ и Насоновыимъ. Очень обыкновенна, въ особенности въ Закавказии.

Терская обл., Пятигорскъ (Машукъ); Тифлисъ и окр. (!!); Батумъ (!! 1900); Дагестанъ; Кутаисъ, Ахалцихъ, Боржомъ (!! 1899); Эриванс. и Елизаветпольск. губ. (Сатуниинъ); Ленкоранъ, Талышъ (Сатуниинъ).

Живетъ въ степяхъ и пустыняхъ съ каменистой, глинистой или песчаной почвой, на равнинахъ; также на скалахъ по склонамъ невысокихъ горъ, до 6.000 ф. высоты приблизительно.

61. *Pheidole megacephala*, F.

Для *Кавказа* приводится Насоновымъ. Мной найдена въ окрестностяхъ Тифлиса и Мцхета, въ Дагестанѣ ок. Петровска и въ Баку. Держится въ тѣхъ же мѣстахъ, какъ и предыдущій видъ.

62. *Stenamma westwoodi*, Westw.

Кавказъ: Дагестанъ, хреб. Атлы-Буюнъ на пути въ Темиръ-Ханъ-Шуру (! 1899). Дубовые заросли на перевалѣ.

63. Sten. (*Aphaenogaster*) *obsidianum*, Mayr.

На *Кавказѣ* впервые былъ найденъ Мочульскимъ и описанъ Майромъ. Куланская обл. (бар. Розенъ); Ленкоранск. у. Талышъ (Сатуниинъ); Пасанауръ и Гудауръ (Сатуниинъ); Зимолетскій спускъ (!! 1900); Мамисонскій переваль (! 1899).

Живеть въ заросляхъ рододендрона среди горныхъ луговъ нижне и верхнеальпійской области, на выс. 5.000—7.000 ф. Случайно попадается и ниже, въ долинахъ и ущельяхъ среди горъ. Одинъ экземпляръ былъ найденъ мной въ Тифлисѣ, въ саду Муштаидѣ.

64. Sten. (*Aphaenogaster*) *subterraneum*, Latr.

Н. В. Насоновымъ найденъ на *Кавказѣ*, въ Эриванской губ. Очень обыкновененъ тамъ по моимъ изслѣдованіямъ.

Дагестанъ; съверн. и южн. склонъ Главнаго хребта по Военно-осетинской дорогѣ (!! 1899); Понтійская обл. (!! 1899—

900); Абастуманъ, Ахалцыхъ, Боржомъ, Тифлисъ (!! 1899); Квишхеты (Кирилловъ); окр. Пятигорска, Машукъ и Бешту (!! 1900); Талышъ, с. Тангерудъ, самшитовый лѣсъ (Сатунинъ, 1898).

Живетъ въ лѣсахъ низменностей, долинахъ и ущелій, поднимаясь въ горахъ лишь до предѣла сосны и ели.

Крымъ: Алушта (Головинъ); Феодосія (! 1900).

Крылатыя формы наблюдались въ іюль.

65. *Sten. (Aphaenogaster) testaceo-pilosum, Lucas*.

Кавказъ: Понтійская обл., Кутаистъ и Багдатъ (! 1899).

— *var. semipolita, Nyl.*

Кавказъ: окр. Батума (! 1900). Найденъ только 1 экземпляръ.

66. *Sten. (Messor) structor, Latr.*

Для *Кавказа* указанъ Насоновымъ и Майромъ; для *Крыма* — Насоновымъ.

Очень обыкновененъ въ обѣихъ названныхъ странахъ. Я его находилъ на Кавказѣ почти всюду, какъ въ низменностяхъ, такъ и въ горахъ; но въ послѣднихъ только не выше пояса сосны. Большое количество экземпляровъ было доставлено мнѣ также другими лицами (Сатунинъ, Кирилловъ, Завадскій, баронъ Розентъ, Караваевъ), что безъ сомнѣнія свидѣтельствуетъ о достаточной распространенности вида.

Крылатыя формы наблюдались въ апрѣль и маѣ (Сатунинъ).

Крымъ: окр. Севастополя (Смиренскій); Алушта (Трубниковъ, Радаковъ, Головинъ); Магарачъ (Караваевъ); колонія Герценбергъ, Феодосія, Старый Крымъ (Муралевичъ); Симферополь (Кожевниковъ); Балаклава (Александровъ).

Крылатыя особы были добыты 19. IV. 1896 (Караваевъ).

— *var. barbaro-structor, Mayr.*

Крымъ: Алушта (Радаковъ).

67. Sten. (*Messor*) *barbarum*, Lin.

Для Кавказа и Крыма указанъ былъ Майромъ и Насоновыемъ.

Столь-же обыкновененъ на Кавказѣ, какъ и предъидущій видъ, хотя болѣе принадлежитъ Закавказью. Большинство его мѣстонахожденій и мнай и другими лицами сдѣлано именно тамъ (Сатунинъ, Караваеъ, Крживоблоцкій, Горбачевъ).

Крылатыхъ особей находилъ К. А. Сатунинъ въ марта (Сальяны—16. III. 95; Тифлісъ—15 и 27. III. 1900).

Характеренъ для степи на равнинахъ, въ низменностяхъ и на плоскогоріяхъ, не выше 4.000 ф.

Крымъ: окр. Севастополя (Смиренскій), Магарачъ (Кара-ваевъ); Феодосія и Симферополь (! 1900); Старый Крымъ (Муралевичъ).

— var. *meridionale*, André.

Кавказъ: Батумъ, Тифлісъ (!! 1899—900); Ленкоранскій у. (Завадскій); Эчміадзинъ, Тифлісъ (Сатунинъ).

Крымъ: Алушта (Грубниковъ, Радаковъ).

— var. *striaticeps*, André.

Кавказъ: Карабахъ, Елисаветп. губ.; Кубинскій у., Тифлісъ (Сатунинъ); Муштаидъ (! 1899).

— var. *niger*, André.

Кавказъ: Ликаны и Ахалтыхъ (! 1899).

68. Sten. (*Messor*) *caducum*, Motsch.

Кавказъ: Мочульскій указываетъ для Закавказья, берегъ р. Аракса. (Bullet. de la Soc. Imper. des Natural. de Moscou, 1839, № 1).

69. *Myrmica rubida*, Latr.

Для *Кавказа* указанъ былъ Майромъ.

Дагестанъ, Гунибъ (!! 1899), Зекарскій пер. (! 1899); Кубанская обл. (баронъ Розенъ); М. Аракатъ, Сары-Камышъ (Сатунинъ).

Принадлежитъ верхнему лѣсному поясу (березовые лѣса) и горнымъ лугамъ альпійской области. Крылатыя формы найдены были мной въ іюлѣ.

70. *Myrmica laevinodis*, Nyl.

Кавказъ: Терская обл., сѣверный и южный склоны главнаго хребта; Кутаиск. губ., Зекарскій пер., Абастуманъ, Боржомъ (!! 1899); Зимомлетскій спускъ (! 1900); Эриванск. губ. Ленкоранск. у., Талышъ; Пасанауръ (Сатунинъ).

Это характерный обитатель лѣсовъ, начиная отъ подошвъ горъ до ихъ верхняго предѣла, откуда заходитъ въ заросли рододендрона и на альпійские луга.

Крылатыя формы наблюдались въ іюлѣ.

71. *Myrm. laevinodis*, Nyl. subsp *ruginodis*, Nyl.

Для *Кавказа* указанъ Майромъ.

Болѣе или менѣе обыкновенна всюду въ различныхъ лѣсахъ (!! Кожевниковъ, Сатунинъ).

Крылатыя формы—въ іюлѣ.

72. *Myrmica lobicornis*, Nyl.

Указана для *Кавказа* Насоновымъ.

Дагестанъ; сѣверный и южный склоны главнаго хребта, Абастуманъ, Тифлісъ (!! 1899); Кисловодскъ (Кожевниковъ); Бакинск. губ., Кубинск. у. Судуръ (Завадскій); Гудауръ (Сатунинъ).

Живетъ на степи и обнаженныхъ отъ лѣса склонахъ и плоскогоріяхъ, поднимаясь до 8.000 ф. (альпійские луга).

Крымъ: Яйла надъ Магарачемъ (Караваевъ); Старый Крымъ (Муралевичъ).

73. *Mymica scabrinodis*, Nyl.

Майромъ и Насоновымъ указана для *Кавказа*.

Обыкновенна. Любить держаться въ свѣтлыхъ лѣсахъ и рощахъ, въ заросляхъ кустарника и на лугахъ въ низне-альпійской области (8.000 ф.).

Дагестанъ; Понтійская обл.; Туапсе, Тифлисъ (!!); Квишеты (Кирилловъ); Кубанская обл. (Розенъ); Пасанауръ, Коби и различные пункты Закавказья (Сатунинъ); Кисловодскъ (Кожевниковъ); Бакин. губ., Судуръ (Завадский).

Крылатыя формы—въ августѣ, іюль и іюнь (!! Сатунинъ).

74. *Mymica rugulosa*, Nyl.

Кавказъ: Дагестанъ (!!); Терская обл., Кутаисъ; Боржомъ, Поти (!!); Ларсь, Млеты, Пасанауръ (!!); Тифлисъ и окрестн. (!!); Кубанская обл. (бар. Розенъ); Кисловодскъ (Кожевниковъ); Бакинск. губ., Ленкорань и Эриванская (Сатунинъ).

Этотъ видъ обыкновененъ по обѣ стороны главнаго хребта, въ различныхъ лѣсахъ и на горныхъ лугахъ (7.000—9.000 ф.). Въ Дагестанѣ въ дубовыхъ и вообще лиственныхъ лѣсахъ до ихъ предѣла. Въ Закавказии К. А. Сатунинъ нашелъ его на Пирдаугданскомъ перевалѣ на выс. 6—8.000 ф. На степи найдена мною около Алагира

Крылатыя формы наблюдались въ іюль (!!).

Крымъ: Алушта (Грубниковъ).

75. *Mymica sulcinodis*, Nyl.

Кавказъ: Мамисонскій перевалъ (!! 1899); Гудауръ; Крестовая гора (! 1900); Гудамакарское ущелье близъ Пасанаура (Сатунинъ, 1901); Зекарскій перевалъ (!!). Принадлежитъ поясу горныхъ луговъ и зарослямъ рододендрона; встрѣчается также, хотя рѣже, и въ самой верхней полосѣ березовыхъ лѣсовъ, но не ниже границы хвойныхъ.

Крымъ: Яйла надъ Магарачемъ (Караваевъ, 1896).

2. *Cremastogasterii.*

76. *Cremastogaster sordidula*, Nyl.

Кавказъ: Дагестанъ (!! 1899); Елизаветпольская губ., Джебраилъ, Мэзра-Астартъ, Шихаузъ (Сатунинъ). Указанъ былъ также Майромъ.

Обитаетъ каменистую степь и кустарниковые заросли, на горахъ, отъ самой подошвы ихъ до высоты приблизительно 7.000 ф.

77. *Cremastogaster subdentata*, Mayr.

Кавказъ: Эриванская губ., с. Нижн. Акулисы (Н. Н. Шавровъ, Сатунинъ); Мигры, Аралыхъ (Сатунинъ). Для Тифлиса указывается Насоновъмъ, для р. Аракса Майромъ. Степь.

78. *Cremastogaster scutellaris*, Oliv.

Майръ указываетъ для Крыма и Кавказа; Насоновъ — для Крыма.

Кавказъ: Понтийская обл. (!! 1899—1900; Завадский); Мцхетъ, Тифлисъ (!! 1899); Карабахъ; Джеватъ; Гасанризъ у предг. Муравъ-Дага; Ленкорань, Талышъ (Сатунинъ). Лагодехи (Завадский).

Очень обыкновененъ въ лиственныхъ лѣсахъ всего Закавказья, поднимаясь до ихъ границы въ горахъ (приблизительно до 6.000 ф.).

Крылатые ♂ найдены были 11. VII. 99. (!).

Крымъ: Магарацъ (Караваевъ).

79. *Cremast. auberti*, Em. subsp. *laestrygon*, Em.

Кавказъ: Батумъ, Чаква (! 1900).

3. *Solenopsisidiisi.*

80. *Solenopsis fugax*, Latr.

Кавказъ: Дагестанъ, отъ г. Петровска до Гуниба (!! 1899); степь между Владикавказомъ и Алагиромъ (!); сѣверный склонъ главн. хребта; Кутаисъ, Туапсе, Батумъ (!!); Тифлисъ,

Коджоры, Манглизъ (!!); Талышъ (Сатунинъ, 98); Пасанауръ, (Сатунинъ, 1901). Былъ указанъ для Кутаиса также Насоновымъ.

Крылатыя формы были наблюдаемы въ іюнѣ (Гунибъ!). Живеть въ степи на равнинахъ и предгоріяхъ; также на открытыхъ пространствахъ среди горныхъ лѣсовъ; въ культурныхъ мѣстностяхъ (сады, парки, виноградники).

Крымъ: Феодосія (!).

81. *Solenopsis orbula*, Em.

Кавказъ: Манглизъ (! 1900).

4. *Tetramorii*.

82. *Tetramorium caespitum*, Lin.

Указанъ для *Кавказа* Майромъ и Насоновымъ; для *Крыма* Насоновымъ. Около Тифлиса найденъ экспедиціей гр. Зичи.

Чрезвычайно обыкновенный муравей на пространствѣ всего Кавказскаго края (!!; бар. Розенъ, Сатунинъ, Караваевъ, Завадскій, Захаровъ, Кирилловъ, Кожевниковъ, Гордѣевъ).

Степи, лѣса, горные луга до 7.000 ф., культурныя мѣстности. Крылатыя формы наблюдались въ іюнѣ, іюль и августѣ (!!; Завадскій, Сатунинъ).

Крымъ: Алушта (Трубниковъ, Головинъ); Яйла надъ Магарачемъ (Караваевъ); Старый Крымъ, колонія Герценбергъ, Феодосія (Муралевичъ); Симферополь (Кожевниковъ).

— *var. meridionale*, Em.

Крымъ: Алушта (Трубниковъ). Указанъ также Насоновымъ.

— *var. semilaeve*, André.

Кавказъ: Батумъ (! 1900).

— var. *splendens*, nov. var.

Все тѣло чернаго цвѣта. Поверхность головы гладкая и блестящая; только на лбу и бокахъ головы слабыя морщинки. Остальное какъ у типичной формы.

Кавказъ: Пятигорскъ, на Машукѣ (! 1900).

83. *Strongylognathus testaceus*, Schenk.

Кавказъ: Дагестанъ, хребетъ Атлы-Буюнъ (! 1899).

Найденъ среди дубовыхъ зарослей на склонѣ хребта, въ гнѣздахъ *Tetramorium caespitum*. Крылатыя самки—24. VI. (!).

IV. subf. *Ponerini*, Lep.

1. *Pon er i i.*

84. *Ponera contracta*, Latr.

Кавказъ: Сѣверный склонъ главнаго хребта, ок. ф. Св. Николая (! 1899); Батумъ, Чаква (! 1900); Тифлисъ, садъ Муштайдъ (Сатунинъ 1888). Ранѣе для Кавказа указанъ Майромъ и Насоновымъ.

Живеть въ лиственныхъ лѣсахъ и сосновыхъ борахъ.

Крымъ: Магарачъ, крылат. ♂♂—1. VIII. 96 (Караваевъ). Указанъ былъ раньше Насоновымъ (Мисхоръ).

85. *Ponera punctatissima*, Rog.

Кавказъ: Сѣверный склонъ главн. хребта, верховья р. Алагира, въ Осетіи (! 1899).

Живеть въ лиственныхъ (букъ, грабъ и пр.) лѣсахъ на склонахъ горъ, подъ землей.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера-
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.