


Augustin Hoffer, Brno:

BAREVNÉ ODCHYLKY DRUHU HEDYCHRIDIUM ROSEUM ROSSI.

DE SPECIEI HEDYCHRIDIUM ROSEUM ROSSI FORMIS COLORIS (HYMENOPTERA, CHRYSIDIDAE).

Hedychridium roseum ROSSI, jedna z našich nejběžnějších zlatěnek, tvoří řadu barvových odchylek, z nichž dvě popsal ve 3. čísle XXXII. ročníku Časopisu Českoslov. společnosti entomologické náš odborník prof. K l e m. Š p a č e k. Podařilo se mi během času zjištění další dvě nové formy, které spolu s ostatními vystihují variabilitu tohoto druhu. Sestavuji zde přehled dosud známých forem, jež se všechny vyskytují též na našem území.

1. Capite et thorace sine reflexibus metallico-rubescensibus, toto abdomine solum rubeo, non metallico **f. typica Rossi.**
2. Vertice, pronoto aut quoque mesonoto cum reflexibus metallico-rubescensibus **f. capitaureum Trautm.**
3. Abdomine toto roseo-violaceo, metallico **f. nitens n. f.**



Explicatio numerorum imaginis: 1. f. typica Rossi, 2. f. bohemicum Špač., 3. f. sudeticum Špač., 4. f. Špačeki m. n., 5. f. nitens m. n., 6. f. nanum Chevr., 7. f. chloropygum Breyss.

4. Abdomine ut apud *f. nitens* m. n., ultimo tantum tergito obscure violaceo aut viridicoeruleo **f. chloropygum Buyss.**
5. Abdomine rubeo, non metallico, ultimo tantum tergito in parte posteriore obscure violaceo **f. bohemicum Špaček.**
6. Abdomine rubeo, non metallico, primo tergito in margine anteriori et partibus lateralibus obscure violaceo; secundo tergito

- cum duabus maculis lateralibus, violaceis, sed intensitate minore quam in primo tergito **f. sudeticum Špaček.**
7. Abdomine in primo et secundo tergito ut apud *f. sudetica* Špač. colorato, maculis tantum in secundo tergito eadem colore ut in tergito primo ac maioribus, tergito tertio maxima in parte nigrocoeruleo intensiter colorato **f. Špačeki n. f.**
In honore professoris C l e m e n s Š p a č e k ex Trutnov, experti *Chrysididarum* appellata.
8. Abdomine toto obscure violaceo **f. nanum Chevr.**
F. nitens n. ubique; non rara. Unicum exemplar *formae Špačeki* n., magnitudine particulariter infimum, in pratis apud P a r k a n (ČSR, Slov.) inveni. Ergo omnes formae illius speciei adhuc notae in Čechoslovakia praesentes.

Augustin Hoffer, Brno:

**NOVÁ VARIETA DRUHU CHRYSIS DICHROA DAHLB.
ZE SLOVENSKA.**

**DE SPECIEI CHRYSIS DICHROA DAHLB. EX SLOVAKIA
VARIETATE NOVA.**

Velmi krásnou varietu *Chrysis dichroa* Dahlb. podařilo se mi nalézt 16. VII. 31 v okolí K o š i c. První abdominální segment, normálně červený, nese u tohoto kusu tmavomodrý, přesně ohraničený trojúhelník, olemovaný úzkým pruhem bleděmodrým, jehož přepona zaujímá celý přední okraj tergitu, vrchol dosahuje až k zadnímu okraji. Celý povrch jest pak místo červený kovově zelený; skulptura, která u tohoto druhu často variruje, jest u našeho exempláře hrubší než obvykle. — U druhu, barvově tak stálého, jakým jest *Ch. dichroa*, jest tato nová varietta velmi pozoruhodná.

Nazývám tuto odchylku:

Chrysis dichroa var. slovaca m. n.

Coloratione thoracis et abdominis clare viride, capite, metanoto et tota parte inferiore corporis obscure coerulea. Multo insigni macula triangulari violaceo-coerulea in primo tergito abd., cuius hypotenusa tota margine anteriore tergiti compressa, culmine attingente a margine posteriore. Macula marginata a stria clare coerulea angusta. Sculptura paulo profundiore quam apud *f. typ.*, praesertim thorace.

Sola femina inventa in regionibus soli expositis apud urbem K o š i c e (ČSR, Slovakia, 16. VII. 1931).

Illa nova varietas distinctissima a me nominata est:

Chrysis dichroa var. slovaca n. var.