luand a recueilli récemment aux îles Seychelles, et qui sera décrit dans un prochain Bulletin. Les Coléoptères trouvés dans les serres ont été soumis à l'examen de M. Bedel, mais ils n'offrent rien d'intéressant et sont représentés par diverses espèces de *Mycetea* et de *Lathridium* qu'on trouve communément dans les caves.

Voici maintenant le résumé de recherches effectuées par MM. Dollfus, Simon, Brölemann, André et Dautzenberg.

Fourmis recueillies dans les serres du Muséum, déterminées par Ernest André.

(Novembre-décembre 1895).

1. *Lasius flavus* Fab. — Espèce très commune en France et abondamment répandue dans la majeure partie de la région paléarctique, ainsi que dans l'Amérique du Nord.

2. *Prenolepis longicornis* Latr. — Espèce importée et qui s'est acclimatée depuis longtemps dans quelques serres chaudes. Elle vit à l'état autochtone en Égypte, en Syrie et dans les régions tropicales des deux mondes. Très commune dans les serres chaudes du Muséum; nous avons observé une fourmilière sous un pot de fleurs.

3. *Ponera coarctata* Latr. — Se trouve en petites fourmilières isolées et assez cachées en France, dans presque toutes les régions paléarctiques et dans l'Amérique du Nord.

4. *Triglyphothrix obesa* André, race *striatidens* Em. — Cette Fourmi, décrite originairement sur des exemplaires de l'Inde et de la Birmanie, a été retrouvée depuis à Sierra-Leone et même en Tunisie; mais sa présence n'avait pas encore été signalée dans les serres d'Europe.

5. *Pheidole megacephala* Fab. — Ne se trouve pas en France sous la forme typique; mais c'est une espèce extrêmement répandue dans les parties les plus chaudes de la région paléarctique ainsi que dans toutes les contrées tropicales ou subtropicales du monde entier. Comme tous les *Pheidole*, elle possède deux castes de neutres bien distinctes : les ouvrières et les soldats.

Digitized by Google