

FORMICHE DELL' ULTIMA SPEDIZIONE BOTTEGO

DESCRITTE DA CARLO EMERY

1. *Dorylus affinis* Shuck.

Dai Badditu a Dimè — un solo ♂ molto grande e di colore scuro, con copiosi peli, che però non credo opportuno separare dal tipo della specie.

2. *D. (Typhlopone) fulvus* Westw.

Dai Laghi Bass Marlé e Bass Narok: numerosi ♀♀.

3. *D. (Rhogmus) fimbriatus* Shuck.

Dai Badditu a Dimè, un ♂.

4. *Aenictus Bottegoi* n. sp.

♂. — Estremamente affine all' *A. fuscovarius* Gerst. cui rassomiglia per grandezza, colore, peli, forma del capo e delle sue appendici. Il peziolo addominale è più largo, alquanto concavo superiormente, coi margini più acuti e gli angoli posteriori più



Aenictus Bottegoi ♂.
Armatura genitale.

marcati che nell' *A. fuscovarius*. Da questa e dall' *A. hamifer* Emery differisce soprattutto per l' armatura genitale, della quale però non ho potuto vedere se non quella parte che trovavasi naturalmente sporgente, non avendo voluto arrischiare di sciupare l' unico esemplare nel preparare questo apparecchio. Lo stipite termina largo e troncato, con angolo apicale interno distinto, però senza formare uncino nè dente; le sagitte sono appena dilatate prima delle loro estremità. La venatura alare e il pterostigma sono bruno-chiaro, come nell' *A. fuscovarius*. L. 6 mm.

Lago Bass Narok, un solo esemplare.

5. **Paltothyreus tarsatus** F.

Dai Badditu a Dimè ♂ ♀ ♂.

6. **Megaloponera foetens** F. ?

Da Sancurar agli Amarr Burgi e da Dimè al Bass Narok, due ♂ ♂
dubbiamente riferibili alla specie.

7. **Leptogenys** sp. ?

Da Sancurar agli Amarr Burgi e da Dimè al Bass Narok: due ♂ ♂.

8. **Odontomachus haematoda** L.

Da Dimè al Bass Narok.

9. **Atopomyrmex Mocquersyi** Er. André.

Dai Badditu al Bass Narok: un ♀. Questa specie si estende
dalla costa di Guinea a Zanzibar ed è verosimilmente diffusa
nel centro dell' Africa.

10. **Messor barbarus** L. var.

Dai Badditu a Dimè, una ♀.

11. **Carebara vidua** F. Sm.

Da Sancurar agli Amarr Burgi, dai Badditu a Dimè, da Dimè
al Bass Narok, ♀ e ♂.

12. **Crematogaster Menileki** Forel.

Dai Badditu a Dimè. Scoperta da Ilg nello Scioa, non era
stata finora ritrovata da altri.

13. **C. Chiarinii** Emery.

Da Dimè al Bass Narok.

14. **C. Chiarinii** var. *cincta* Emery.

Lugh.

15. **C.** sp. ? ♂.

Dai Badditu al Bass Narok, da Sancurar agli Amarr Burgi.

16. **Tetramorium** sp. ? ♂.

Lago Bass Narok.

17. **Acantholepis capensis** Mayr, var. *canescens* Emery.

Dai Badditu a Dimè. — Altri esemplari del Bass Narok sono
quasi totalmente spogliati dei loro peli, per cui è incerto se
spettino a questa o ad altra varietà.

18. **Oecophylla smaragdina** F., subsp. *longinoda* Latr.

Dai Badditu a Dimè ♂, da Dimè al Bass Narok ♀.

19. **Camponotus somalinus** Er. André.

Da Sancurar agli Amarr Burgi e da Dimè al Bass Narok.

20. **C. maculatus** F.

Da Sancurar agli Amarr Burgi, Lago Bass Narok.

21. **C. aqwapimensis** Mayr.

Da Dimè al Bass Narok.

22. **C. rufoglaucus** subsp. **flavomarginatus** Mayr.

Bass Narok.

23. **C. Sacchii** n. sp.

♂ *major*. — Per la forma del torace e del peziolo rassomiglia molto al *C. natalensis* (subsp. *corvus* For.); così pure per la larghezza del capo; ma la forma di questo è diversa, essendo appena debolmente incavato al suo margine posteriore, per cui gli angoli non sono notevolmente sporgenti indietro. Il clipeo è ottusamente carenato e presenta un lobo nettamente troncato in avanti con angoli vivi. Scultura reticolata e punteggiatura come nel *C. natalensis*, ma il capo è opaco superiormente, un poco lucido soltanto sui lati. Le antenne sono più lunghe che nel *C. natalensis*, l'estremo dello scapo raggiunge i 2/3 dello spazio compreso tra l'occhio e l'angolo posteriore del capo (nel *C. natalensis* (*corvus*) giunge circa alla metà di detto spazio). Colore piceo, con le zampe ferruginee.

L. 9 1/2 mm.; capo (senza le mandibole) 3.5 × 3.3; scapo 2.4.

Dai Badditu a Dimè, un solo esemplare.

24. **C. galla** For.

Lago Bass Narok, un ♀.

25. **C. Braunsi** Mayr, subsp. **erythromelus** Emery.

Da Sancurar agli Amarr Burgi, un ♀.

26. **C. chrysogaster** Emery.

Dai Badditu a Dimè, una ♀.

27. **C. sericeus** F.

Da Dimè al Bass Narok, Lago Bass Narok.

28. **C. sp.?** ♂ vari esemplari non determinabili.

29. **Polyrhachis viscosa** F. Sm.

Da Dimè al Bass Narok, una ♀.