

EIN KLEINER BEITRAG
ZUR
NIEDERLÄNDISCHEN AMEISENFAUNA,
VON
E. WASMANN, S. J.

Da mir zu einer ausführlicheren Arbeit über die Ameisen von Holländisch Limburg augenblicklich die nöthige Zeit mangelt, gebe ich nur in Kürze Kenntniss von einigen für unsere Fauna neuen Arten.

Zu *Myrmica rugulosa* Nyl., *Leptothorax acervorum* F., und *Solenopsis fugax* Latr., die Herr Dr. H. Bos bereits in dem Nachtrage zu seiner früheren Arbeit über die Niederländische Ameisenfauna als von mir in Holländisch Limburg neu aufgefunden erwähnt (*Tijdschr.* XXXI, p. 244), sind noch folgende Arten hinzuzufügen:

Formica truncicola Nyl. ¹⁾, ♀, ♂.

Ponera contracta Latr. ²⁾, ♀, ♂.

Myrmecina Latreillei Curt., ♂, ♀, ♂.

Strongylognathus testaceus Schenk., ♂, ♀, ♂ (als Hilfsameisen:

Tetramorium caespitum ♂).

Alle diese neuen Arten sind aus der Umgegend von Exaeten bei Roermond, auch die drei obenerwähnten; *Leptothorax acervorum* habe ich ausserdem bei Blijenbeek (bei Afferden Bez. Gennepe) im nördlichen Limburg gefunden. Die Zahl der bisher bekanten Niederländischen Ameisenarten beträgt hiemit 33. Vgl. Dr. H. Bos, « *Iets over de Nederlandsche Mierenfauna* » (*Tijdschr.* XXX, p. 198) und « *Rectificatie* » (XXXI, p. 244).

1) E. André (*Spec. d. Hyménopt.* II) folgend führe ich *truncicola* Nyl. als Species auf, obgleich Forel's Ansicht, dass sie als Rasse von *rufa* L. zu betrachten sei, sehr wahrscheinlich ist. Die von Herrn H. Bos erwähnte *F. truncicola* ist *truncicola* Först. = *rufa* L.

2) Die von Herrn H. Bos ausgesprochene Vermuthung, dass diese Art auch in Holland sich finden müsse (*Tijdschr.* XXX, p. 192), hat sich somit bestätigt.
