


BULLETIN

ENTOMOLOGIQUE.

ANNÉE 1852.

QUATRIÈME TRIMESTRE.



SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.



(Séance du 13 Octobre 1852.)

Présidence de M. BOISDUVAL, vice-président.

M. Westwood assiste à la séance.

Communications. M. H. Lucas fait part à la Société que, profitant d'un congé de convalescence, il vient de faire un voyage dans le département de la Gironde, où, après un très court séjour à Bordeaux, il est allé visiter la Teste et les forêts de Pins maritimes qui couvrent une grande partie du département des Landes. Il a été à même d'observer un assez grand nombre d'insectes de divers ordres dont il donnera la liste dans un travail qu'il prépare à ce sujet. Il fait aussi remarquer que jusqu'à présent cette partie de la France avait été fort peu explorée, et que les Crustacés, les Arachnides, les Myriapodes, les Thysanoures, et même les Lépidoptères y ont été beaucoup négligés. Il espère donner prochainement un aperçu des espèces représentant ces diverses

2^e Série, TOME X.

Bulletin VI.

être une femelle, mais qui décidément est un mâle. Dans la femelle le bouton est plus court que dans le mâle et ne semble plus composé de plusieurs articles ; de sorte que je ne compte en total que huit articles dans les antennes de ce sexe.

Maintenant il nous faut encore une explication de la part de M. de Romand sur l'insecte qu'il a regardé comme étant le mâle du *Masaris vespiformis*, mais qui probablement n'entre pas du tout dans ce genre.

Je ne finirai pas cette note sans exprimer mon opinion, que le *Celonites dispar*, Dufour, ne me semble pas appartenir à ce genre, mais d'être plutôt un *Ceramius*, voisin du *C. Fonscolombii*, Latr., mais bien plus petit. M. de Romand nous a appris que Latreille était du même avis.

—On communique la note suivante de M. H. Lucas au sujet d'une nouvelle espèce d'*Ixodes*, parasite du *Cyclura Harlani*, Duméril et Bibron, Saurien, vivant actuellement à la Ménagerie du Muséum :

Ixodes variegatus, Lucas.

Long. 4 millim. Lat. 3 millim.

I. Capite anticè acuminato, testaceo, fusco-rubescente maculato; palpis elongatis, primo articulo testaceo subtiliter fusco variegato, terminali omninò fusco-rubescente; abdomine ovato, fusco nitido, ad latera flavescente maculato, subtiliter fusco-rufescente punctato in medio fusco-rubescente uni-lineato infràque fusco testaceo; pedibus elongatis, testaceis, subtiliter fusco maculatis. (Fœminâ ignotâ.)

Mâle. La tête plus large que longue, terminée en pointe à sa partie antérieure, arrondie de chaque côté de sa base, avec sa partie postérieure légèrement concave, est assez convexe ; elle est testacée, maculée de points d'un brun-rougeâtre, arrondis, peu serrés. Le suçoir est testacé. Les palpes, un peu plus allongés que le suçoir, ont leur premier article testacé ; quant au suivant ou terminal, il est entièrement d'un brun-rougeâtre. L'abdomen, finement marginé de jaune, est ovalaire, avec sa partie postérieure un peu plus large ; il est d'un brun-rougeâtre brillant foncé, marginé de cette couleur.

mais beaucoup plus claire sur les côtés et postérieurement ; il est maculé de jaune , et ces taches , au nombre de six , dont les postérieures sont les plus grandes , sont séparées entre elles par de petites lignes d'un brun-rougeâtre clair ; de chaque côté de l'échancrure , dans laquelle la tête vient s'insérer , on aperçoit deux petites taches jaunes , presque conjointes. Lorsqu'on examine à la loupe les taches que je viens de signaler , on voit qu'elles sont finement ponctuées de brun-rougeâtre. Postérieurement , l'abdomen paraît comme découpé , et cela est dû à des taches d'un brun-rougeâtre foncé , séparées entre elles par de fines lignes jaunâtres ; dans son milieu , il présente une ligne longitudinale d'un brun-rougeâtre foncé de chaque côté de la partie antérieure , de laquelle on aperçoit une petite tache jaune ; en dessous , il est d'un brun-testacé , avec son bord postérieur orné de taches arrondies d'un brun-rougeâtre. Les pattes sont allongées , testacées , finement maculées de brun-rougeâtre , avec les hanches présentant à leur côté interne un petit tubercule épineux.

C'est dans le voisinage des *Ixodes Gervaisii* et *flavo-maculatus* que vient se ranger cette espèce ; elle ne pourra être confondue avec le premier ou l'*I. Gervaisii* , Lucas , à cause de sa taille qui est plus allongée et moins transversale ; les taches qui ornent les parties latérales de son abdomen , au lieu d'être continues , sont séparées , et de plus , la partie médiane de cet organe est dépourvue de tache transversale jaune. Elle ressemble un peu aussi à l'*Ixodes flavo-maculatus* , Lucas , mais les taches présentées par les parties latérales de son abdomen sont plus nombreuses , arrondies et non longitudinales , ou plutôt sous la forme de bande , comme cela a lieu pour l'*I. flavo-maculatus*.

Cette espèce , dont je ne connais que le mâle , a été prise par M. Valée sur le *Cyclura Harlani* , Dum. et Bibr. ; ce Saurien a pour patrie la Havane.

— M. Deyrolle informe ses collègues qu'il est chargé de la vente de la collection entomologique qui a été laissée par feu Vaudouer. Elle se compose en grande partie de Coléoptères recueillis aux environs de Nantes , au nombre d'environ 6 à 7 mille , de quelques espèces de l'Amérique septentrionale , et d'un petit nombre d'insectes des autres ordres. Tous ces insectes sont préparés

avec le plus grand soin, et leur état de conservation ne laisse rien à désirer, la plupart portent une étiquette indiquant son habitat, l'époque où il a été trouvé, et souvent d'autres annotations intéressantes. Outre sa collection, Vaudouer a laissé aussi de nombreux manuscrits, fruit de ses recherches sur les insectes, et une correspondance fort curieuse avec Latreille, qui faisait grand cas de ses observations et qui l'a plusieurs fois cité dans ses ouvrages ; car c'est à lui qu'il a dédié le *Serropalpus Vaudoueri*.

La collection, qui renferme de nombreux doubles, sera vendue en totalité ou par portions, selon les propositions qui en seront faites, les manuscrits et la correspondance pourront y être joints si on le désire.

Lectures. M. L. Buquet lit une note contenant la description d'un Longicorne nouveau, qu'il nomme l'*Ancistrotus uncinatus*; et il fait passer sous les yeux de ses collègues un dessin de cet insecte.

— M. Jacquelin-Duval offre à la Société, au nom de son ami M. Philippe Lareynie, une note intitulée : Description de trois nouvelles espèces de *Ptiniore*s, Latr. Voici les noms et les diagnoses de ces trois insectes remarquables :

PTINUS DUVALI, Lareynie, Long. 0,0035-40. — Thorace quadrituberculato; postice fortiter coarctato, fulvo-pubescente, medio leviter albido variegato; elytris oblonge-ovatis, subparallelis, obscuris seu brunneis, squamulis albidis lateribus late dense vestitis, dorso atque antice plus minus ve denudatis; fortiter punctato-striatis, interstitiis æqualibus, planis; antennis brunneis; pedibus ferrugineis. Fem. — Montpellier.

XYLETINUS RUFITHORAX, Lareynie. Long. 0,0045-50. — Elon-