

anneau noir à l'extrémité; toutes les cuisses courtes et renflées, les postérieures noires. Abdomen en massue, le 1er segment entièrement jaune, le 2e avec une bande noire à la base, les suivants noirs avec une bande jaune au sommet. — Toronto (Brôdio).

8. Cténisque à-orbites-blancs. *Cteniscus orbitalis* Cress.
—Proc. Ent. Soc. Phil. III, 283.

♀—Long. .24 pce. Roux, varié de blanc et de noir; la face, le chaperon, les mandibules, les joues remontant jusqu'au haut des yeux, les orbites frontaux, blanc. Tête grosse, épaissie en arrière des yeux, noire sur le vertex et postérieurement. Antennes presque aussi longues que le corps, noires, la moitié apicale jaunâtre. Thorax fauve, poli, une tache noire au milieu en avant de l'écusson, les écailles alaires, une petite ligne en avant, une autre au bas des côtés de la poitrine, blanchâtres; les écussons blancs avec leurs environs noirs. Métathorax entièrement fauve, les lignes soulevées bien distinctes, formant une aréole centrale allongée. Ailes hyalines, le stigma grand, noir avec une tache pâle à la base; l'aréole petite, oblique, pétiolée. Pattes fauves, les 4 haniches antérieures blanchâtres. Abdomen subsossile, en massue, poli, fauve, légèrement obscurci à l'extrémité.—Ottawa (Harrington).

Gen. *ERRONEMUS*, Holmg., p. 423.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

5. Erronème triste. *Erronemus tristis*, n. sp.

♀—Long. .28 pce. Noir; tête en carré transversal, la face sans taches, à pubescence jaunâtre. Antennes sétacées, noires, plus longues que la tête et le thorax réunis. Thorax épais, court, distinctement ponctué; l'écusson proéminent, fortement excavé en avant, caréné au sommet, sa surface rugueuse; métathorax très court, à lignes soulevées très prononcées, formant une aréole presque carrée sur le dos. Ailes légèrement obscures, les nervures et le stigma, noir, l'aréole pédiculée brièvement, en parallélogramme oblique. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec leurs tarsi d'un jaune sale, les jambes postérieures tachées de jaune pâle à la base en dehors. Abdomen sossile, en ovale, épais, les 2 premiers segments subrugueux, les autres polis quoique

ponctué, le 1er caréné sur les côtés et portant sur son disque 2 autres carènes atteignant le sommet.—Ottawa (Harrington).

Espèce bien remarquable par sa sombre coloration.

6. Erronème moitié-roux. *Erronemus dimidiatus*, Cress.—Trans. Am. Ent. Soc. II, 108.

♀—Long. .28 pcc. Noir avec les pattes et partie de l'abdomen roux. Tête large, à courte pubescence jaunâtre, la face finement ponctué, le chaperon roussâtre. Antennes moyennes, noires, roussâtres à l'extrémité. Thorax court et robuste, pubescent, l'écusson proéminent, caréné au sommet, sa surface légèrement ponctué; métathorax à lignes soulevées formant une aréole allongée au milieu. Ailes hyalines, le stigma et les nervures, brun-foncé, l'aréole petite, subsessile, en triangle irrégulier, les nervures roussâtres à la base, les écailles alaires noires. Pattes rousses, les cuisses renflées, les jambes postérieures avec une tache pâle à la base en dehors; toutes les hanches noires. Abdomen en ovale allongé, noir avec les segments 2, 3 et 4 plus ou moins roux, le 1er avec ses 2 carènes dorsales atteignant le sommet, l'extrémité à pubescence jaunâtre.—Ottawa (Harrington).

Espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. *Bassus*, Fabr. pp. 427 et 798.

Aux 18 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent :

19. Basse cylindrique. *Bassus cylindricus*, n. sp.

♂—Long. .20 pcc. Noir, grêle; la face sans tache, avec pubescence grisâtre, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, une petite ligne en avant, blanc. Antennes filiformes, à peine plus longues que la tête et le thorax. Mésothorax à lobes distincts; écusson sans tache; métathorax avec un petit sillon au milieu bordé par 2 carènes. Ailes hyalines, le stigma et les nervures, brun, aréole en triangle irrégulier, sessile. Pattes jaune miel, les hanches antérieures avec tous les trochanters, et les 4 jambes antérieures, blanc, les jambes postérieures blanches avec un anneau noir à chaque extrémité, leurs tarsi aussi blancs avec le sommet des articles noir. Abdomen allongé, cylindrique, les 2

premiers segments rugueux, le 1er avec 2 carènes dorsales. — Ottawa (Guignard).

♀—Le scapo et les écailles alaires à peine tachés de blanc; les pattes d'un jaune miel uniforme avec les jambes postérieures et leurs tarsi, noir, les premières avec un large anneau blanc au milieu.—CapRouge.

20. Basse dorsal. *Bassus dorsalis*, n. sp.

♀—Long. .16 pce. Noir avec les pattes jaunes; le chaperon, les mandibules, les palpes, le scapo en dessous avec les écailles alaires, blanc. Antennes plus longues que la tête et le thorax, noirâtres. Métathorax avec une aréole dorsale. Ailes hyalines, sans aréole, le stigma jaunâtre. Pattes jaunes, les postérieures avec les jambes et les tarsi plus ou moins obscurs. Abdomen avec une tache jaune dorsale sur les segments 2 et 3, le premier allongé, à peine plus large à l'extrémité, les autres fusiformes dans leur ensemble.—CapRouge, Ottawa (Guignard).

Voisin de *Pagilis*, mais s'en distinguant par son thorax, sa plus petite taille etc.

21. Basse à-écusson-blanc. *Bassus scutellaris*, Cress.

—Trans. Am. Ent. Soc. II, 112.

♀—Long. .22 pce. Noir, la face, le chaperon, les mandibules, les joues, les orbites antérieurs, le scapo en dessous, les écailles alaires, un point en avant, une petite ligne au dessous, une ligne sur les lobes latéraux du mésothorax, l'écusson et le post-écusson, la poitrine avec une strie sur les flancs, les 4 hanches antérieures avec tous les trochanters, blanc. Antennes filiformes, plus courtes que le corps, brunâtres en dessous. Thorax finement ponctué, le métathorax obliquement rugueux au milieu, cette partie séparée du reste par 2 carènes divergentes au sommet. Ailes hyalines, les nervures et le stigma brunâtres, point d'aréole. Pattes d'un beau jaune-miel, l'extrême sommet des cuisses postérieures avec leurs jambes excepté un large anneau blanc au milieu, et leurs tarsi, noir. Abdomen subdéprimé, les trois premiers segments rugueux excepté sur leur marge apicale, le reste poli, brillant; le premier segment avec un point blanc au sommet au milieu, 2 et 3 avec leur marge apicale rousse portant une petite tache blanche de chaque côté. CapRouge.

Bien distinct du *sycophanta* par sa coloration.

n. sp.
gnes
latée
le se
une
avec
Thor
carèn
més
ma b
l'extr
posté
noir à
A
guant
A
3
n. sp.
♂
miel;
longue
milieu.
thorax
un sillo
Ailes n
petite e
les hanc
lin'aire
le prem
à son m

Gen. EXOCHUS, Grav. p. 436.

Aux 5 espèces rencontrées, ajoutez la suivante.

6. Exoque taché de-roux. *Exochus rufomaculatus*,
n. sp.

♀—Long. .20 pcc. Noir varié de roux ; la face avec des lignes orbitales continuées jusque sur le vertex où elles sont dilatées en petit triangle, le chaperon, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires avec un point en avant et une ligne sur les bords du prothorax, les 4 hanches antérieures avec leurs trochanters, blanc. Antennes brunâtres à l'extrémité. Thorax à pubescence grisâtre, le métathorax poli, brillant, sans carènes distinctes ; les écussons avec une tache sur les flancs du méso et du métathorax, roux. Ailes hyalines, à nervures et stigma brun-foncé, sans aréole. Pattes rousses, à cuisses renflées, l'extrémité des cuisses, des jambes et des articles des tarse des postérieures, brun-foncé. Abdomen allongé, cylindrique, roux, noir à la base et à l'extrémité.—Ottawa (Harrington).

Assez semblable au *lavis* par sa forme, mais s'en distinguant par sa coloration.

Gen. COLEOCENTRUS, Grav. p. 440.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Coléocentre pieds-jaunes. *Coleocentrus mellipes*,
n. sp.

♂—Long. .63 pcc. Noir avec les pattes d'un beau jaune-miel ; Tête en carré transversal, sans aucune tache. Antennes longues, grêles à l'extrémité, avec un large anneau jaune vers le milieu. Thorax finement ponctué ; écusson convexe, le métathorax de forme cubique, granulé-rugueux, sa face dorsale avec un sillon au milieu bordé de chaque côté d'une petite carène. Ailes notablement obscurcies, avec une aréole triangulaire très petite et longuement pédiculée. Pattes d'un beau jaune miel avec les hanches et les trochanters d'un noir de poix. Abdomen allongé, linéaire, les segments 1 et 2 rugueux à la base, le reste poli, lisse, le premier 2 fois aussi long que le 2e, portant une double carène à son milieu.—(Geddes) Montagnes Rocheuses.