

XXVI. Kurze Beschreibung verschiedener neuen, oder noch wenig bekannten Thiere, welche Herr Le Blond der naturforschenden Gesellschaft zu Paris aus Cayenne als Geschenk überschickt hat *).

(Actes de la Societé d'Histoire naturelle de Paris. T. I. p. 115. etc.)

I. QUADRUPEDA **).

Primates.

Vespertilio (*barbipes*) caudatus niger, auribus plicatis, subcoadunatis, pedibus posterioribus apice barbatis. —

Chauve-souris de la Guyanne. Buff. Suppl. 7. p. 294. t. 75.

Ferae.

Canis (tetradactylus) cauda recta, nigra, subtus rufa, pedibus tetradactylis. (Vulgo) Chien sauvage de Cayenne.

Viverra (cancrivora), supra fusco adpersa, infra flavo-fulva; capite cinereo, macula nigricante oculis circumacta. —

(Vulgo) Chien crabier de Cayenne.

An Viv. Narica junior, cauda nondum annulata?

Didelphis (flavescens) flavescens cauda basi pilosa corpore longiore, orbitis antice fuscis; linea fusca a naso ad occiput.

A V E S ***).

Falco (discolor) super, universe saturate griseus; subtus, pectore, abdomine, cruribusque saturate ferrugineis; tectricibus inferioribus caudae et alarum albis.

Lanius

*) Das vollständige Verzeichniß der an die Gesellschaft geschickten Säugthiere, Vögel, Amphibien, Insekten und Konchylien hier zu liefern, halte ich für höchst überflüssig. Ich hebe daher bloß diejenigen aus, die noch nicht bekannt sind. R.

**) Diese sind von Herrn *Alexander Brongniart* beschrieben worden.

***) Ihre Beschreibung rührt von den Herren *Richard* und *Bernard* her.

Lanius (ferruginatus) supra totus faturate ferrugineus; subtus dilute rufescens; remigibus introrsum nigricantibus: fronte subcristato ferrugineo: occipite, genisque variegatis.

Picae.

Picus (nigro-flavus), capite, collo, summoque dorso nigris; remigibus intimis pectoreque flavescentibus nigricante admixto, interioribus rufis: rectricibus nigricantibus.

*Trochilus [elegans]**) super viridis subaureo-micans: gutture viridi micante, rectricibus utrinque violaceis, summitate duabusque mediis coeruleo-nigricantibus.

Trochilus [ferruginatus] collo, corporeque utrinque viridibus: gutture aureo-micante: tetricibus alarum interioribus et quatuor rectricum ferrugineis.

Trochilus [variegatus] super ima fronte, rectricibus alarum caudaeque viridibus: collo utrinque, pectore et abdomine rubello aureoque micantibus: gutture viridi micante: rectricibus alarum interioribus ferrugineis.

Trochilus [notatus] super univérse viridis, subtus viridis micans, summo gutture coeruleo-micante. Rectricibus omnibus utrinque chalybaeo-coeruleis.

Anferes.

Larus (griseolus) supra albido-cinerefcens; subtus totus albus: remigibus supra griseo-nigricantibus: rostro pedibusque nigris.

Larus [frontalis], *Hirondelle de Mer brune de la Louisiane*. Buff. entom. 997.

Univérse obsolete griseus, fronte subalbida; rostro longiore rectiusculo nigro.

Grallae.

Ardea (griseo-alba) super fufcescenti grisea. Pectore, ventre, cruribus, tetricibus inferioribus caudae et alarum candidis: collo subtus ferrugineo variegato.

Ardea (. . . .) Linn. (Actes etc. no. 60.)

*) Die mit Klammern bezeichneten Trivialnamen sind von mir gewählt. R.

Scolopax (bicolor). *Petite Bécassine de Mer*.

Super subolivaceo-grisea; subtus fordide alba, alis tamen caudaque partim griseis: rostro, capite sesqui-longiore, pedibus luteis.

Passeres.

Columba (rufaxilla) supra tota griseo-fusca; abdomine subalbido; tectricibus inferioribus alarum saturate ferrugineis: rectricibus infimis apice albis.

Turdus (. . . .) affinis *T. senegalensi*. Linn. ed. Gmel. pag. 823.

Loxia (femitorquata) supra griseo-nigricans; capite, rectricibusque nigris: alis griseo-marginatis et albo-submaculatis: subtus griseo-albidus; torque concolore incompleto.

Tanagra (. . . .) *Tangara de la Guyane*. Buff. enlum. 742. (Actes etc. no. 86.)

Tanagra (. . . .) *Tangara pourpré de Cayenne*. Buff. enlum. 128. fig. 1. (Actes etc. no. 93.)

Tanagra (. . . .) *Femelle du Tangara pourpré de Cayenne*. Buff. enlum. 128. fig. 2. (Actes etc. no. 94.)

Tanagra (. . . .) *Tangara à tête rousse de Cayenne*. Buff. enlum. 290. fig. 1. (Actes etc. no. 95.)

Fringilla (. . . .) affinis *Fringillae domesticae*. Linn. edit. Gmel. pag. 925. (Actes etc. no. 96.)

I N S E C T A *).

Eleuterata.

Scarabaeus [clavatus] scutellatus muticus piceus, clava antennarum majori elongata.

Magnitudo *Scar. Philoctet. Oliv.*

Helops Nigrita Fabr.?

Tenebrione molitore duplo major. Corpus supra atrum, subtus piceum.

Thorax subquadratus. Elytra striata, striis punctatis.

Helops [aeneus] niger, elytris nigro-aeneis, violaceo-nitentibus.

Erotylus [marginatus] flavescens, elytris nigro-violaceis, flavo marginatis.

Melo-

*) Beschrieben von Herrn Olivier.

Melolontha [irregularis] pallide testacea, elytris maculis irregularibus flavescens.

Melolontha rustica paulo minor. Corpus totum pallide testaceum, tarsis fuscis, maculisque irregularibus flavis supra elytra.

Prionus [nobilis] thorace unidentato, viridi-coeruleus, nitidus, tibiis posticis compressis.

Oliv. Ent. Prion. tab. 3. fig. 10.

Lamia [unifasciata] cinerea, elytris fascia lata alba, punctis nigris elevatis notata.

Staphylinus [abdominalis] capite thoraceque nigro-coeruleis, corpore nigro, abdomine apice fulvo.

Magnitudo et statura *Staphylini maxillofi*. Alae fuscae.

Ulonata.

Forficula [thoracica] nigra, thorace flavo, forcipe simplici.

Mantis (. . . .) corpore fusco lineari longissimo. (Larva).

Piezata.

Sphex [Olivieri] atro-coerulescens, antennis alisque fusco-ferrugineis.

Magnitudo et statura *Sph. Druryi* (Illustrations of Insects Tom. III. tab. 1.). At in specimine nostro pedes corpore concolores; alae fusco-ferrugineae immaculatae. Petiolus brevissimus.

Sphex [bispinosa] glabra viridi-coerulea nitida, thorace postice bispinosa.

Magnitudo media. Mandibulae arcuatae nigrae. Thorax postice spinis duabus validis acutis armatus. Pedes corpore concolores. Alae fuscescentes. Petiolus brevis.

Sphex [coerulescens] atro-coerulescens, alis nigro-violaceis.

Magnitudo media. Petiolus brevissimus.

Sphex [splendida] nigra, thorace tomento fugaci aureo, antennis versus apicem fulvis.

Magnitudo media. Petiolus brevis.

Sphex [tricolor] nigra, abdomine pedibusque ferrugineis, alis violaceis.

Sph. fabulosa major et crassior; petiolus brevissimus.

Vespa [cayana] abdomine petiolato, corpore fusco-flavescente, alis fuscis.

Vespa [*picipes*] nigra, antennis pedibusque piceis.

Apis [*obscura*] hirsuta atra, alis fuscis.

Apis [*abdominalis*] hirsuta fulva, abdomine fusco, ano rufescente.

Frons flava, thorax hirsutus fulvus. Alae fuscescentes.

Apis [*zonaria*] fusca, abdomine fasciis fusco - flavescens.

Apis [*frontalis*] thorace cinereo hirto, abdomine fusco ferrugineo, fronte flavo - maculata.

Formica [*ovata*] nigra nitida, abdomine oblongo - ovato.

Similis *Formicae aculeatae Oliv.*, at thorax laevis et abdomen ovato-oblongum.

Formica [*octospinosa*] fusco - ferruginea, capite thorace multispinosis, abdomine tuberculato.

Caput magnum spinis tuberculisque plurimis armatum. Thorax octospinosus. Abdomen tuberculatum.

Formica [*melanophthalma*] rufa inermis, oculis nigris.

Formica [*picipes*] nigra, pedibus piceis.

Formica [*tomento/a*] nigra tomento fugaci aureo tecta, pedibus piceis.

Odonata.

Libellula [*immaculata*] ferruginea, alis immaculatis.

Similis *L. depressae*, et alae immaculatae, puncto ordinario marginali nigro. Corpus fusco - ferrugineum.

Libellula [*cayana*] alis albis, abdomine flavescente nigrofasciato.

Libellula [*angulata*] alis albis apice fuscis.

Agrion [*variegata*] alis albis immaculatis, corpore rubro variegato.

Agrion [*Caja*] alis albis, basi rubris.

Libellula Caja, *Drury Illustr. tab. 45. f. 2.*

Agrion [*angulata*] alis reticulatis hyalinis apice albis; corpore lineari elongato.

Unogata.

Phalangium [*variegatum*] fusco - ferrugineum, supra flavo - variegatum, postice spinis duabus erectis armatum.

Phalangium [*spinosum*] lividum, postice spinis duabus erectis armatum; palpis elongatis, apice incrassatis, spinosis.

Glossata.

Phalaena [*subconcolorata*] antennis fetaceis, alis nigris; anticis vitta abbreviata maculaque apicis transversis flavis.

Parva, alae posticae nigrae, limbo margineque interiore flavis. Subtus alae omnes concolores. Corpus nigrum utrinque vitta flava.

Ryngota.

Tettigonia [*punctata*] capite, thorace, elytrisque nigris flavo-punctatis.

Caput supra nigrum, vertice puncto flavo. Thorax niger, punctis duobus flavis. Scutellum nigrum, puncto flavo. Elytra nigra, singulo punctis sex flavis. Alae nigrae, immaculatae. Corpus subtus pedesque flava.

Tettigonia [*thoracica*] thorace nigro, capite elytrisque fusco-purpureis.

Stoll. Cicad. tab. 21. fig. 112.

Cimex [*scutellum*] ovatus, thorace spinoso nigro antice flavo, scutello flavo macula media nigra.

Similis Cim. *albicolli*. Caput flavum antice nigro-marginatum. Elytra nigra immaculata. Corpus subtus flavum nigro-maculatum. Pedes nigri.

Cimex [*seriatus*]. Stoll. Cim. tab. 28. fig. 194.

Antenne nigrae articulo ultimo flavo. Caput nigrum. Thorax muticus niger linea media marginibusque lateralibus rubris. Scutellum nigrum apice punctoque baseos rubris. Elytra nigra. Corpus ovatum subtus nigrum, abdominis margine punctisque utrinque feriatis rubris. Pedes nigri.

Cimex [*unipunctatus*] niger elytris puncto minutissimo albo.

Magnitudo media. Antennae nigrae articulis duobus ultimis flavescens. Corpus ovatum muticum nigrum, rostro tarsisque fuscis. Elytra puncto minutissimo notata. Thorax antice utrinque subauriculatus.

Cimex [*undatus*] oblongus fuscus elytris striga undata punctoque cinereis.

Minor. Pedes cinereo-annulati.

Cimex [*clavatus*] oblongus, thorace spinoso, fusco-rufescens, femoribus posticis clavatis dentatis nigro-maculatis.

Magnitudo et statura *Lyg. calcarati*; at differt thorace spinoso, abdomine supra concolore, femoribus posticis crassioribus minus dentatis et nigro-maculatis.

Cimex [*verticalis*]. *Stoll. Cim. tab. 41. fig. 294.*

Caput nigrum linea verticis flava. Thorax niger, maculis quinque flavis. Scutellum nigrum basi apiceque flavum. Elytra hyalina nigro-venosa. Pectus nigrum flavo-variegatum. Abdomen pedesque pallide rufa.

Reduvius [*fiffus*] niger, elytris fuscis rubro-venosis, scutello apice fisso.

Magnus. Antennae fuscae articulo primo nigro. Caput, thorax, scutellum, corpus subtus nigra fusco-ferrugineo-varia. Thorax postice rubro-fasciatus. Scutellum nigrum apice emarginatum aut fissum.