

Exercitationes

Hymenopterologicæ

Ad illustrandam

Faunam Svecicam,

Heit FABRIK TUNDMALER

Venia Ampliss. Facultatis Philos. Acad. Lund.

Proponunt

GUSTAV DAHLBOM,

Historia Natur. Doc., Societ. Linn. Holm. Membr.

PETRUS BLOMBERG, *xref*

V. P. Minister

0-9-11

In Acad. Carolina die vi Aprilis mcccxxxiii.

Part. VI.



LONDINI GOTHORUM.

**TYPIS EXCUDIT C. F. BERLING,
UNIVERSITATIS TYPOGRAPHUS.**

DIALOGUE IN MEDIEVAL.

*Prosten öfver Åslands Contract,
Kyrkoheren i Mörlunda och Tweta För-
samlingar af Linköpings Stift,*

**Högärevördige och Höglärde Magister
Herr FABIAN LUNDWALL,**

*Prosten och Kyrkoheren i Hvena Försam-
ling af Linköpings Stift,*

Högärevördige och Höglärde

Herr JOHAN NEUVIJK,

*Comministern i Mörlunda och Tweta För-
samlingar af Linköpings Stift,*

Välärevördige och Höglärde Magister

Herr ER. AD. BERGENHAGEN,

I
helgas dessa blad

med vördnadfull tacksamhet

TITAN EKONOMI C. L. DERRING

af

PEHR BLOMBERG.

Monographia

Evanialium Sveciae.

(Familia 3:tia *Latreille.*)

EVANIALES

Latr. Fall.

Antennæ extensæ, validæ, setaceæ aut filiformes, medio frontis insertæ, 13-14-articulatæ.

Abdomen petiolatum, compressum, superne in metathoracis tergo insertum.

Aleæ superæ parum nervosæ, areis 2-5 completis; inferæ, præter nervum costalem, enerves.

Corpus magnum, medium aut minutum, impresso-punctatum, coriaceum. Maxillæ et labium promiscidem minutam vaginant. Palpi filiformes, elongatuli, penduli; maxillares 6-, labiales 4-articulati. Mandibulæ pro ratione capitis validæ, trigonæ, intus denticulatae. Antennæ (in nostris) longitudine capitis cum thorace; scapo crasso, elongato, pedicello brevissimo. Thorax gibbus. Prothorax brevissimus, humilis. Mesothorax magnus, altus, præcedenti incumbens; scutello semilunato, mediocri. Metathorax subcancellatus, declivis, cui superne, prope scutellum, abdomen insertum. Articulus tarsorum unus reliquis conjunctis longitudine subæqualis.

Differentia sexus varia; in oviductu seminarum plus minus exerto normalis quærenda.

Habitatio. Imagines, motu volatuque segnes, in pratis, sylvis lucisquæ umbrosis occurunt, flores et folia plantarum visitantes; etiam in truncis cariosis, sepibus parietibusque deprehenduntur.

Evania.

Latr. Gen. Crust. & Ins. II. 435. Fall. Method.
Hymen. disp. 24. Cuv. Regne Anim. 1817. III.
466. Fabr. Walck. &c.

Caput transversum semiglobosum, thoraci approximatum. Antennæ setaceæ, arcuatae, 13-articulatae. Thorax tetragonus. Abdomen minutissimum, compressissimum lentiforme, petiolo valido, arcuato, in medio postfreni tergo insertum.

Corpus (in nostris) minutum, tamen pro ratione magnitudinis robustum, vix una linea longius, scabro-punctatum. Labium coriaceum, tubulosum, glossarium infra vaginans, apice emarginatum. Pupi maxillares labialibus maxillisque multo longiores. Mandibulæ denticulis 4: externo majori, intermediis minutis, interno emarginato. Clypeus transversus, brevis. Facies et frons longitudinaliter bisulcata. Flagellum antennarum medio subincrassatum. Ocelli ovati, parvi. Ocelli minuti lineam subrectam formant. Abdomen segmentis 6 (an 7 in mare?); 1:mo petiolum validum, arcuatum efficiente Alæ superæ areis completis 2 basibus, spatio inter nervos costalem et auxiliarem minime computato; nervo costali ante apicem alæ desinente. Pedes validi; femoribus incrassatis, praesertim posticis.

Differentia sexus in mare antennæ longiores, graciliores; abdomen ovatum, minus; — in femina antennæ breviores, crassiores; abdomen majus, trigonum, apice truncatum, ano subacute, oviducte parumper exerto.

I. *E. minuta*: atra, sericeo-nigra, scabro-punctata, abdomine polito; palpis tibiariisque spinis ordinariis fusco-testaceis: aliis micantibus.

Mas: pedibus nigris, raro geniculis testaceis.

Femina: pedibus nigris, tibiis tarsisque, anteriores testaceis, rarus tibis posticis basi apiceque concoloribus.

Fabr. Ent. Syst. a. 194. 5. Ejusdem Piez. 179.
4. *Euanie Naine* Walck. Faun. Paris. 2. 76. 1. Latr.
I. e. pag. 252. Coquib. Illustr. Pl. 4. fig. 9. apud
Walck.

Habitatio. Per totam Europam, licet nullibi frequenter, occurrit. Intra patriam nostram a Scania ad Lapponiam meridionalem usque procedit; mensibus Junio, Julio, Augusto imprimis querenda. In Lapponia Umensi ad Almosele in Hemberget d. 24 Julii atque ad Lycksele d. 2 Augistii a Præside capta.

Descriptio. *Mas* et *Fem.* Longitudinem unius fineæ vix superans. Scabro-punctata abdominellævisissimo, nitidissimo quasi polito. Caput, thorax abdominisque petiolus pube sericea albo-micante et pilis nigris adspersa. Pedes albo-pubescentes. Etiam in abdome ad certum situm luminis pubescentia vagga detegitur. Color corporis aterrimus, excepta pauporum pedumque pictura jam in diagnosi notata.

Not. In magnitudine partium corporis notanda mensuram svecanam, 8 lineas in singulo pollice continentem, posthac semper adhibuimus.

Fœnus.

Latr. Gen. Crust. & Ins. III. 436. Fall. Method.
Hymen disp. 24. Cuvier Regn. Anim. 1817. III.
466. Fabr. Walck. &c. — *Ichnemon* Linn. Ebr.
Reaum. De-Geer. Ross. — *Gasteruptio* Latr.

Caput ovatum, collo elongato a thorace disjunctum. Antennæ filiformes, porrectæ, 13-14-articulatæ. Thorax angustus compressusculus. Abdomen elongatus, subfalcatus, in postfreni margine antico insertum. Tibiae posticæ clavatae. Articulus tarsorum anticorum

primus infra basin sinuatus, sinu velum excipi-
ente et abscondente.

Corpus magnum, elongatum, angustum. Promiscis in quiete duplicita. Labium obconicum. Palpi maxillares maxillis elongatis breviores; labiales labii longitudine. Glossarium elongato-cordatum. Orbita promiscidis jugulique marginata, utraque approximata. Labrum longitudinale, lineare. Clypeus transversus, subirigonus, margine apicali undulatus. Oculi magni, ovati. Ocelli verticis triangulariter dispositi. Mesothoracis lobus anticum elongatus, quadrangulus, marginatus, punctisque profundiis intra marginem impressus; medio per seriem punctorum arcuatam in areas 2 divisus. Scutellum quoque ejusmodi serie arcuata utrinque ornatum. Abdomen compressum elongato-conicum, paullulum arcuatum et subfalcatum, capite cum thorace duplo longius et ultra, apice sublavato; segmentis distinetis 7—8: 1:mo io petiolum cylindricum coarctato, reliquis gradatim dilatatis. Alas superas medium abdominis excedentes, areis completis 5: costalibus 3:bus, basali 2:da, et discoidalis unica minuta trapezina.

Differentia Sexus in mare mandibulæ denticulis 2: externo magno, interno minuto; Antennæ 13-articulatae; abdomen 8-segmentatum; — in *femina* mandibulæ denticulis 3: externo magno, medio minuto, interno transverse exseruo; antennæ 14-articulatae; abdomen 7-segmentatum; oviductus setaceus, extra anum longe productus, terebra e lamellulis 2 setiformibus, lateralibus, rejiciendis vaginata.

I. *F. jaculator*: niger, sericeo-micans, tergo mesothoracis rugose coriaceo; mandibularum apice abdominalisque medio rufis; tibiis, tarsisque posticis, albo-annulatis; oviductu longitudinem corporis superante, terebra ferruginea, vaginis nigris apice albis. ♂♀.

Febr. Piez. 141. 1. Walck. Faun. Paris. 2. 75. 1.
Pauz. Faun. Germ. 96. 16. ♀. Latr. Gen. Cr.
& Ins. 3. pag. 253. 1. — *Ichneumon jaculator* Linn.
Syst. Nat. 2. 937. 52. Faun. Sv. 1626. Fabr.
Ent. Syst. 2. 177. 183. Spec. Ins. 1. 435. 92.
O. F. Müller Faun. Fridr. 71. 619. Reaum. Mem.
Tom. 4. pl. 10. fig. 14. 15. ♀. DeGeer. Ins. I. pag.
571-573. pl. 36. fig. 10-11. ♀. Rossi Faun. Etr.
2. 74. 781. *Waoffena prospic*.

Habit. Per totam Europam plus minus frequens. In Svecia usque ad Lapponiam Tornensem occurrit. "Habitat in *Apis truncorum*, *florisomnis*, *Sphegisque* figuli larvis; antennis perquirit ubi larva latet, avolat, reddit et imponit ei ovum." *Torbern. Bergman* apud *Linnæum* in Fauna Sv. l. c.

Descr. Mas., Fem. In familia maximus. *Mas* 4½ lin. longus, *femina* a vertice ad apicem oviductus 10½ linear. longitud. Pube adpressa, brevissima, albo-sericeo-micans. Caput, antennæ, thorax et pedes nigra. Mandibulæ tautum ad apicem rufæ. Abdomen, circa 3 lin. long., nigrum; in *femina* segmentis 2:0, 3:0, 4:0, rufis tergo nigrantibus, in mare 2, 3, 4, 5, nigro- et rufo-cingulatis. Oviductus ultra 4 lin. long. Tibiæ et tarsi antica in mare rufo-testacea, in *femina* illæ nigræ extremitatibus albicantibus, hiscensescentes basi pallidi; tibiæ et tarsi pedum posteriorum in utroque sexu annulis basalibus albis.

2. *F. assectator*: niger, sericeo-micans, tergo mesothoracis subtiliter coriaceo; mandibularum apice abdominisque medio rufis, tibiis basi albicantibus; oviductu tibiarum posteriorum longitudine, terebra rufo-testacea, vaginis totis nigris. ♂♀.

Febr. Piez. 142. 2. Walck. Fn. Par. 2. 75. 2. *Ichneumon assectator* Linn. Syst. Nat. 2. 937. 53. Faun. Sv. 1627. Fabr. Ent. Syst. 2. 178. 184. Spec. Ins. 1. 435. 93. Rossi. Fn. Etr. 2. 74. 782.

Hab. Scania — Lapponia passim. In Lapponia Tornensi ad Kalix a Cel. Zetterstedt deprehensus. In Lapponia Umensi ad Lycksele d. 19. Junii 1832 a praeside captus.

Descr. *Mas.*, *Fem.* Praecedenti simillimus at minor, 3½-4½ lin. long., angustior; mesothoracis tergo multo subtilius coriaceo. Corpus nigrum, & pubes, ut in praecedenti specie, albo-sericeo-micans. Mandibulae *F. jaculatoris*. Abdomen, 3 lin. long., nigrum; segmentis 2:do, 3:tio et 4:to, aut utrinque macula laterali rufa, aut apice rufo-cingulatis; rarius totum abdomen nigrum in manibus. Oviductus abdomine fere quadruplo brevior, longitudine tibiae posticæ; terebra testacea, vaginis totis nigris. Pedes nigri; anteriores tibialis basi et apice, tarsisque fusco-testaceis; posticæ tibialis basi annulo flavo-albido, tarsisque sunt fusca aut fusco-testaceis. *Mas.* variat tarsis omnibus, tibiis anterioribus totis, posticisque intus, rufo-testaceis.

3. *F. erythrostomus*: niger, sericeo-micans, tergo mesothoracis subtilissime coriaceo; mandibulis totis abdominalisque medio ferrugineis, tibiis posticis basi albo-annulatis; oviductu fere abdominalis longitudine, terebra rufo-testacea, vaginis nigris apice albis. ♀

Hab. In West-Gothia a Clarissimo Marklin delectus et *Fænus erythrostomus* denominatus; etiam in Smolandia et Ost-Gothia rarius captus.

Offsp. *Descr.* *Fem.* Magnitudo feminæ praecedentis, scil. 4½ lin. long.; at robustior, fere ut *jaculator*. Corpus nigrum sericeo-micans, mandibulis totis ferrugineis, vix summo apice nigricantibus. Mesothorax tergo subtilissime coriaceus. Abdominis segmenta 2:um et 3:um tota 4:umque macula laterali, ferruginea. Oviduetus 2½ lin., et abdomen 2½ lin. longitudine; terebra rufotestacea, vaginis nigris, apice, ut in prima specie, albis. Pictura pedum praecedentis.

Corrigenda:

- pag. 5. lin. 2. Ve- lege: Api.
— 13. — — 7. Antennstängel l. Antennitängel.
— 15. — — 12. methathoracem l. metathoracem.
— — — 17. methathorax l. metathorsx.
— 16 — — 4. cumputati l. computati.
— — — inter lineas 8:vam et
9:nam inseratur: *Femur* inter coxam et tibiam situm.
— — — 22. ad scutellum insertor lege: ad scutellum
in methathoracis lobo antico insertum.
— — — 4. ab infra. 1) Alias inferas &c. , deleanur
omnino.
— 25. — — 23. Dumetis l. dumetis.
— 26 — — 4 nigromæna l. nigro-ænea.
— 30. — — 9. "8 Chr. bicolor ♂. Dablb.
Mon. Chr. Sv. 10. 6." — add: var b. ♂
prothorace et mesothorace vicið aureis,
legula et metathorace cyaneis.
Unicum individuum in West Gothia a
Nobilissimo Gyllenhal detectum.
— 31. — — 21. &c. var. b. ♂. &c. . . — Unicum indi-
viduum &c. deleanur.
— 32. — — 17. Käflinge lege - Kjeflinge.
— 34. — — 4 Secundum l. secundum.
— 50. — — 11. In suo genere minima l. inter minores sui
generis.
— 54. — — 23. pnnctulata l. punctulata.
— — — 34. dilutionibus l. dilutionibus.
— 56. — — 2. teste p Nobil. l. teste Nobil.
— 59. — — 18. interior l. interior.
— — — 20. connectente l. connectentes.
— 60. — — 7. magnitudines l. magnitudinis.
— 61. — — 8. plerumque l. plerumque.
— 63. — — 16. individuum l. individuum.
— — — — 4:ta ab infra us l. ut.
— 64. — — 1. Pecibus l. Pedibus.
— 72. — — 8. thrax l. thorax.

