

1489


LIBRARY
ENTOMOLOGY RESEARCH
INSTITUTE
DEPT. OF AGR.
OTTAWA

FAUNE
HYMÉNOPTÉROLOGIQUE
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

FA

ADDITIONS ET CORRECTIONS
AU
VOLUME II
DE LA
FAUNE ENTOMOLOGIQUE
DU CANADA
TRAITANT DES HYMÉNOPTÈRES

PAR
L'ABBÉ L. PROVANCHER.



QUÉBEC
TYPOGRAPHIE DE C. DARVEAU
82, rue de la Montagne.

1889

UNIVERSITÉ DE QUÉBEC
FACULTÉ DE MÉDECINE
MÉMOIRES
DE LA FACULTÉ
DE MÉDECINE
TOME XXXI
1952-1953

ANNUAIRE 1952-1953



Ce
notre l
DE QUÉ
No
sant pre
nous ét
lacunes
vant to
assurer
habiles
J. A. G
Geddes,
d'hui c
catalogu

C'est en février 1883 que nous avons terminé notre FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Nos captures, à bien peu de chose près, se réduisant presque exclusivement à nos seules observations, nous étions convaincu dès lors, que de nombreuses lacunes restaient encore à combler. Aussi, poursuivant toujours nos chasses, et ayant pu surtout nous assurer le concours de quelques amateurs zélés et habiles chasseurs, tels que MM. W. H. Harrington, J. A. Guignard, d'Ottawa, et du Capitaine Gamble Geddes, de Toronto, sommes-nous en mesure aujourd'hui d'ajouter plus de 200 espèces nouvelles au catalogue de nos Hyménoptères, dont la plupart sont,

non seulement nouvelles pour notre Province, mais même jusqu'à ce jour inconnues à la science, et constituent de véritables conquêtes sur l'inconnu.

Comme la diffusion de chaque espèce d'insecte, surtout de ceux à vol facile, n'est jamais restreinte à des bornes particulières et précises, nous n'avons pas hésité à attribuer à notre faune tous les Hyménoptères dont la présence a pu être constatée dans Ontario, bien que quelques espèces peuvent se rencontrer là qui ne se trouvent pas ici. D'un autre côté, MM. Harrington et Guignard, quoique habitant Ottawa, ont presque toujours dirigé leurs chasses du côté de Hull, par conséquent sur notre territoire.

Notre faune entomologique est une mine encore toute nouvelle, et offrira pendant de longues années l'occasion de nombreuses découvertes, surtout, si les observateurs se font plus nombreux et plus disséminés. Consignons chaque année les progrès obtenus, les conquêtes remportées, et plus tard, quelque patient travailleur pourra refondre ces matériaux en un tout plus homogène et constituer une monographie de l'ensemble.

Comme il sera facile de le voir, nous avons aussi donné la description de quelques Hyménoptères nouveaux étrangers à notre faune, ils sont notés en leur lieu propre.

F

Fa

Tête
les j
prom
nâtr
noir
trén
noir
4 et

ADDITIONS ET CORRECTIONS

A LA

FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

1885

Fam. 1. TENTHRÉDINIDES, FAUNE, Vol. II, p. 170.

9. Gen. NEMATUS, Jurine, p. 183 et 740.

Aux 16 espèces décrites, ajoutez la suivante.

17. Némate d'Erichson. *Nematus Erichsonii*, Hartig.

♀—Long. .33 pec. Noir avec une bande rouge à l'abdomen.

Tête et thorax d'un beau noir brillant ; le labre, les palpes avec les jambes, excepté à l'extrémité, blanc ; les angles postérieurs du pronotum près des ailes, tachés de blanc. Antennes noires, brunâtres en dessous. Ailes hyalines avec les nervures et le stigma, noir. Pattes rousses, avec les jambes blanches, noires à l'extrémité, les hanches avec les tarses postérieurs noirs. Abdomen noir avec un large anneau rouge, comprenant les segments 2, 3, 4 et 5.

Novembre 1885.