

枝に結び付けて置く、而して放飼の際は園の中央で、一、二本の樹に全部を放ち、多くの樹に分けて放飼することは宜しくない。

(三)放飼頭數 一果樹園に放飼する頭數はなるべく多數なるがよい。けれども如何に多數を放飼するも其の數のみにては全滅せしむることは出来ない。必ず其後の繁殖によつて効果を見らるゝものなれば最初の放飼頭數は如何に多く發生する場所と雖も一ヶ所一反歩位にて三、四十頭位にてよいのである。

(四)放飼場所 イセリヤ介殼蟲の繁殖旺盛なる場所に放飼すべきで點々と發生せる場所にありては其の效果割合に遅く少ないものである。

(五)放飼後の注意 ベタリヤ瓢蟲の放飼を行った場所は一切他の殺蟲劑等を撒布せざる様注意すべきである。従來ベタリヤ瓢蟲を放飼せるにかゝはらず其の効果を疑ひ藥劑撒布又は潰殺等を行ふ弊習があるけれども本種の効果は放飼後一ヶ月位の時に最も大なるものなれば注意すべきである。

日本産蟻類

(承前)

東京高等造園學校講師

太田 幸好

A. List of Japanese Ants

By Y. Ohta

16. *Solenopsis fugax* var. *japonica*. Wheeler.

分布 大阪

17. *Monomorium pharaonis* Linnaeus.

和名 イヘヒメアリ

分布 大阪、琉球、臺灣

18、*Monomorium nipponense* Wheeler.

和名 ヒメアリ

分布 關西地方

19、*Pheidole nodus* F. Smith.

和名 オホツアカアリ

分布 宮城、岐阜

20、*Pheidole fervida* F. Smith.

和名 アツマオホツアカアリ

分布 岐阜

21、*Stenamma famelicum* F. Smith.

和名 キアリ

分布 東京、四國、九州、北海道

22、*Aphelegaster* (*Attonymex*) *fanelica* F. Smith.

和名 アシナガアリ

分布 東京、富士地方、岐阜、淡路

23、*Messor brunnicornis* Forst.

分布 丹波

Mittheil. Naturhist. Mus. Hamburg. XVIII, pp. 6061, (1901). A. Forst.

- 24 / *Messor aciculatus* F. Smith.
 分布 富士地方
- 25 / *Tetramorium caespitum* Wheeler.
 和名 トビイロシツアツ
 分布 本州、四國、九州、水原
- 26 / *Tetramorium guineense* Fabricius.
 和名 オホシツアツ
 分布 紀州、宮崎、青島、臺灣
 Entom System II. No, 31, pp. 357(1793)
- 27 / *Tetramorium guine nse nipponense* Wheeler.
 分布 高知
- 28 / *Tetramorium mixtum* Forel sub-sp. anna Forel.
 分布 臺灣
 Ent. Mitt. I. Nr. 2, pp. 53 (1912)
- 29 / *Tetramorium confucii* Forel.
 分布 臺灣
 Ent. Mitt. I. Nr. 2. pp.53(1913)
- 30 / *Tetramorium pacificum* Mayr var. sub-seabryum Emery.
 分布 臺灣
- 31 / *Leptothorax congruus* F. Smith.

和名 ムネホンアリ

分布 岐阜

ハリアリ 亞科 *Dolichoderinae* Forel.

32、 *Technomyrmex gibbosus* Wheeler

和名 ヒラフシアリ

分布 岐阜、高知

33、 *Iasius (Dendrolasius) fuliginosus* Latreille.

和名 クロアリ

分布 東京、岐阜

34、 *Iasius (Dendrolasius) spathepus* Wheeler.

和名 クサアリモドキ

分布 本州、北海道

35、 *Iasius niger* sub-sp. *brunneus* Forel.

分布 岐阜

36、 *Iasius niger* sub-sp. *niger*. *Linnaeus*.

和名 トビイロケアリ

分布 本州、四國、九州、臺灣

37、 *Iasius niger* sub-sp. *niger* var. *alieno-niger* Forel.

分布 本州

38、 *Iasius niger* sub-sp. *emarginatus* Latreille.

分布 本州

39、*Lasius flavus* De. Great.

分布 富士地方

40、*Lasius flavus* var. *myops* Forel.

分布 富士地方

41、*Lasius* (*Chthonolasius*) *umbratus* Nylander

和名 アメイロケアリ

分布 岐阜、北海道

(未完)

安東産蝶類目録

(承前)

K. Hori : A List of Rhopalocera from Anto;

Keishohoku-Do, Korea

堀 克 重

四ノタテハテフ科 Nymphalidae

1、ウラギンヌギノウモン *Argynnis laodice japonica* Menetries

2、テウセンオホウラギンノウモン *Argynnis nerippe coreana* Butler

3、オホウラギンノウモン *Argynnis nerippe nerippe* Felder.