

[Untitled. Introduced by: "M. L. Fairmaire
communiqua la note suivante..."]RECORDED
IN ANTHUS
XXVIII

Bulletin entomologique.

Chavignerie, travail qui doit être inséré à la suite de celui de notre vice-président.

— M. L. Fairmaire communique la note suivante, de M. Nylander, et la Société en décide l'impression dans le Bulletin.

A l'occasion de la communication faite par M. le docteur Sichel, dans la dernière séance de la Société, au sujet des fourmis qui, introduites de pays exotiques avec des plantes, se trouvent en Europe dans les serres chaudes, j'ai l'honneur de faire part à la Société, que l'espèce propre aux serres du Jardin-des-Plantes, à Paris, n'est pas le *Formica (Tapinoma) vividula* Nyl., existant dans les mêmes conditions, abondamment, à Helsingfors, mais bien une espèce nouvelle, très distincte. J'avais d'abord cru qu'elles appartenaient à la première espèce, mais une étude comparative et plus attentive a bientôt révélé des différences essentielles entre elles. Voici les caractères qui distinguent l'espèce nouvelle :

FORMICA GRACILESCENS.

Operaria: fusco-nigra vel fusco-lurida nitida sparse setosa; antennis gracilibus longitudine corporis, articulationibus pedum tarsisque pallescentibus; thorax sublinearis, supra fere æqualis, impressione transversa levi vel parum distincta. Longit. 3 millim.

In culidariis horti botanici Parisiensis frequens, agilissime currens, pavida. Odor nullus. Mas et femina adhuc ignoti.

C'est un *Tapinoma* dans le sens de MM. Forster et Mayr. Quoique assez semblable au *F. vividula* Nyl. *Form. bor.*, p. 900, il en diffère manifestement par une couleur plus foncée, des antennes plus allongées, plus grêles et à scape plus dénudé, et enfin par son corselet uni en dessus. Les antennes ont treize articles (y compris le *radicula* du scape); les palpes maxillaires six: les labiaux quatre articles.

Profitant de cette occasion, je ferai remarquer aussi que le *Cataglyphis Fairmairei* Forst., n'est que le mâle du *F. viatica* Fabr., espèce voisine du *F. cursor* Fonsc., et que l'*Aphænogaster semitis* Mayr, est le *Myrmica pallide-setosa* Lucas, d'Algérie.

— M. H. Lucas fait connaître la note suivante :

Je communiquerai à la Société plusieurs Hyménoptères de la famille des Formicidés que l'on ne connaissait que comme habitant l'Europe, et que j'ai rencontrés en Algérie dans ma seconde exploration en 1850. Ce sont les *Formica thoracica*, Fabr. Syst. Piez., p. 397, n. 5; *aliena*, Forster, Hym. Stud. 1. Helft, p. 36; Mayr, Formicina Austr., p. 88, n. 22, et *viatica*, Fabr. Mantiss. Isect., tom. 1, p. 208, n. 20; Mayr, Formicina Austr., p. 110, n. 1. C'est cette dernière espèce, qui a servi de type à M. Mayr pour établir son genre *Monocombus*, Mayr, Formicina Austr., p. 109. Ces diverses espèces ne sont pas rares en Algérie, particulièrement aux environs d'Alger, de Blidah, de Médeah et de Boghar, à l'exception cependant de la *Formica aliena*, dont je n'ai rencontré que deux individus femelles.

— M. L. Reiche donne des nouvelles de M. de Saulcy, qui entreprend en ce moment un voyage scientifique en Palestine; notre collègue a déjà pris de rares espèces de Coléoptères; il se préparait, le 25 janvier dernier, à partir de Jérusalem, et comptait se diriger vers Jericho.

Lecture. M. Bellier de la Chavignerie lit une note de notre collègue, M. A. Guillemot, sur une hybridation des *Dicramura vinula* et *erminca*.

— M. H. Lucas fait connaître une note en réponse à celle de M. Dahlbom, communiquée par M. Sichel, et dans laquelle il démontre que son genre *Clavelia* ne peut être considéré comme synonyme des *Ctenocerus* du savant entomologiste suédois.

Membre reçu. La Société admet au nombre de ses membres, M. Lebouteiller, pharmacien, à Rouen, rue des Charrettes, 125, présenté par M. Reiche, au nom de M. Mocquerys. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Deyrolle et H. Lucas.