

ma ferrugineux, les nervures brunes, les écailllettes testacé-brunâtre. Pattes noires, à pubescence grise. Abdomen en ovale, convexe, poli, brillant, la base avec poils blancs peu denses, les segments 2, 3 et 4 avec une frange de longs poils blancs au sommet, celle du 2^e segment plus ou moins interrompue au milieu; frange anale d'un blanc sale.

♂ A pubescence plus longue et beaucoup plus dense sur la face. L'abdomen à poils blancs si peu denses qu'ils se distinguent à peine en frange au sommet des segments.—Cap Rouge.

Une particularité bien remarquable de cette espèce est la forme de sa 2^e cellule cubitale, dont la nervure basilaire est considérablement écartée du bas, ce qui donne à la cellule une bien plus grande longueur en bas qu'en haut.

15. Andrène à-ceintures-poilues. *Andrena hirticincta*, n. sp.

♀—Long. 45 per. Noire avec pubescence jaune; la face à pubescence assez dense, jaune, le chaperon à ponctuations peu denses. Antennes noires. Thorax à pubescence dense, d'un jaune citron, plus longue sur les flancs. Les écaillles alaires noires. Ailes hyalines, légèrement obscures au sommet. Pattes noires, à pubescence jaune sur les cuisses, brune sur les jambes et les tarses, les articles terminaux de ceux-ci testacés. Abdomen ovale, couvert de poils jaunes, cette pubescence se rangeant en frange dense au sommet des 4 premiers segments, le basilaire avec semblables poils jaunes sur son disque, les segments terminaux avec longs poils noirs entremêlés de quelques poils pâles; le ventre à pubescence noire avec une frange de longs poils pâles au sommet de chacun d'eux.

♂—Avec pubescence plus pâle sur le chaperon. Les pattes avec pubescence jaune pâle, tous les segments abdominaux à ceintures jaunes, les terminaux avec poils de la même couleur.—Ottawa (Guignard).

Espèce bien disincte par ses ceintures jaunes, rapprochée de la *permritis*, Cress., mais en différant par sa taille plus petite, son chaperon sans ligne lisse etc.

16.

—Brit.

♂—

jaune pâle, hyalines, testacées, tarses pâles, ovale avec les segments frange d'une rangée de poils

Pe

17.

—Brit.

♂—quelques denses et des yeux tanotum pâle rose jaune avec pubescence en ovale d'une rangée avec le

Esp

18.

♀—peron noir, thorax lisse, en forme de la face, lignes, à noir et pâle, blâmineux.

16. Andrène engagée. *Andrena desponsa*, Smith.
—Brit. Mus. Cat. I, 111.

♂—Long. .35 pce. Noire, la face et le thorax à pubescence jaune pâle, de même que les pattes et le dessous du thorax. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures et le stigma jaunes, les écailllettes testacées. Pattes d'un roux brunâtre avec pubescence fauve brillante. Abdomen en ovale allongé, en pointe à l'extrémité, avec poils situés à la base, les segments avec une bande testacée roussâtre au sommet, la frange anale d'un jaune clair; en dessous les segments sont ciliés de poils blanchâtres.—Cap Rouge.

Peut-être le ♂ de *victima*?

17. Andrène fragile. *Andrena fragilis*, Smith.
—Brit. Mus. Cat. I, 115.

♂—Long. .32 pce. Noire, la face presque nue, n'ayant que quelques poils jaunes sur les côtés, le chaperon à ponctuations peu denses et peu enfoncées, joues renflées et prolongées en arrière des yeux. Le thorax presque nu, l'écusson poli, brillant, le métanotum strié à la base et densément ponctué en dehors de l'espace renfermé. Ailes hyalines, les nervures jaunes, le stigma jaune avec une tache linéaire noire au milieu. Pattes noires, à pubescence fauve pâle, les tarses roux-torrngineux. Abdomen en ovale allongé, nu, déprimé, les segments marginés au sommet d'une bande roussâtre, déprimée; frange anale d'un gris sale avec le dernier segment fauve.—Cap Rouge.

Espèce bien reconnaissable par ses joues renflées.

18. Andrène à ligne noire. *Andrena lineata*, n. sp.

♀—Long. .35 pce. Noire, presque sans pubescence, chaperon nu, mais non brillant, à ponctuations peu distinctes. Thorax lisse, écusson brillant, métanotum à espace renfermé strié, en forme de triangle dont la pointe se perd dans le sillon médian de la face postérieure, les côtés densément ponctués. Ailes hyalines, à nervures fauves, le stigma aussi fauve avec une ligne noire au milieu, les écailllettes testacées. Pattes à pubescence roux-pâle, blanche sur les cuisses, la brosse jaune pâle, tarses ferrugineux. Abdomen en ovale allongé, déprimé, nu, poli, brillant,

les segments marginés au sommet par une ceinture large, enfoncée, roussâtre, brosse anale fauve blanche.—Cap Rouge.

Espèce bien remarquable par la structure de son métanotum et la coloration de son stigma.

19. **Andrène à-chaperon-jaune.** *Andrena clypeata*, Sm.—Brit. Mus. Cat. 1,115.

♂—Long. .26 pce. Noire à pubescence fauve, plus pâle sur la face et sur les joues. Chaperon jaune avec un point noir de claque côté; mandibules ferrugineuses à l'extrémité. Ailes subhyalines, iridescentes, le stigma et les nervures testacé-pâle. Pattes noires, à pubescence fauve pâle, peu dense, les articles terminaux des tarses ferrugineux. Abdomen ovale-oblong, à peu près nu, les côtés avec quelques poils fauves-pâles de même que la frange anale.

♀—Le chaperon à ponctuations peu denses, nu, les côtés de la face à pubescence pâle. Ailes hyalines-jaunâtres, à nervures jaunes. Pattes brunes, les jambes et les tarses brun-ferrugineux, à pubescence pâle, la brosse jaune pâle. Abdomen poli, brillant, finement ponctué, la brosse anale fauve-pâle.—Cap Rouge.

Nous ne croyons pas faire erreur en rapportant cette ♀ à cette espèce. M. Smith n'en décrit que le ♂.

20. **Andrène vêtue.** *Andrena vestita*, n. sp.

♂—Long. .23 pce. Noire, à pubescence grise ou blanche, longue et dense sur le chaperon, assez claire sur le thorax. Ailes subhyalines, le stigma jaune entouré par la nervure brune, les écailllettes testacées-brunâtres. Pattes noires avec les tarses roux-ferrugineux, à pubescence blanche, courte. Abdomen en ovale, atténué en pointe à l'extrémité, nu, les segments marginés au sommet par une bande lisse à marge testacée; la frange anale grise. Dessous brun, les segments à peine frangés de quelques poils gris.—Cap Rouge.

♀—Encore inconnue; la plus petite espèce que nous ayons rencontrée.

21. **Andrène étrangère.** *Andrena aliena*, Smith.

—Brit. Mus. Cat. I, 113.

re large, en-
ouge.

on métano-

i clypeata,

us pâle sur
oint noir de
Ailes subya-
pâle. Pattes
es terminaux
eu près nu,
ue la frange

les côtés de
à nervures
ferrugineux,
oli, brillant,
ouge.

nt cette ♀ à

ou blanche,
orax. Ailes
re brune, les
e les tarses
Abdomen en
nts marginés
frange anale
de quelques

e que nous

, Smith.

♀—Long. .35 pcc. Noire à pubescence blanche ou jaune-pâle, la face presque nue, n'ayant de pubescence que sur les côtés et le vertex, le chaperon poli, brillant, à ponctuations obsolesques. Métathorax rugueux à la base, finement et densément ponctué sur les côtés. Ailes hyalines, légèrement obscurcies au sommet, le stigma jaune, les écailllettes testacées. Pattes à pubescence d'un blanc sale, plus blanche et longue sur les cuisses, la brosse jaune, les derniers articles des tarses ferrugineux. Abdomen ovale, quelque peu acumulé au sommet, lisse et brillant, les segments 2, 3 et 4 avec une petite frange de poils gris sur les côtés, frange anale d'un blanc sale.

♂—La face toute couverte d'une pubescence jaune-pâle, plus longue et plus pâle sur le chaperon; le thorax à pubescence jaune cachant presque les téguments. Abdomen ovale, poli, brillant, avec quelques poils jaunes sur les côtés, mais sans ceintures distinctes, frange anale jaune.—CapRouge.

Son chaperon poli, brillant et presque totalement dénué de ponctuations rend cette espèce bien reconnaissable.

22. *Andrène convexe*. *Andrena convexa*, n. sp.

♀—Long. .36 pcc. Noire à pubescence jaune-pâle, la face presque nue, le chaperon à ponctuations nombreuses mais peu prononcées; le thorax à ponctuations très fines, le métathorax finement ponctué, pubescent. Ailes hyalines-jaunâtres, à nervures brunes. Pattes noires, à pubescence pâle. Abdomen ovale, convexe, avec quelques poils pâles à la base et sur les côtés, mais sans ceintures distinctes, la frange anale gris-foncé.

♂—Long. .35 pcc. Noire, à pubescence blanche peu dense, longue sur le thorax, la face presque nue, le chaperon à ponctuations fines et nombreuses, simulant des stries transverses, le métathorax non rugueux. Ailes subhyalines, à nervures testacées. Pattes à pubescence blanchâtre, les tarses brun-roussâtre. Abdomen très convexe, subglobuleux, nu, poli, brillant, les segments 2, 3 et 4 avec une bande lisse au sommet très étroitement marginée de testacé; la frange anale d'un gris sale.—CapRouge.

23. *Andrène misérable*. *Andrena miserabilis*, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 259.