

ANNUARIO

DEL

MUSEO ZOOLOGICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI

(Nuova Serie)

 VOLUME 2.

Num. 2.

2 Agosto 1905

 R. du BUYSSON
 (Paris)

Note *Hyménoptérologique*

[Ricevuta il 10 Luglio 1905]

Parmi les Chrysidides de la Collezione Entomologica extra-Europea ⁽¹⁾ du Musée Zoologique de l'Université royale de Naples, se trouve le type de la *Chrysis laborans* décrit par A. COSTA dans l'Annuario del Museo Zoologico della reale Università di Napoli, 1864, pag. 68 N° 1971 et provenant de Port Natal. Cette espèce était restée jusqu'à présent parmi celle qu'on n'avait pas retrouvées. Aussi grande fut ma surprise, en examinant ce type, car je reconnus en lui la *Chrysis heros* que j'ai publiée en 1891.

L'illustre entomologiste de Naples a décrit le troisième tergite abdominal de son insecte comme étant quadridenté, tandis qu'en réalité il porte six dents: quatre à l'extrémité apicale et deux autres sur les côtés.

La *Chrysis heros* BUYSS. tombe donc en synonymie de la *Chrysis laborans* COSTA.

Dans la même collection, il existe une espèce inédite à la quelle je donnerai le nom de l'aimable Directeur du Musée Zoologique de l'Université de Naples. En voici la description.

Chrysis Monticellii n. sp.

Corps de taille médiocre, subparallèle, entièrement vert gai avec une tache autour des ocelles, deux lignes longitudinales sur le mésonotum, une ligne médiane sur l'écusson, une tache déscoïdale sur le 2^e tergite abdominal et une petite tache triangulaire à la base du 3^e tergite abdominal, noires. Tête épaisse, arrondie; face courte, terminée en haut par une carène anguleuse, surmontée elle-même d'une seconde carène droite, transversale; joues nulles; les côtés de la tête derrière les yeux carénés: antennes grêles, brunes, les trois premiers arti-

(1) Una delle collezioni nelle quali è ripartita la raccolta entomologica del museo (V. in proposito questo Annuario. Vol. 1, N. 2, pag. 7).

cles verts en dessus, le 3^e très long, plus long que les deux suivants pris ensemble. Pronotum court, subcylindrique, avec un léger sillon longitudinal au milieu, les côtés arrondis non carénés; écusson grand, plat; postécusson déprimé en dessus, un peu prolongé en arrière bien que arrondi; angles du métathorax petits, aigus; mésopleures fortement sillonnées et carénées tout le tour, l'aire inférieure entière. Ponctuation de l'avant-corps médiocre, subrégulière, sub-réticulée, les intervalles très finement pointillés. Ecailles bleues; ailes légèrement enfumées, la portion de la nervure cubitale servant à former la 1.^{re} cellule discoidale presque effacée. Pattes vertes, tarsi testacés. Abdomen légèrement caréné; ponctuation médiocre, assez serrée, ruguleuse sur le 1.^{er} tergite, tandisqu'elle est fine et irrégulière sur les autres segments; 3^e tergite subarrondi, très légèrement renflé en bourrelet avant la série antéapicale, celle-ci à fovéoles nombreuses petites, punctiformes, séparées; marge apicale entière, arrondie, légèrement anguleuse à l'apex; les côtés du segment courts, se terminant chacun par une petite dent finement aigue, dirigée en arrière et située juste à la naissance de la marge apicale. Ventre concolore. — ♀, Long. 6,25 mill.

Patrie: Java. — (N.^o invent. 42,685).