

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ IMPÉRIALE
DES NATURALISTES
DE MOSCOU

PUBLIÉ
SOUS LA RÉDACTION DU DOCTEUR RENARD.

ANNÉE 1859.

TOME XXXII.

—
SECONDE PARTIE.

No. II.

—
(Avec 5 planches.)



Moscou.
IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.
1859.

Could be cited:

25: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow 32 (II): 487 -

or: " " " 32 (4): 487 -

Pagination starts anew in number 3, which
is the beginning of 'Seconde Partie', i.e. II.

≥ [22 February 1860]
(UKRAN)

= 5 March 1860
(Gregorian calendar)

Ants p. 500

Myrmizæ davriesæ,
= possible name now

CATALOGUE

des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis
la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk, examinés et énumérés.

PAR

V. MOTSCHULSKY.

Le catalogue contient un grand nombre d'espèces nouvelles, dont une partie est décrite dans le voyage de M. Schrenk, une autre se trouve diagnostiquée dans les feuilles qui suivent et sera décrite plus en détail dans ce Bulletin.

I. COLÉOPTÈRES.

A. ENTOMOPHAGES.

Carabiques.

Cicindela sylvatica L.

- *restricta* Fisch.
- *spinigera* Eschh.
- *transbaicalica* Motsch.
- *laetescripta* Motsch.
- *Elisae* Motsch.

*Elongato-parallelia, nigro-ae-
nea, cupreo-variegata, subtus
albo-villosa; elytris lunulis ha-*

*matis tribus marginaque angusto
testaceo-albis.*

Long. 3—3 $\frac{3}{4}$ l. — lat. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ l.

De la forme et avec les des-
seins de la *contorta*, mais tache
suturale à l'extrémité, courte.

*Elaphrus riparius L.**Bembidium striatum F.*

- *conicolle* Motsch.
- *foveum* Motsch.

Eurytrachelus amurensis

Motsch.

Notaphus tenebrosus Motsch.

Tome 32 in two
separately paginated parts (I, II),
consisting of numbers (1 and 2) and
(3 and 4), respectively.

Print Permit (Permission)
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

From - in order that through print appear nearly на Censorship
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный
Committee - number/date copy
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Февраля 22-го,
1860 года.

Fevruary

Членъ
Цензоръ, И. Безсмыкинъ.

CATALOGUE

des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk, examinés et énumérés

'PAR

V. MOTSCHULSKY.

Le catalogue contient un grand nombre d'espèces nouvelles, dont une partie est décrite dans le voyage de M. Schrenk, une autre se trouve diagnostiquée dans les feuilles qui suivent et sera décrite plus en détail dans ce Bulletin.

I. COLÉOPTÈRES.

A. ENTOMOPHAGES.

Carabiques.

Cicindela sylvatica L.

- *restricta* *Fisch.*
- *spinigera* *Eschh.*
- *transbaicalica* *Motsch.*
- *laetescripta* *Motsch.*
- *Elisae* *Motsch.*

Elongato-parallela, nigro-aenea, cupreo-variegata, subtus albo-villosa; elytris lunulis ha-

matis tribus marginaque angusto testaceo-albis.

Long. 3— $3\frac{3}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{2}{8}$ l.

De la forme et avec les dessins de la *contorta*, mais tache suturale à l'extrémité, courte.

Elaphrus riparius L.

Bembidium striatum F.

- *conicolle* *Motsch.*
- *foveum* *Motsch.*

Eurytrachelus amurensis
Motsch.

Notaphus tenebrosus *Motsch.*

- Notaphus fasciatus Motsch.*
 — *obliquus Sturm.*
 — *amurensis Motsch.*
- Peryphus amurensis Motsch.*
 — *depressiusculus Motsch.*
 — *ventricosus Ménétr.*
 — *transbaicalicus Motsch.*
- Tachys nana F.*
- Blemus resplendens Motsch*
- Trechus apicalis Motsch.*
- Patrobus lacustris Motsch.*
- Diachila polita Falda.*
- Miscodera erythropa Motsch.*
- Harpalus brevis Motsch.*
 — *? leiroides Motsch.*
- Anisodactylus signatus Ill.*
 — *intermedius Motsch.*
- Pseudophonus griseus Pz.*
- Bradyellus obscuritarsus*
Motsch.
- Demetrias amurensis Motsch.*
- Dromius ater Motsch.*
 — *flavipes Motsch.*
 — *sigma Rossi.*
- Charopterus femoratus Motsch.*
- Brachynus longicornis Motsch.*
- Calathus irideus Motsch.*
- Hyperophorus cancellatus*
Motsch.
- Steroderus antiquus Motsch.*
 — *montanus Motsch.*
 — *insignis Sahlb.*
 — *gracilis Motsch.*
- Platysma vitrea Eschh.*
- Argutor strēnuus Pz.*
- Poecilus fulgidus Eschh.*
 — *cupreus L.*
- Pterostichus rapax Motsch.*
 — *confluens Fisch.*

- Bradytus pallidulus Motsch.*
- Celia chalcea Gebl.*
 — *dilatata Motsch*
- Amara violacea? Motsch.*
 — *borealis Motsch.*
 — *daurica Motsch.*
 — *obscuricornis? Motsch.*
 — *spreta Dej.*
 — *affinis Motsch.*
 — *interstitialis Dej.*
- Chlaenius pallipes Gebl.*
 — *lineellus Motsch.*
- Supra viridis, elytris viridi
 subaeneis, his lineis longitudi-
 nalibus confluentibus, limbo la-
 to, thoracis lateribus, ore, pal-
 pis pedibusque rufo-testaceis.*
- Long. 5 l. — lat. 2 l.
- Agostenus costulatus Motsch.*
- Niger, supra nigro-subaeneus;
 thorace foveolato, trisulcato, an-
 tice attenuato; elytris punctatis-
 simis, profunde striatis, inter-
 stitiis brevissime fulvo pubes-
 centibus, alternis tribus utrinque
 suturaque elevatis, nitidis.*
- Long. 5½ l. — lat. 2½ l.
- Panagaeus crux major L.*
- Lorocera rufilabris Motsch.*
- Agonothorax latipennis Esch.*
 — *minutus Motsch.*
 — *longulus Motsch.*
 — *octocolus Chaud.*
- Tanystola bicolor Eschh.*
- Limodromus angusticollis F.*

Limodromus assimilis Payk.
Nebria microthorax Motsch.

- *dubia* Sahlb.
- *subdilatata* Motsch.
- *attenuata* Motsch.
- *Gyllenhalii* Sch.
- *arctica* Dej.

Carabus granulatus L.

- *Meander* Fisch.
- *Faldermanni* Dej.
- *incompletus* Fisch.
- *Gaschkevitschii* Motsch.

Supra nigro-subcupreus, elytrorum limbo subviride; capite thoraceque scabrosis, hoc quadrato vel subelongato; elytris dense carinulatis, carinulis interruptis, tuberculis elongatis triplici serie:

Long. 5— $5\frac{1}{2}$ l. — lat. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ l.

Carabus viridilimbatus Motsch.

Niger, nitidus, thorace elytrisque viridilimbatis, haec dense carinulatis, carinulis vix interruptis, foveolis majoribus triplici serie; thorace transverso, postice subangustato, rugoso-punctato.

Long. $7\frac{1}{2}$ l. — lat. 3 l.

Carabus Mannerheimii Dej.

Coptolabrus Schrenkii Menétr.

- *smaragdinus* Fisch.

Callisoma dauricum Motsch.

- *aeneum* Motsch.

Nigrum, supra aeneum, capite thoraceque rugosis, hoc trans-

verso, lateribus valde arcuatis, angulis posticis rotundatis; elytris elongatis, postice subdilatatis, granulatis, foveolis aureis triplici serie, striis nullis.

♀ Long. 12 l. — lat. $4\frac{1}{2}$ l.

Callisoma cyanescens Motsch.

Nigrum, supra nigro-cyanum, thorace minuto, transverso, cordato, rugoso, angulis posticis apice acutis; elytris subbrevis, postice dilatatis, regulariter punctato-striatis, interstitiis angustis, valde elevatis.

Long. 8 l. — lat. 4 l.

Hydrocanthares.

Haliplus sibiricus Motsch.

Hydrocoptus obscuripes Motsch.
 — *dauricus* Motsch.

Hydroporus septentrionalis Gyll.

- *porosus* Gebl.

Dytiscus frontalis Motsch.

- *confusus* Motsch.

Rhantus nigriventris Motsch.
 — *infuscatus* Eschh.

- *luteicollis?* Mannh.

Hydaticus stagnalis L.

Ilyobius lateralis Gebl.

Colymbetes chalconatus Pz.

- *subquadratus* Motsch.

- *alpinus* Motsch.

Oretochilus dauricus Motsch.

Hydrophilus ruficornis Degeer.

Laccobius cinereus Motsch.

Hydrochus kirgisicus Motsch.

Helophorus sibiricus Motsch.

— *fennicus Gyll.*

— *grandis Ill.*

Heterocerus seriepilosus Motsch.

Sternoxes.

Dicerea acuminata Pall.

Paecilonota virgata Motsch.

*Punctatissima, nitida, laete
viridi-metallica; maculis fronta-
li, thoracis quinque elytrisque
utrinque octo cyano-violaceis;
thorace subquadrato, elytris sca-
brosis, apice subtruncatis.*

Long. 4 l. — lat. $1\frac{3}{5}$ l.

Ancylochaira punctata F.

— *strigosa Gebl.*

Melanophila appendiculata F.

— *Gebleri Dej.*

Anthaxia reticulata Motsch.

Agrylus dauricus Motsch.

— *grandicollis Motsch.*

— *olivaceus Gyll.*

Adelocera conspersa Gyll.

Athous limbaticollis Motsch.

Prosternon sericeus Gebl.

Selatosomus rugosus Gebl.

— *germanus F.*

— *coerulescens Motsch.*

— *gracilis Motsch.*

Ctenocera castanea L.

— *testaceipennis Motsch.*

Pristilophus dauricus Mus. Petr.

Elater sanguineus L.

— *ephippium F.*

Elater tristis L.

— *nigrinus Payk.*

— *sobrinus Motsch.*

— *dilutipes Mus. Petrop.*

Limonius parallelus Motsch.

Cardiaphorus vulgaris Motsch.

— *? curtulus Motsch.*

Scoliocerus depresso Gebl.

— *pallipes Motsch.*

Cryptorhynchus opacicollis

Motsch.

— *geniculatus Motsch.*

— *nigripes Motsch.*

Corymbites dauricus Motsch.

Sericosomus brunneus F.

Agriotes pilosus F.

— *subvittatus Motsch.*

*Fusco-testaceus, puberulus; tho-
racis angulis posticis elytrorum
sutura, lateribus, antennis pedi-
busque plus minusve laete testa-
ceis; dense punctatissimus.*

Long. $2\frac{2}{3}$ — $3\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{5}{4}$ — $4\frac{1}{2}$ l.

Paranomus costalis Payk.

Campylus linearis F.

— *dilutiangulus Motsch.*

Malacodermes.

Luciola mongolica Motsch.

Lampyris noctiluca L.

Lygistopterus flabellatus

Motsch.

— *sanguineus L.*

Dyctiopterus acuticollis Motsch.

— *atricollis Motsch.*

— *hybridus Mannh.*

*Oripa luteola L.**Telephorus translucidus Déj.*— *melanogastrius Mannh.**Podabrus dilatiellus Mus. Petr.*— *ochoticus Mus. Petrop.*— *marginellus Motsch.*— *annulatus Fisch.**Dichelotarsus flavipes Motsch.*— *flavimarginatus Motsch.*— *recticollis Mus. Petrop.**Rhagonycha nigritiventris Motsch.*— *cembricola Eschh.*— *geniculata Gebl.**Téridiles.**Opilus substriatus Motsch.**Clerus substriatus Gebl.**Trichodes irritans Laxmian.**Corynetes violaceus L.**Hylaeocetus dentifestoides F.**Brachelytrés.**Olophrum nigropiceum Motsch.**Oxytelus borealis Motsch.*— *elypeatus Motsch.**Bledius talpa Gyll.**Latrobium brunnipes F.**Emus nebulosus L.**Creophilus orientalis Motsch.*— *fulvago Motsch.**Staphilinus erythrocephalus**Mus. Petrop.**Ocypus picipes? Nordm.**Philonthus nigrosectus Motsch.*— *angulicollis Motsch.**Oxyporus angularis Gebl.**Ellipsotomus bipustulatus F.**Oxypoda fuscata Motsch.**Homalota lividipennis Mannh.**B. RHYPOTHECÉS.**Crassicornés.**Byrrhus Kamtschaticus Motsch.**Cytillus varius F.**Brévicornés.**Dermestes vorax Motsch.*— *lardarius L.*— *domesticus Gebl.*— *tessellaticollis Motsch.*— *sibiricus Er.*— *Fritschii Kugel.**Clavicornés.**Antherophagus nigricornis F.**Silpha perforata Gebl.*— *obscura F.**Oiceoptoma collaris Eschh.*— *lapponica L.*— *rugosa L.*— *sinuata F. var. produeta*
Motsch.— *latericarinata Motsch.*— *opaca L.*— *baicalica Motsch.**Globicornés.**Necrophorus dauricus Motsch.*— *orientalis Motsch.*— *mortalorum F.**Cercus samburensis Er.**Nitidula 2 pustulata L.**Omosita eolon L.*— *depressa L.**Epuraea incompleta Motsch.*

- Epurea laricina Motsch.*
Maligethes marginalis Motsch.
 — *borealis Motsch.*
 — *dauricus Motsch.*
 — *compactus Motsch.*
Carpophilus obscurus Motsch.
 — *dauricus Motsch.*
Cercyon ovillum Motsch.
Saprinus Sedakovii Mannh.
 — *planiusculus Motsch.*
Hister distans Fisch.

Laméllicornes.

- Aphodius ater De Geer.*
 — *semiruber Motsch.*
 — *sublimbatus Motsch.*

C. PSEUDORHYPOPHAGES.

Phyllophages.

- Decamera rufipes Motsch.*
Hoplia 12 punctata Ol.
 — *daurica Motsch.*
Gnorimus subapacus Motsch
Trichius fasciatus L.
Pseudotrichius succinctus Poll.
Osmoderma barnabita Motsch.
Glyciphana fulvistemma Motsch.
 — *variolosa Motsch.*
 — *viridiopaca Motsch.*
Cetonia costata Motsch.
 — *subaurata Motsch.* var.
 aeneae?
 — *daurica Mannh.* var. *ae-*
 neae?

- Rhombonyx cribricollis Motsch.*
Euchlora mongolica Falda.
Anomala daurica Mannh.

- Anomala oblonga Motsch.*
Phyllopertha horticola L.
Rhizocolax conspersus Motsch.
Sericania fuscolineata Mus. Petr.
Metopodontus dauricus Motsch.
Prismognathus subaeneus Mus.
 Petr.

Ténébrionites.

- Upis ceramboides L.*
Encyalesthus subviolaceus
 Motsch.
Callicomus humeralis Eschh.

Mycophages.

- Anisotoma calcaratum? Er.*
Dircea fuscipes Motsch.
Scodotes annulatus Eschh.
Stenotrachelus Roullieri Motsch.

C ANTHROPHILES.

Pectinipèdes.

- Cephalaon variabilis Mus. Petr.*
 — *pallens Motsch..*
Cteniopus femoralis Motsch.
Allecula fulvipennis Motsch.

Acuminés.

- Mordella aculeata L.*
Mordellistena daurica Motsch.
 — *mongolica Motsch.*
 — *nana Motsch.*

Obtusipennes.

- Monocerus dauricus Motsch.*
Lagria laticollis Motsch.

Lagria fuseata Motsch
Pyrochroa fuscicollis Dej.

Vésicants.

Mylabris calida Pall.
Meloe binodosus Motsch.
Anaris dubia? F.
— *amurensis* Motsch.
Epicauta megalocephala Böb.
Lyttia suturella Motsch.

Sténelytres.

Ditylus laevis F.
Anancodes coarctata Gebl.
— *croceiventris* Motsch.

Viridi-subaeneus, in ♀ thorace abdомineque toto rufo, convexo, nitido; in ♂ segmento anali valde excavato, pygidio infuscato, utrinque bilobo.

Long. 3— $3\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{5}{6}$ — $1\frac{1}{6}$ l.

Anancodes nigriventris Motsch.
Nigro-viridis, in ♀ thorace rufo, punctatissimo, medio impresso, abdомine nigro-aeneo, segmento anali subrufo; in ♂ segmento anali excavato, pygidio furcato, utrinque bilobo, lobis externis elongatis.

Long. 3— $3\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{5}{6}$ — $1\frac{1}{6}$ l.

Oedemera lurida L.
— *virescens* F.
— *testaceicollis* Motsch.

D. XYLOPHAGES.

Longicornes.

Grammoptera testacea Motsch.
— *bivittis* Motsch.
Anoplodera coerulea Motsch.
— ? *dentato-fasciata* Motsch.
— *parallelopipeda* Motsch.
Leptura cincta F.
— *sanguinolenta* L.
— *sanguinosa* Gyll.
— *rubro-testacea* Ill.
— *virens* L.
— *variicornis* Dalm.
Stenura atricolor Motsch.
— *aterrima* Motsch.
— *nigripes* De Geer.
— *melanura* L.
— 4 *fasciata* L.
Strangalia arcuata Helvig.
— *annularis* F.
— 12 *guttata* F.
Pachyta minuta Gebl.
— *ruficollis* Motsch. var.
— *virginiae*.
— *bicuneata* Mus. Petr.
— *Lamed* L.
Evodinus interrogationis L.
— *punctatus* Falda.
— *variabilis* Gebl.
— *dauricus* Fisch.
— *strigillatus* F.
Rhagium indagator L.
Agapanthia cirsii Motsch.
— *fasciculosa* Motsch.
— *pennicillata* Gebl.
Phytoecia unicolor Motsch.
Saperda laterimaculata Motsch.

Saperda 12 *punctata* Motsch.
 — 16 *punctata* Motsch.
 — 10 *punctata* Gebl.
 — *metallescens* Mus. Petr.

Dorcadiion humerale Gebl

Mesosa myops Sch

Monochammus saltuarius Esch.

— *Rosenmüller* Cederj.
 — 4 *maculatus* Motsch.

Astynomus sibiricus Motsch.

Ibidimorphum 8 *pustulatum*
Mas. Petr.

Obrium fasculum Motsch.

— *vini* Panz.

Clytus gracilipes Faldm

— *minutus* Motsch.
 — *sexmaculatus* Motsch.

Viriscente pubescens, *elytris*
maculis oblongis sex punctoque
humerali nigris, *macula basali*
arcuata.

Long. 4 L — lat. 1 $\frac{1}{2}$ L.

Clytus capra Germ

— *liciatus* L.

Tetropium aalicum F.

— *castaneum* L.

Asemum striatum L.

Criocephalum rusticum L.

Callidium violaceum L.

— *dilatatum* Payk.

Pronocera daurica Motsch.

Elongata, *parallela*, *cinereo*
sparsim pubescens, *nigra*; *tho*
race rufa, *transverso*, *sparsim*
punctato, *nitido*, *lateribus ar*
cuatis; *elytris thorace paulo la*

tioribus et sex duplo longioribus,
consertim rugoso-punctatis, cine
reo puberulis.

Long. 3 L — lat. 1 $\frac{2}{5}$ L.

Polyzonius bifasciatus Ol.

Anoplistes sellatus Stev.

— *affinis* Motsch.

Tragosomadepsarium F.

Tropiderus dorsalis F.

— *albirostris* Hrbst.

Brachytarsus varius F

Variicornes.

Brontes planatus L.

Cucujus sanguinolentus L.

Leperina squamulosa Gebl.

Ostoma grossa L.

Tregosita caraboides F.

Tomius subelongatus Motsch.

— *cembrae* Heer.

— *stenographus* Dast.

— *typographus* L.

Hylastes decumanus Er.

ERNOPHAGES.

Rhynchocéphales

Rhyneolus chloropus F.

Sitophilus oryzae L.

Rhinoneus guttalalis Grav

— *brachoides?* Hrbst.

Ceuthorhynchus posthumus?

Grm.

— *haemorrhoidalis* Motsch.

Coeliodes carinifrons Motsch.

Cryptorhynchus Lapathi L.

Centrinus dauricus Motsch.

Baridius rufitarsis Motsch.

Tanyrhynchus tessellatus Motsch.

Tychius albolineatus Motsch.

Ovatus, fulvo-griseo densissime pubescens, rostro, antennis tarsisque rufo-testaceis, thorace lineis tribus, elytrorum sutura striis interstitiisque alternis utringue tribus albis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{5}{4}$ l.

Balaninus glandium Marsh.

— *nigrirostris* Motsch.

Solenorhynus variegatus Motsch.

Erirhynus bituberculatus? Gyll.

— *vecors* Sch.

— *rufipes* Motsch.

— *rotundicollis* Motsch.

— *bimaculatus* Gyll.

Magdalinus duplicatus Germ.

Pissodes piniphilus Hrbst.

— *cembrae* Motsch.

Lixus? *corpulentus* Motsch.

— *elongatus* Sch.

— *divaricatus* Motsch.

Oliorhynchus brevicollis Sch.

— *cribricollis* Sch.

Peritelus griseus? Ol.

Alsus flavipes Motsch.

Phyllobius maculosus Motsch.

— *lugubris* Motsch.

— *crassipes* Motsch.

Ovatus, postice subincrassatus, laete-viridi dense squamosus, antennis tibiis tarsisque rufo-testaceis; rostro antice subbicari-

nato; thorace transverso, lateraliter valde arcuato; elytris thorace paulo latioribus, profunde punctato-striatis, interstitiis subrugulosis; femoribus omnibus valide unidentatis, anticis valde dilatatis; tibias anticis paulo inflexis.

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. 1 l.

— *pacificus* Mus. Petrop.

— *chloris* Sch.

— *ligurinus* Dej.

— *malachiticus* Motsch.

— *maculicornis* Germ.

Phytonomus puncticauda Motsch.

— *meles* F.

— *mongolicus* Motsch.

— *vittatus* Motsch.

— *auratus* Motsch.

Hylobius albosparsus Mannh.

— *altaicus* Motsch. var.? *pinastri* Gyll.

— *arcticus* L.

Lepyrus nebulosus Motsch.

— *irroratus* Motsch.

— *albomaculosus* Motsch.

Alophus albonotatus Motsch.

— *gibbosus* Motsch.

Ovatus, postice acuminatus, dense fulvo-brunneo pubescens, cinereo seriatim fasciculosus; corpore subtus, elytrorum lateribus albo villosis; thorace subquadrate, serobiculato-punctato, lateribus vix dilatatis; elytris pun-

ctato-striatis, punctis subirregulariter sparsim impressis.

Long. $2\frac{3}{4}$ — 3 l. — lat. $1\frac{1}{3}$ l.

— robustus Motsch.

Cleonus sulcirostris L.

Polydrosus? costulatus Motsch.

— tassellatus Motsch.

Chlorophanus submarginalis

Gebl.

— seabricollis Motsch.

— brachythorax Motsch.

Ovatus, postice attenuatus, densissime viridi squammosus, corpore subtus lateribusque sub-sulphureis; rostro longitudinaliter carinato; thorace transverso, versus lateribus subrugoso-plicato, postice dilatato, angulis lateraliter subprominulis.

Long. $4\frac{1}{3}$ l. — lat. $1\frac{5}{6}$ l.

Chlorophanus parallelocollis

Motsch.

Elongato-oratus, postice acuminatus, subproductus; dense viridi squamuoso, lateribus subalbis; rostro elongato frontisque longitudinaliter carinatis; thorace subparallelo, subquadrato, rugato, angulis posticis vix prominulis; elytris subtiliter punctato-striatis, apice mucronatis.

Long. $4\frac{1}{3}$ l. — lat. $1\frac{9}{5}$ l.

Chlorophanus bidens Motsch.

Ovatus, postice attenuatus, apice subdivaricato bimucronatus, dense viridi argenteo squam-

mosus, lateribus dilutioribus; rostro-mediocri, carinato; thorace rugato, subelongato, postice dilatato, angulis subprominulis; elytris punctato-striatis.

Long. $2\frac{7}{5}$ — 3 l. — lat. 1 — $1\frac{1}{5}$ l.

Chlorophanus foveolatus

Motsch.

Elongato-ovatus, postice attenuatus, apice mucronatus, dense viridi-argenteo squammosus, lateribus dilutioribus; rostro carinato; thorace rugato, elongato, capitis sere latitudine; postice subangustato; elytris grosso soveolato-striatis.

Long. $4\frac{1}{5}$ l. — lat. $1\frac{1}{5}$ l.

Chlorophanus glaucopterus?

Motsch.

Leposoma variegata Motsch.

Sitones audax Sch.

— lineellus Sch.

— sulcifrons ? Thumb.

— flavellus Motsch.

Piazomias griseus Motsch.

Brachyderes ventricosus Motsch.

Cneorhinus fossulato-punctatus

Motsch.

Apion crassirostra Motsch.

— nigricorne Motsch,

— trifolii ? L.

— flavipes F.

Rhynchites betulae L.

— cupreus L.

— puberulus Motsch.

— rugosus Gebl.

— betuleti F.

Rhynchites rugipennis Motsch.

Attelabus cyaneus Sch.

— *cicaticosus* Motsch.

Apoderus maurus Motsch.

— *carbonicolor* Motsch.

— *flavimanus* Motsch.

— *rubidus* Motsch.

— *humerosus* Motsch.

— *politus* Gebl.

— *Kamtschaticus* Motsch.

— *coryli* L. (*avellanae* F.)

— *dauricus* Motsch.

Coryli tantum affinis, sed capite magis conico, antennis longioribus, art. mediis elongatis;
var.? —

Apoderus longiceps Mus. Petrop.

Brachycéphales.

Bruchus ptilinoides ? Fald.

Crioceris dodecostigma Suffr.

— *longipennis* Motsch.

Lema mongolica Motsch.

— *flavipes* Mg.

Donacia inermis Motsch.

Bromius obscurus L.

— *vitis*? F.

Colaspisoma cyanea Motsch.

Nodostoma nigripes Motsch.

— *fulvipes* Motsch.

— *aeneipennis* Motsch.

— *nigroviridis* Motsch.

— *cribricollis* Motsch.

— *rufo-testacea* Motsch.

Cryptocephalus laevicollis Gebl.

— *amurensis* Motsch.

— var.? *regalis* Gebl.

Cryptocephalus rubidus Motsch.

— *coryli* L.

— *pusillus*? F.

— *lunatus* Motsch.

Dlochrysa aurifera Motsch. (var.?)

— *virgata* Motsch.

Chrysomela artemisiae Motsch.

Ambrostoma 4 *impressa* Ménér.

Chrysomorpha quadrangula Motsch.

Taeniosticha tarda Motsch.

Lithoptera subtanea Motsch.

Stichoptera nigripes Motsch.

— *polita* L.

Entomoscelis orientalis Motsch.

Lina longula Motsch.

Linastica peltoidae Gebl.

— *platessa* Motsch.

Gonioctena arcuaticollis Motsch.

— *salicis* Motsch.

— *Baaderi* Pz. (var.?)

— *testacea* Motsch.

— *rufipes* De Geer.

Phratora longula Motsch.

— *obtusicollis* Motsch.

— *vitellinae* L.

— *atrovirens* Cornelius.

— *latipennis* Motsch.

— *striata* Motsch.

Plagiodesma armoraciae L.

Emmetrus brassicae Motsch.

— *purpureus* Motsch.

Spartophila fulva Motsch.

Colaphus 12 *punctatus*.

Gastrophysa cyanea Motsch.

Hispa nigrocyanea Motsch.

Galleruca capreae L.

— *maculicollis* Motsch.

— *sagittariae* Gyll.

Luperus altajcus Gebl.

- *impressicollis* Motsch.
- *cembrae* Motsch.

Phyllobrotica puncticollis

- *Motsch.*
- *bisignata* Gebl.

*Malacosoma splendida Motsch.**Luperodes nigripennis Motsch.*

- *praeustus* Motsch.
- *quadriguttatus* Motsch.
- Graptodera nigro-aenea* Motsch.
- *aleracea* L.
- *plicata* Motsch.

*Crepidodera interpunctata**Motsch.*

Elongato-ovata, nitida, testacea, oculis solum nigris; antensis dimidio corporis longioribus; thorace syphquadra, punctulato, postice impresso, lateribus parallelis, angulis posticis subrectis; elytris subparallelis, thoracis fere latitudine, fortiter undulato-punctatis, interstitiis punctis nonnullis irregulatiter instructis.

*Long. 1 $\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.**Crepidodera sublevis Motsch.*

Ovata, postice acuminate, testacea, oculis nigris; thorace transverso, lateribus arcuatis, antice angustatis; elytris thorace latoribus, subtiliter punctostriatis, apice levigatis.

*Long. 1 $\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.**Crepidodera obscuritarsis**Motsch.*

Ovata, nitida, testacea, oculis, antennarum apice tarzisque ni-

gris, femoribus posticis apice tibiisque infuscatis; thorace transverso, antice arcuatim angustato; elytris argatis, thorace paulo latoribus, subtiliter punctostriatis, interstitiis sparsim irregulariter punctatis.

*Long. 2. l. — lat. 1. l.**Haltica nitidicollis Motsch.**Longitarsus luridus Ol.*

- *pratensis* Pz.
- *longicornis* Motsch.

*Plectroscelis costulata Motsch.**Hydropus splendens Motsch.**Psylliodes pusillus Motsch.**Argopus unicolor Motsch.*

- *nigritarsis* Fisch.

Argopistes suturalis Motsch.

- *biplagiatus* Motsch.
- *limbatus* Motsch.
- *flavitarsis* Motsch.

*Cortocyla transparipennis**Motsch.**Platycephales.**Hippodamia 13 punctata L.**Adonia mutabilis Serib.**Coccinella 7 punctata L.*

- *trifasciata* F.
- *transversoguttata* Fald.
- *Mannerheimii* Dej.
- *variabilis* Ill.

*Synonycha mirabilis Mus. Petr.**Leis spectabilis Fald. ♂*

- *Besseri* Fald. ♀
- *frigida* Mulst.
- *19 signata* Fald.

Calvia hololeuca Motsch.

- *bisemiguttata* Schall.

Novius velutinus Motsch.
Scymnus analis L.
Dapsa subnotata Motsch.
Endomychus nigricolor Motsch.
Languria Ménétriesi Motsch.
Phalacrus sarcicis Sturm.
Olibrus aeneus Ill.

II. ORTHOPTÈRES.

Forticulaires.

Forficula amurensis Motsch.

Gryllions.

Acheta musica Motsch.
 — ? larvae 2.

Locustines.

Locusta? larvae 2.

Acridiens.

Chrysochraon dispar Heyer.
 — *umbonatus Motsch.*
Stepobothrus biguttatus L.
Gomphocerus biguttatus Charp.
 — *barbipes Motsch.*
 — *longicornis Motsch.*
 — *sibiricus L.*

Prumna viridis Motsch.
Oedipoda amurensis Motsch.
 — ? larvae 3.

Tettix sukulata L.
 — *elevata Motsch.*
 — *bipunctata L.*

III. ODONATES.

Onychogomphus forcipatus L.
Aeschna mixta Latr.
Agrión minimum? Herr.

Perlides.

Semblis bicaudata L.
 — *femoralis Motsch.*
Nemura? frontalis Motsch.

Ephémérides.

Palyngenia amurensis Motsch.
Baetis sp.?
Ephemera vulgaris F.

IV. NEUROPTÈRES.

Phryganides.

Limnophilus griseus L.
Leptocera radiata Motsch.
 — *nivea Motsch.*
 — *albescens Motsch.*
Setodes azurea L.
Hydropsyche sp.?

V. HYMÉNOPTÈRES.

Tentrédinites.

Cimbex villosus Motsch.

Niger, abdomen postice et subtus, tibiis tarsisque rufo-testaceis, corpore supra pectoreque cinerea villoso, costa alarum medio infuscata, dilatata; femoribus posticis unidentatis sed non incrassatis.

Long. 8 l. — lat. $2\frac{3}{4}$ l.

Hylotoma flavopicta Motsch.
 — *ustulata Klug.*
 — *nigronodosa Motsch.*

Valde affinis Hyl. berberid., rufo-testacea, capite, antennis

nodis duabus elongatis in medio thoracis, alarum costa, pedibus quatuor anticis, tibiis tarsique posticis nigris.

Long. 4 l. — lat. $1\frac{1}{6}$ l.

Hylotoma fulvicornis Motsch.
Nematus medullarius Hartig.

— sp.?

Dolerus uliginosus Klug.

— sp.?

Monophadnus albipes L.

Tentredo livida Motsch.

— punctulata Klug.

— scalaris Klug.

— trabeata Klug.

Lyda depressa Klug.

Cephus unifasciatus Motsch.

Urocérides.

Xyphydria flavipes Motsch.

Urocerus sibiricus Motsch.

Ichneumonides.

Ichneumon vaginatorius L.

— sp.? — 2.

Tryphon pallifrons Motsch.

Cryptus? seticornis affinis.

Pheugadeuon sp.?

Helcon? apicalis Motsch.

Pezomachus sp.?

Rhyssa persuaria L.

Glypta sp.?

Bassus sp.?

Campoplex pallidicornis Motsch.

Porizon harpurus Schr.

Chelonus dimidiatus Motsch.

— sp. 2.

Microgaster? sp.

— *tibialis Nees ab Es.*

Macropalpus? sp.

Aulacides.

Foenus jaculator L.

Chalcidides.

Pteromalus artemisiae Förster.

Crabronides.

Crassocerus? sp.

Crabro vagus F.

Sphegides.

Pompilus amurensis Motsch.

Niger, nitidus, abdominis segmento 2-do rufo-testaceo.

Long. 3 l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Pompilus viaticus L.

Pelopaeus? dimidiativentris Motsch.

Scoliaires.

Tiphia morio F.

Sapyga? sp.

Formicides.

Formica pubescens F.

— *truncicola Nyl.*

Myrmica daurica Motsch.

Vespides.

Odynerus minutus F.

Polistes sp.?

*Mellisères.**Halictus subfasciatus St. Farg.**Colletes sp.?**Bombus hortorum L.***VI. HÉMIPTÈRES.***Pentatomides.**Graphosoma lineata L.**Coptosoma biguttula Motsch.*

Fere subtransverso-ovata, postice subdilatata, nitidissima, punctata, limbo angustissimo punctisque duobus ad basin elytrorum flavis, antennis, oculis pedibusque rufo-testaceis.

Long. $4\frac{1}{3}$ l. — lat. $1\frac{1}{3}$ l.

Coptosoma dilatata Motsch.

Fere quadrato-ovata, postice dilatata, nitidissima, punctata, nigra, oculis, antennarum basi, geniculis tarsisque rufo-testaceis plus minusve infuscatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

*Stenaspis maura L.**Trigonosoma nigrolineata L.*

Picromerus fusco-annulatus
Stål.

Arma custos F.

— var. fusco-antennata A.
Kouschakevitch.

Eysarcoris intermedius Wolff.

— var. pallidus A. Kouschak.

Tropicoris metalliferus Motsch.

Magnus, punctatissimus, vix nitidus, viridi-metallicus, cupreo

variegatus, scutello apice, abdominis lateribus annulatis, corpore subtus tibiisque livido-testaceis; thoracis angulis productis, valvatis.

Long. 8 l. — lat. 4 l.

Tropicoris semiannulatus

Motsch.

Livido-testaceus, supra plus minusve rufescente reflexus, abdominis lateribus annulatis, thoracis margine antica scutelloque albescensibus; angulis anticis productis obtusis.

Long. 8 l. — lat. 4 l.

Tropicoris 10 punctatus Motsch.

Livido-testaceus, fere unicolor, thoracis angulis antice lunato productis, in medio punctis quatuor, transversim dispositis, ad scutello quatuor, medioque elytrorum utrinque uno atris.

Long. $7\frac{1}{2}$ l. — lat. 4 l.

Tropicoris rufipes L.— *nigricornis F.**Pentatoma prasina L.*

— *obtusa A. Kouschakev.*
— *verbasci F.*
— *baccarum L.*

Corpocoris eryngii Germ.— *vernalis? W.**Acanthosoma haemorrhoidale L.*

— *grisea L.*
— var. *Gorskii Kouschakev.*
— *ferrugator F.*
— *nana A. Kouschakevitch.*

Eurydema *Gebleri* *Kolenati.*

— *daurica* *Motsch.*

Nigra, *sutius subalbo annula-*
ta; *supra rubro picta*, *macula*
nigra hemielytrorum in medio
sere non sinuata.

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

(*Eurydema ornatae* var. ?)

Aelia acuminata *L.*

— *brunnea* *A. Kouschakev.*

Coreides.

Alydus atratus *Motsch.*

Elongatus, *punctatus*, *subopacus*, *ater*, *antennis*, *tibis tarsisque basi fusco-testaceis*; *femoribus posticis subdilatatis*, *quinquedentatis*.

Long. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

Syromastes marginatus *L.*

Coreus disciger *Kolenatti.*

Corizus crassicornis *L.*

Nysius ericae *Schill.*

Lygaeides.

Rhynchosciara agrestis *Fall.*

Lygaeus cruciger *Motsch.*

Subovatus, *depressus*, *ruber*,
capite, *oculis*, *thorace maculis*
duabus magnis, *hemielytrorum*
quatuor cruoiforme dispositis, *ab-*
dominis lateribus serie utrinque,
antennis pedibusque nigris.

Long. 3 l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

Cymus foliaceus *Motsch.*

Miris virens *L.*

— *tridentatus* *A. Kouch.*

— *holosatus* *F.*

Lopus gothicus *L.*

— *dolabratus* *Fall.*

Deraeocoris chenopodiif *Fall.*

Phytocoris variicornis *A. Kouch.*

— *bioculatus* *A. Kouch.*

Capsus pratensis *L.*

— *nigripes* *A. Kouch.*

— *Schrenkii* *A. Kouch.*

— *annulicornis* *Sahlb.*

— *tripustulatus* *L.*

— *quadrimotatus* *A. Kouch.*

— *frater* *A. Kouch.*

— *infuscatus* *A. Kouch.*

— *campestris* *L.*

— *furcatus* *H. Sch.*

— *niger* *A. Kouch.*

Myrmecoris? *bimaculatus*

Motsch.

Formicaeformi, *niger*, *hemi-*
lytris abbreviatis, *postice albiss*;
antennis pedibus quatuor anticus,
tibiis tarsisque posticis plus mi-
nusve fusco - testaceis; *oculis*
prominulis; *abdomine medio di-*
latato.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. $3\frac{1}{5}$ l.

Halticus sp.?

Reduviens.

Nabis ferus *L.*

— *brevipennis* *Motsch.*

— *conformis?* *Germ.*

— *elongata* *A. Kouch.*

— *grossa* *A. Kouch.*

Rivulaires.

Salda littoralis L.
— *oblonga Stål.*

Plotères.

Gerris paludum F.

VII. HOMOPTÉRES.*Cicadaires.*

Cicada hyalina Grm.

Fulgorellas.

Delphax sp.?

Asiraca sp.?

Cicadelles.

Aphrophora coleoptrata L.

Ptyela spumaria L.

Bytascopus sp.?

Tettigdnia atramentaria Motsch.

*Elongata, parallela, nitida,
supra nigro - subænea, macula
scutellaris, altera frontali, ca-
pitis lateribus, elytrorum limbo,
corpo subtus pedibusque dilute
flavo-subviridis.*

Long. $2\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{5}{4}$ l.

Jassus? larva.

Deltoccephalus? larva.

Psyllides.

PsyHa sp.?

Aphides

Aphis sp.?

VIII. DIPTÉRES.*Cousins.*

Culex caspius Pall.

— *flavus Motsch.*

*Dilute fusco-testaceus, capite
thoraceque subfuscato, tarsis
anticis fusco-annulatis.*

Long. 3 l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Anopheles sp.?

Chironomus annularius F.

— *viridulus L.*

Tipulaires.

Limnobia sp.?

Tipulina breviceps Motsch.

*Tipuliformis, fusco-testacea,
abdomine testaceo annulato, fe-
moribus tibiisque basi testaceis;
capite brevi, antennis filiformi-
bus, 10 articulatis apice attenua-
tis, capite plus duplo longiori-
bus; abdomine apice subdilatato,
rotundato - obtuso.*

Long. $4\frac{1}{2}$ l. — lat. thor. $\frac{5}{4}$ l. —
exp. alar. $8\frac{1}{2}$ l.

Scatopsides.

Simulium reptans L.

Crapitula sibirica Gimmerth.

Agromyza pulicaria Meig.

— *pygmaea? Meig.*

Oscinides.

Oscinella nitens Fall.

— *Nasuta Meig.*

<i>Sciomyzides.</i>	
<i>Dryomyza</i> sp.?	<i>staceo subviriscentibus, oculis magnis, nitidis, nigris; abdomine postice bilobo.</i>
<i>Opomyzides.</i>	<i>Long. 3$\frac{1}{2}$ l. — lat. abd. 2$\frac{1}{4}$ l.</i>
<i>Calobata cibaria?</i> L.	<i>Oestracides.</i>
<i>Orthalides.</i>	<i>Oestrus trompe</i> Modeer.
<i>Trypera continua</i> Meig.	<i>— tarandi</i> L.
<i>Scatomyzides.</i>	<i>Conopsides.</i>
<i>Cordylura haemorhoidalis</i> Meig.	<i>Myopa testacea</i> F.
<i>Dolichopodes.</i>	<i>— tessellatipennis</i> Motsch.
<i>Dolichopus ungulatus</i> L.	<i>Fusco-picea, nitida, abdomine fasciis cinereis tribus, ore frontisque pallide-testaceis, antennis rostro pedibusque plus minusve brunneis; alis dilute infuscato tessellatis, nervis nigro-piceis.</i>
— sp.?	<i>Long. 3$\frac{1}{4}$ l. — lat. thor. 1 l. exp. alar. 7 l.</i>
<i>Muscides.</i>	<i>Syrphides.</i>
<i>Anthomyza tabida</i> ..	<i>Paragus rufiventris</i> Motsch.
— <i>cunicularis</i> L	<i>— obscurus</i> Meig.
— sp.?	<i>Eristalis</i> sp.?
<i>Musca domestica</i> L.	<i>Sceaeva vitripennis</i> Meig.
<i>Exorista prominens</i> Meig.	<i>— arcuata</i> Fall.
<i>Erebia tremula</i> L.	<i>Syrphus floreus?</i> Fall.
<i>Sarcophaga albiceps</i> Meig.	— sp.?
<i>Phorocera pullata</i> ...	<i>Volvucella tabanoides</i> Motsch.
<i>Gonia microceps</i> Motsch.	<i>Magna, nigro-picea, fronte, ore, rostro, thoracis lateribus maculaque basali, scutello alarumque basi florotestaceis, abdomine dimidio antice albo-testaceo; alis fusco bifasciatis,</i>
<i>Tantum Gon. capita, sed capite minore, angustiore, abdominis lateribus postice testaceis.</i>	<i>Long. 6$\frac{3}{4}$ l. — lat. thor. 2$\frac{1}{3}$ l. — exp. alar. 18 l.</i>
<i>Rhyzomyzides.</i>	
<i>Trixa? nodifrons</i> Motsch.	
<i>Ocyptera borealis?</i> Zetterst.	
<i>Coriacées.</i>	
<i>Hippobosca oculata</i> Motsch.	
<i>Dilatata, depressa, fusco picea fronte, scutello femoribusque te-</i>	

Merodon narcissus Meig.

Milesia speciosa

Xylota segnis L.

Empides.

Rhamphomyza sp.?

Empis borealis? L.

Hybosides.

Hybos muscarius F.

Leptides.

Leptis scolopacea? F.

— *tessella Motsch.*

*Subabbreviata, nigra, cinereo
sparsim puberula, abdomine och-
raceo, medio nigro maculato;
elytris lato fusco variegatis.*

Long. 3 l. — lat. thor. $\frac{5}{4}$ l. — exp.
alar. 7 l.

Anthracides.

Anthrax flava Meig.

— *maura F.*

Tabanides.

Chrysops bipunctatus Motsch.

*Niger, fronte, thoracis lineis
quatuor marginaque segmentorum
abdominis postice cinereo pube-
rulis; ore antennarum basi ab-
dominisque dimidio antice albo-
testaceis, hoc in medio punctis
nigris duobus; alis hyalinis, fas-
cia media costaque antica nigris.*

Long. 4 l. — lat. abd. $1\frac{1}{2}$ l. — exp.
alar. 8 l.

Haematopoda pluvialis F.

Tabanus tarandinus L.

— *fulvus? Fall.*

— *oculatus Motsch.*

— *bromius L.*

Asilides.

Dasypteron sp.?

Asilus culiciformis Pall.

— *germanicus Meig.*

Laphria rufipes Fall.

VIII. LÉPIDOPTÈRES.

1. Rhopalocères.

Papilio Maakii Ménétr.

— *xuthus L.*

— *machaon L.*

Parnassius Nomion Fisch.

— *Phoebus F.*

— *Stubbendorffii Ménétr.*

Leucophasia sinapis L.

— *amurensis Ménétr.*

Pieris crataegi L.

— *daplidici L.*

— *napi L.*

— *melete Ménétr.*

Anthocharis cardaminis L.

Gonopteryx rhamni L.

— *Aspasia Ménétr.*

Colias palaeo L.

Argynnis Paulina Nordm.

— *Sagana Doubl.*

— *paphia L.*

— *adippe L.*

— *laodice Pall.*

— *daphne F.*

— *ino Rott. Esp.*

- Argynnis Euphrosyne L.*
- *ossianus Herbst.*
 - *oscarus Eversm.*
- Melitaea amphioxus Ménétr.*
- *latonigena Eversm.*
 - *phœbe W. V.*
 - *trivia W. V.*
 - *didyma Esp.*
 - *parthenie Borkh.* var.
orientalis Ménétr.
 - *protomedia Ménétr.*
 - *dictyna Esp.*
 - *athalia Esp.*
- Araschnia prorsa L.*
- Grapta c-album L.*
- Vanessa V album W. V.*
- *xanthomelas W. V.*
 - *urticae L.*
 - *io L.*
 - *antropa L.*
- Pyramus cardui L.*
- *cathirhoe Hüb.*
- Neptis aceris Esp.*
- *lucilla W. V.*
 - *Philyra Ménétr.*
 - *thisbe Ménétr.*
- Athyma cassiope Ménétr.*
- *nycteis Ménétr.*
- Limenitis populi L.*
- *Sydyi Kinderm.*
 - *amphyssa Ménétr.*
- Adolias Schrenkii Ménétr.*
- Apatura iris L.*
- *ilia F.*
- Pronophila Schrenkii Ménétr.*
- Erebia parmenio Böber.*
- *eumonia Ménétr.*
 - *Sedakovi Eversm.*
- Arge halimedæ Ménétr.*
- Chionobas Nanna Ménétr.*
- *urda Eversm.*
 - *jutta Hüb.*
- Lasiommata epimenides Ménétr.*
- Pararga dejazita L.*
- *deidamia Eversm.*
2. *Hétérocères.*
- Lithosia rubricollis L.*
- *quadra L.*
 - *griseola Hüb.*
- Euthemonia russella L.*
- Chelonia leopardina Ménétr.*
- Arctia fuliginosa L.*
- *urticae Esp.*
- Dianochetus niveus Ménétr.*
- Limacodes littoralis Westw.*
- Liparis dispil L.*
- Leucania V-nigrum F.*
- Lasioecampa quercifolia L.*
- *femorata Ménétr.*
- Odonestis potatoria L.*
- Clisiocampa neustria L.*
- Bombyx fasciatella Ménétr.*
- Aglia tau L.*
- Brahmaea lunulata Brem.*
- Attacus carpini W. V.*
- Lophopteryx camelina L.*
- Pygaera timon Hüb.*
- Cymatophora or W. V.*
- *ocularis L.*
- Hydroecia micaea Esp.*
- Mamestra abjecta Hüb.*
- Apamea gemina Hüb.*
- Agrotis femoralis Tausch.*
- Tæniocampa rubricosa W. V.*
- Cerastis serotina Oehs.*
- Dianthoecia conspersa W. V.*
- Alecta occulta L.*

<i>Cloantha perspicillaris L.</i>	<i>Eupisteria quinquaria Hüb.</i>
<i>Heliothis campostigma Ménétr.</i>	<i>Aspilates mundataria Cram.</i>
<i>Anthoecia? sigillata Ménétr.</i>	— <i>formosaria Eversm.</i>
<i>Calpe thalictri Borkh.</i>	<i>Eubofia mensuraria W. V.</i>
<i>Amphipyra pyramidea L.</i>	<i>Coremia ferrugaria L.</i>
<i>Amphipyra perluta F.</i>	<i>Cidaria marmoraria Hüb.</i>
— <i>Schrenkii Ménétr.</i>	<i>Larentia dilutaria W. V.</i>
<i>Toxocampa pastinum Treitsch.</i>	<i>Melanippe hastaria L.</i>
<i>Euclidia glyphica L.</i>	— <i>alchemillaria L.</i>
<i>Zethes musculus Ménétr.</i>	— <i>unangularia Wood.</i>
— <i>subfalcata Ménétr.</i>	— <i>luctuaria W. V.</i>
<i>Pyralis regalis W. V.</i>	— <i>marginaria Hüb.</i>
<i>Aglossa pinguinalis L.</i>	<i>Zerene grossularia L.</i>
<i>Spilodes cinctalis Treitsch.</i>	— <i>flavipedaria Ménétr.</i>
<i>Angeroma prunaria L.</i>	— <i>ulmaria F.</i>
<i>Phorodesma smaragdaria Esp.</i>	<i>Pylarge commutaria Treitsch.</i>
<i>Geometra glauca L.</i>	<i>Strenia clathraria L.</i>
— <i>herbacea L.</i>	<i>Lozotaenia ribeana Hüb.</i>
<i>Tephrosia crepuscularia W. V.</i>	<i>Tortrix palleana Mazz.</i>
<i>Boarmia roboraria W. V.</i>	<i>Psecadia pyraustella Her.-Sch.</i>
— <i>rhomboidaria W. V.</i>	<i>Adela Georella L.</i>
<i>Fidonia atomaria L.</i>	En tout environ 1000 espèces.
— <i>melanaria L.</i>	