


- Tab. I.
- 1. *Dytiscus latissimus* *Mas.* Fabric.
  - 2. *Dytiscus latissimus* *Fem.* Fabric.
  - 3. *Dytiscus marginalis* *Mas.* Fabric.
  - 4. *Dytiscus marginalis* *Fem.* Fabric.
  - 5. *Dytiscus striatus* *Mas.* Fabric.
  - 6. *Dytiscus transversalis* *Mas.* Fabric.
  - 7. *Stigmus pendulus* Panzer.
  - 8. *Cephalcia nemorum* Panzer.
  - 9. *Cephalcia arvensis* Panzer.
  - 10. *Pompilus exaltans* Fabric.
  - 11. *Pompilus bifasciatus* Fabric.
  - 12. *Pompilus punctum* Jurine.
  - 13. *Bembex sinuata* Panzer.
  - 14. *Trachusa strigata* Panzer.
  - 15. *Trachusa Serratulae* Panzer.
  - 16. *Lasius Salviae* Panzer.
  - 17. *Bremus regelationis* Panzer.
  - 18. *Bremus pomporum* Panzer.
  - 19. *Syphus quadrimaculatus* Panzer.
  - 20. *Syphus globulus* Panzer.
  - 21. *Aranea Einaeae* Tölt.
  - 22. *Aranea annulata* Panzer.
  - 23. *Phalaena dolabria* Fabric.
  - 24. *Lithosia irrorata*, Fabric.





*Dytiscus latus* *simus* *Mas Fabr.*

*Loc. Itineris Japon.*



DYTISCVS latissimus. Mas.

*Der breiteste Wässerkäfer. Das Männchen. Grand Ditisque  
--- large. Degeer.*

*DYTISCVS latissimus* : niger elytrorum marginibus delatatis: linea flava. *Fabrič.*  
*Syst. Eleenth.* T. I. n. 1. p. 257. *Syst. Entom.* n. 1. p. 230. *Spec. Inf.* T. I.  
n. 1. p. 290. *Mant. Inf.* T. I. n. 1. p. 189. *Entom. system.* T. I. n. 1. p. 187.

*DYTISCVS latissimus. Linn.* *System. Nat.* n. 6. p. 665. *ed. XIII.* n. 6. p. 1944.  
Fn. *Suec.* n. 768.

*Illiger Kugelann. Käf. Preus.* I. n. 1. p. 251.

*Degeer Inf.* IV. n 1. p. 390.

*Frisch Inf.* P. II. tab. 7. fig. 1. 2.


*Bergstræss. Nomencl.* I. 28. tab. 5. fig. 1.

*Schæffer Ic. Inf.* *Ratisb.* tab. 217. fig. 1.


Harrer Beschreib. d. Schäff. Inf. T. I. n. 179. p. III.

Panzer Entom. germ. I. n. 1. p. 73.

Habitat in aquis, piscinis: piscibus admodum infestus: in propriam speciem  
laevit. Mas glaber, patellatus.



*Dytiscus latissimus* Fem. Fabr.



DYTISCVS latissimus Femina,  
Der breiteste Wässerkäfer. Das Weibchen.

*DYTISCVS latissimus*. Fabric. l. l. c. c. Linn. l. l. c. c.

Bergstraesser Nomencl. I. 23. tab. 5. fig. 2.

Sulzer abgek. Gesch. d. Inf. p. 59. tab. 6. fig. 19.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 217. fig. 2.

*Dytiscus amplissimus*. Müll. Zool. dan. prodr. n. 662.

Harrer. Beschr. d. Schäff. Inf. T. I. n. 150. p. 112.


Habitat cum mare. Femina sulcata, absque patellis.





*Dytiscus marginalis* Mac Fabr.

6. 1000



DYTISCVS marginalis Mas.

Der gelbgesäumte Wasserkäfer. Das Männchen. Le Ditisque noir à bordure. Geoffr. Grand Ditisque à bordure complète. Degeer.

*DYTISCVS marginalis*: niger, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 258. Syst. Entom. n. 3. p. 230. Spec. Inf. T. I. n. 3. p. 291. Mant. Inf. T. I. n. 3. p. 189. Entom. system. T. I. n. 3. p. 187.

*Dytiscus marginalis*. Linn. System. Nat. n. 7. p. 665. ed. XIII. n. 7. p. 1944.  
Fn. Suec. n. 769.

Geoffr. Inf. T. I. n. 2. p. 186.

Degeer Inf. T. IV. n. 2. p. 223. tab. 16. fig. 1 2.

Scop. carn. n. 294.

Ulliger Kugelann. Käf. Preuf. I. n. 3. p. 253.

*Rossi* Faun. etrusc. T. I. n. 488. p. 229.

*Bergstraess* Nomencl. I. n. 1. tab. 1. fig. 1.

*Rösel* Ins. Bel. II. 21. tab. 1. fig. 9.

*Schaeffer* Ic. Ins. Ratisb. tab. 8. fig. 8.

*Harrer* Beschr. d. Schäff. Ins. T. I. n. 181. p. 112.


*Panzer* Entom. germ. I. n. 2. p. 73.

Habitat in aquis, piscinis,



*Dytiscus marginalis* Fem. Fabr.

Jac. Schenck fecit



DYTISCVS marginalis. Femina.

Der gelbgesäumte Wässerkäfer. Das Weibchen.

DYTISCVS marginalis. Fabric. l. l. c. c.

*Dytiscus semifasciatus*. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 665, ed. XIII, n. 8. p. 1945. Fn.  
Suec. n. 772.

*Dytiscus semifasciatus*. Schrank. inf. austr. n. 374.

Geoffr. Inf. T. I. n. 3. p. 187. tab. III. fig. 2.

Bergstraess. Nomencl. I. n. 2. tab. I. fig. 2.

Rösel Inf. Bel. II. 21. tab. I. fig. 10.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 8. fig. 7.

Harrer Beschr. d. Schäff. Inf. T. I. n. 182. p. 113.


Habitat cum mare.





*Dytiscus striatus* Fem. Fabr.

Sturm fec.



DYTISCVS striatus Mas.

Der gestreifte Wasserkäfer. Das Männchen. *Ditisque à stries transverses.* Degeer.

*DYTISCVS striatus*: fuscus thorace flavo: fascia abbreviata nigra, elytris transversim subtilissime striatis. Fabric. Syst. Ent. L. n. 16. p. 261. Syst. Ent. n. 7. p. 231. Spec Inf T. I. n. 8. p. 293. Mant. Inf. T. I. n. 9. p. 190. Ent syst. T. I. n. 10 p. 189.

*Dytiscus striatus*. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 665. ed. XIII. n. 9. p. 1946. Faun. Suec. n. 770.

Degeer Inf T. IV. n. 5. p. 399. tab. 15. fig. 16.


Illiger Kugel Käf. Preus. I. n. 7. p. 257.


Rossi Faun. etrusc. T. I. n. 494 p. 233.

Panzer Entom. germ. l. n. 6 p. 74.

Habitat in aquis. Maris patellae exiguae.

a Elytron magnitudine auctum.





*Dytiscus transversalis* Nas Fabr.

Jac. Sturm fec.



DYTISCVS transversalis Mas.

Der braune Wässerkäfer mit der gelben Queerstreife.

*DYTISCVS transversalis*: ater thorace antice ferrugineo, elytrorum margine,  
striaque baseos abbreviata flavis. *Fabric. Syst Eleuth.* T. I. n. 38 p. 265.  
*Spec. Inf.* T. I. n. 18. p. 294. *Mant. Inf.* T. I. n. 23. p. 191. *Entom. syst.*  
T. I. n. 26. p. 192.

*Illiger* Kugel. Käf. Preuß. I. n. 8. p. 257.

*Panzer* Entom. germ. I. n. 17. p. 76.

Habitat in aquis.

a Tibia antica patellata magnitudine aucta, a parte inferiori.





*Stigmus pendulus* Mih.

J. St. fee.



S T I G M V S pendulus.

*Die gestielte Spitzwespe.*

*STIGMVS pendulus* : ater nitens , abdomine petiolato , antennis tibiisque flavis.

Habitat in floribus umbelliferar.

Caput atrum transversum. Antennae flavae, articulo primo maior. Thorax scutellum atra immaculata. Abdomen atrum nitidum petiolatum apice acuminatum. Tibiae flavae, posticae annulo nigro. Femora nigra. Alae hyalinae nervo antico crassiori flavo , puncto fusco.

a Magnitudo naturalis. b. Eadem aucta.

and the other two were  
the same as the first.  
The last was  
the same as the first  
but the last one  
was a little  
higher than the others.  
The last one  
was the highest  
of all.



*Cephalecia nemorum* Mihú.

St. geo.



CEPHALCIA nemorum.


Die Hainen Blatwespe.

*CEPHALCIA nemorum*: antennis multiarticulatis: corpore nigro capite maculis, antennis tibiisque flavis.

Habitat in sylvaticis.

Media. Caput atrum nudum nitidum: clypeo tenuissime flavo marginato, lineaque angusta ante oculos interdum interrupta, maculisque duabus verticalibus flavis. Instrumenta cibaria omnia flava: mandibulae exsertae acutae bidentatae. Antennae fere corporis longitudine flavae, articulo primo supra macula nigra. Oculi prominuli fusci. Thorax ater nitidus immaculatus, puncto ante alas calloso scutelloque flavis, punctisque duobus aliis sub scutello albis. Abdomen sublineare depresso atrum nitidum immaculatum. Pedes omnes flavi. Alae hyalinae, puncto marginali nigro.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.





*Cephalcia arvensis* Mihi.

J. St. L...  
1850



## C E P H A L C I A arvensis.

Die Akker-Blattwespe.

**CEPHALCIA arvensis**: antennis multiarticulatis nigra, corpore depresso anten-  
nis pedibusque flavis.

Habitat in sylvaticis.

Habitus et statura. *Cephalc. erythroceph.* Caput atrum transversum, punctis plurimis excavatis nitidum; clypeo ferrugineo marginato, oculorum orbita, maculisque duabus verticalibus lineolisque duabus occipitalibus ferrugineis. Oculi fusci prominuli. Antennae flavae apice fuscae. Os palpis mandibulisque flavum. Thorax ater nitidus punctatus: lineola antice transversa, punctisque duobus dorsilibus, utrinque calloso ante alas rufis. Scutellum atrum immaculatum. Abdomen ferrugineum nitidum depresso dorso fusco. Pedes omnes rufis, femoribus posticis supra nigris. Alae flavicantes punto marginali nigro.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Sechs und achtzigstes Heft.

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00


1970. 10. 10. 10:00

1970. 10. 10. 10:00



Pompilus exaltatus Fabr:

J. St. fec.



POMPILVS exaltatus.

Die halbschwarz - halbrothe Grabwespe mit den weissen Flügelflecken.

**POMPILVS exaltatus**: niger abdomine rufo apice atro, alis apice fuscis: pun-  
cto albo. *Fabric. Entom. system. Suppl. n. 31. p. 251.*

*Spbex exaltata*. *Fabric. Syst. Ent. n. 31. p. 151. Spec. Inf. T. I. n. 42. p. 449.*  
*Mant. Inf. T. I. n. 49. p. 277. Entom. syst. T. III. n. 69. p. 214.*

Habitat in fabulosis, interdum floribus infidet.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.





*Pompilus bifasciatus* Fabr.

J. St. fec.



POMPILVS bifasciatus.

Die auf den Flügeln zweygebänderte Grabwespe. L'Ichneumon noir à deux bandes sur les ailes. Geoffr.

**POMPILVS bifasciatus**: ater immaculatus alis albis: fasciis duabus nigris. Fabric.

Entom. syst. Suppl. n. 16. p. 248.

*Spbex bifasciata*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 58. p. 212.

*Ichneumon niger*, alis fascia dupli transversa nigra. Geoffr. Ins. T. II. n. 37.  
p. 337.

Habitat in argillofis.

a Magnitudo naturalis, b Eadem aucta.





*Pompilus punctum Turinc.*

J. St. fee.



POMPILVS punctum.

Die schwarze Grabwespe mit dem weisen Afterpunkt.

*POMPILVS punctum*: niger ano puncto albo.

*Evania punctum*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 6. p. 194.

*Sphex punctum*. Fabric. Spec. Ins. T. I. n. 33. p. 448. Mant. Ins. T. I. n. 39. p. 276.

Habitat in fabulosis, in floribus.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

the liver liver

liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver


liver liver liver liver liver liver liver

liver liver liver liver liver liver liver



*Bembecia sinuata* Miki.

J St. fee.



BEMBEX sinuata.

Die buchtig gelbbandirte Schnabelwespe.

*BEMBEX sinuata*: labioconico flavo nigra, abdomine atro fasciis flavis repandis, prima interrupta.

Habitat in editioribus. *Dn. Iurine.*

Habitus et statura *Bemb. rostrata*, quamvis omnino diversa. Caput fuscum albido pubescens. Orbita interrupte rufa: lineola utrinque ante oculos, alia dupli verticali, aliisque transversa ante clypeum rufis. Clypeus os labiumque flava. Antennae supra nigrae subtus flavae: articulo primo longiori toto flavo. Oculi fusti. Thorax pubescens antice lineola utrinque curvaturam emittente flava; basi tinctura rufa. Scutellum immaculatum. Abdomen atrum subnitidum, segmentis omnibus fascia flava sinuata, primo interrupto. Anus acutus flavus punctis duobus nigris. Pedes omnes flavi: femora flava supra nigra. Alae subflavifantes hyalinae.

THE SONGS -

1. *Wade in the water* -

2. *Wade in the water* -

3. *Wade in the water* -

4. *Wade in the water* -

5. *Wade in the water* -

6. *Wade in the water* -

7. *Wade in the water* -

8. *Wade in the water* -

9. *Wade in the water* -

10. *Wade in the water* -


11. *Wade in the water* -

12. *Wade in the water* -



*Trachusa strigata* Nili.

J. S. G.



TRACHVSA strigata.

Die gestrichelte Biene.

*TRACHVSA strigata*: nigra thorace maculato, abdomine maculis utrinque quinque transversis flavis, primis duabus marginalibus, reliquis dorsalibus.

Habitat in floribus verticillatar.

Habitus statura et magnitudo *Trachus. lituratus*. Fn. Ins. germ. XXC. ast distincta. Caput atrum punctatum opacum pubescens, maculis duabus frontalibus, duabusque verticalibus pone oculos flavis. Os nigrum. Antennae brevissimae nigrae. Oculi fusci. Thorax ater punctatus pubescens, striga antica interrupta, puncto utrinque baseos marginali, et alio calloso ante alas flavis. Scutellum quadrimaculatum, maculis anticis marginalibus minoribus. Abdomen atrum punctatum gibbum: maculis utrinque quinque transversis flavis: primis duabus marginalibus: altera maiori; reliquis tribus dorsalibus subaequalibus: segmento ultimo nigro immaculato,

tertio et quarto utrinque puncto marginali flavis. Pedes omnes flavi: femoribus posticis supra infraque macula nigra. Alae fuscescentes. Abdomen subtus lana flava.

*Variat* scutello bimaculato, segmento tertio et quarto punctis marginalibus nullis.

*Variat* fronte immaculata, punctis loco maculis verticalibus flavis: scutello bipunctato: abdome maculis utrinque septem: quatuor marginalibus, tribus dorsalibus: segmento ultimo semper immaculato.

Ad *Trachus. maculat.* omnes illae species cum suis varietatibus adeo accedunt, ut varietatum more cum ea tantum coniungi posse videantur.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



*Trachusa Serratulae Mihai.*

J. St. fcc.



TRACHVSA Serratulae.

Die Scharten-Biene.

*TRACHVSA Serratulae*: fusca thorace cinereo hirto, abdomine segmentis marginē albido ciliatis, labio mandibulisque flavis.

Habitat in *Serratula arvensi* Linn.

Caput atrum cinereo pubescens. Frons albido villosa, labio maculaque utrinque sub antennis flavis. Mandibulae tridentatae flavae apice fuscae. Oculi cinerei. Antennae nigrae. Thorax ater cinereo tomentosus immaculatus. Abdomen subovatum atrum segmentorum marginibus albido pubescentibus. Alae obscurō-fuscantes. Pedes nigri albido pubescentes.


a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.





*Lasius Salviae Milti.*

J. St. Fer.



L A S I V S   S a l v i a e.

Die Salbey-Biene.

*LASIVS Salviae*: cinereo villosus, abdomine globoso atro, segmentorum marginibus albis, tarsis flavis.

Habitat in hortis in *Salviae officin.* floribus.

Caput atrum cinereo pubescens. Frons sub antennis labiumque flava. Antennae nigrae. Oculi fusci. Thorax ater cinereo-villosus immaculatus. Abdomen globosum atrum, segmentorum marginibus albis. Pedes nigri cinereo pubescentes, tarsis omnibus flavis. Alae albae apice fuscescentes.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.

1870-1871

1871

1871-1872

1872

1872-1873

1873-1874

1874-1875

1875

1875-1876



*Bremus regelationis* Niki.

7. Et fæ.



BREMVS regelationis.

Die Frühlings - Hummel.

*BREMVS regelationis*: hirsuta nigra: frōnte thoraceque flavis fascia nigra: ab-  
domine atro ano fulvo.

Habitat primo vere in hortis et pratis.

Media. Caput atrum. Frons flava. Thorax ater antice posticeque flavo  
marginatus. Abdomen atrum ano late fulvo. Pedes nigri rufo pubescentes. Alas  
hyalinae.

— 1900-1901

— 1901-1902

— 1902-1903

— 1903-1904

— 1904-1905


— 1905-1906

— 1906-1907



*Bremus pomorum* Miki.

J. S. L.




B R E M V S - p o m o r u m .

*Die Obst-Hummel.*

*BREMVS pomorum*: hirsuta nigra, thorace pallido fascia nigra, abdomine fulvo primo segmento pallido.

Habitat in pomariis.


Caput atrum hirsutum, fronte atro barbata, clypeo calvo atro nitida. Thorax albido canescens medio nigrofasciatus. Abdomen rufum, basi pallidiore, segmento primo albido. Pedes nigri tarsis tibiisque posticis rufo ciliatis. Alae hyalinae apice obscuriores.





*Syrphus quadrimaculatus* Mih.

J. St. fec.



SYRPHVS quadrimaculatus.

Die viergefleckte Schwebfliege.

*SYRPHVS quadrimaculatus* : antennis setariis subtomentosus, thorace caeruleo - marginato, ab domine nigro maculis pellucidis quatuor.

Habitat in floribus.

Caput atrum nitidum pubescens. Antennae fuscae feta nigra. Oculi fuscii cupreo - marginati. Thorax atro caeruleo - subtomentosus immaculatus. Clava halterum flava. Abdomen depresso marginatum atrum s. atro - caeruleo - subtomentosum, segmento secundo et tertio maculis duabus albidis pellucidis. Pedes nigri pubescentes. Corpus subtus albidum. Alae nigricantes.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Constitutive

metabolic pathway

Metabolic pathways are composed of a series of sequential reactions catalyzed by enzymes.

Enzyme

Enzymes are proteins that act as catalysts for metabolic reactions.

Enzymes are specific for the reaction they catalyze.

Enzymes are proteins that act as catalysts for metabolic reactions.

Enzymes are specific for the reaction they catalyze.


Enzymes are specific for the reaction they catalyze.

a



*Syrphus globulus* Mih.

J. St. fee.



SYRPHVS globulus.

Die kuglichte Schwebfliege.

*SYRPHVS globulus*: antennis setariis subnudus, thorace subgloboso nigro, abdome flavo globoso inflato basi fusco fasciato, apice punctis duobus fuscis.

Habitat in floribus. *Dn. Patricius Trost.*

Habitus et statura *S. gibbi* et *gibbosii*. Caput exiguum orbiculatum. Oculi connati fuscii. Antennae in vertice approximatae breves, seta brevissima. Thorax ater subpubescens nitidus gibbus elevatus suborbiculatus, antice et postice utrinque interrupte albido marginatus. Scutellum atrum nitidum. Abdomen globosum inflatum flavum, segmento primo fusco, maculis duabus flavis, secundo antice fusco marginato, tertio maculis marginis artici tribus, punctisque dorsalibus duobus fuscis, quarto flavo punctis duobus minoribus fuscis. Pedes flavi, unguis fuscis. Alae hyalinae. Squama halterum magna hyalina concava.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.





Aranea Erinaceus Trost.

J. St. f.



A R A N E A E r i n a c c u s.

Die Stachel-Spinne.

*ARANEA Erinaceus*: pallida hispida, abdomine subgloboso fusco.

*Phalangium Erinaceus*. Trost Beytr. I. n. 645.

Habitat locis obscuris subhumidis. Dn. Patr. Trost,

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1924.11.22 6.30 AM

— 24.11.22

2024.11.22 6.30 AM  
and 2024.11.22 6.30 AM  
2024.11.22 6.30 AM  
2024.11.22 6.30 AM



*Aranca annulata* Mihi.

J. St. fec.



A R A N E A a n n u l a t a.


*Die Ringel-Spinne.*


*ARANEA annulata*: cinerea nuda, abdomine orbiculato cinereo, strigis duabus abbreviatis punctatis: pedibus posticis fusco annulatis.

Habitat in editioribus argillosis.

Parva. Caput et thorax albida. Palpi albidi. Abdomen orbiculatum globosum cinereum fusco marginatum, punctis minutissimis adspersum, strigisque duabus fuscus e punctis approximatis. Pedes citrini: posticii fusco annulati.


a Magnitudo naturalis, b Eadem aucta.





*Phalaena dolabraria* Fabr.

J. St. 12.



**PHALAENA dolabraria.**

*Der Wintereichenspanner. Der Eichenmesser. Der Birkenmesser.  
Der Brandvogel. Der Hobelspanner.*

**PHALAENA dolabraria** : pectinicornis alis angulatis flavis : strigis ferrugineis, angulo ani violaceo. *Fabric. Ent. System. T. V. n. 32. p. 138. Synt. Ent. n. 17. p. 621. Spec. Ins. T. II. n. 26. p. 187. Mant. Ins. T. II. n. 21. p. 245.*

**PHALAENA Geometra dolabraria.** *Linn. Synt. Nat. n. 207. p. 861. ed. XIII. n. 207. p. 2451.*

*Syst. Verz. d. W. Schmett. n. 16. p. 104.*

*Sulzer abgek. Geschichte der Insekten p. 161. tab. 22. fig. 9.*


Die Raupe nährt sich von Eichenlaube vorzüglich, doch soll sie auch auf Birken angetroffen werden. Im Iunius und im September soll man sie schon völlig ausgewachsen angetroffen haben. Der Schmetterling ist in ebendemselben Jahre schon mehrmals zweymal angetroffen worden: im April und im Iulius.





*Lithosia irrorata* Fabr.

J. St. Sc.



LITHOSIA irrorata.

Die Baumflechteneule. Die Pomeranzenmotte. Die gelbe schwarzpunktirte Motte. Phalene jaune à points noires. Degeer.

*LITHOSIA irrorata*: alis luteis: anticis punctis nigris trifariis, thorace antice posticeque fulvo. *Fabric.* Ent. syst. Suppl. n. 12. p. 461.

*TINEA irrorella*. *Fabric.* Ent. Syst. T. V. n. 18. p. 291. Syst. Ent. n. 9. p. 657. Spec. Inf. T. II. n. 11. p. 291. Mant. Inf. T. II. n. 14. p. 241.

*PHALENA Tinea irrorella*. *Linn.* Syst. Nat. n. 354. p. 885. ed. XIII. n. 354. p. 2588. Fn. Suec. n. 1361.

*Verz. d. W. Schm.* n. 6. p. 68.

*Sulzer.* abgek. Gesch. d. Inf. p. 162. tab. 23. fig. 10.

*Degeer* Inf. T. II. P. I. p. 342. tab. 5. fig. 12.

Die Larve soll sich nicht nur von der *Wandfleckte*, sondern auch von mehreren ähnlichen Arten dieser Gewächse nähren.

