

Abdomen inséré à la base du métathorax, ovalaire, convexe, un peu aminci aux deux bouts, incurvé à l'extrémité, sans pétiole, avec cinq arceaux¹ dorsaux et autant d'arceaux ventraux ; anus apparent également » (Westwood).

Ce genre renferme de nombreuses espèces exotiques propres à l'Amérique du Nord, à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud et à l'Afrique, et une seule indigène.

1. « Corps lisse et luisant, à ponction inaparente ; antennes composées de 21 articles, d'après la figure². Tête à vertex assez convexe, presque horizontal, en rectangle transversal ; front penché immédiatement en bas et presque vertical ; deux crêtes longitudinales et trauchantes derrière les trous antennaires. Antennes plus longues que la tête et le thorax réunis, plutôt filiformes que fusiformes, radicule apparente. Mesonotum à sillons parapsidaux droits et peu enfoncés ; scutellum plan et penché en arrière ; métathorax convexe avec un sillon longitudinal assez profond, aboutissant en arrière à une fente triangulaire et membraneuse, élargie en-dessous pour donner une issue au premier segment abdominal. Corps noir ; les quatre tarses antérieurs et la face externe des tibias de la première paire, pâles ; ailes hyalines, une grande tache enflumée sur les 2^e et 3^e cellules cubitales et à la base de la radiale ; stigma et nervures noirs » (Spinola). Taille ♂ : 9-45^{mm}. Femelle inconnue.

Hahni SPIN. Pl. XVIII, fig. 1.

1. Cela vaut du moins pour l'espèce européenne ; certaines espèces exotiques, par exemple *T. Leprieuri* Spin. en ont davantage, à savoir sept.

2. Les deux antennes du dessin de Spinola sont composées de 21 articles dans le texte, Spinola n'en parle pas ; il faut remarquer qu'il ne relève que les différences de cette espèce d'avec *T. Leprieuri* ; or, pour cette dernière il écrit : « antennes de vingt et un articles. »

MŒURS ET PATRIE : Dans son *Catalogue synonymique des Hyménoptères de France*, 1874, Dours considère cette espèce, sans l'affirmer, comme parasite d'un *Vespa*. Voir ce qui a été dit plus haut. Russie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, France.

— « Corps à ponctuation généralisée et bien marquée ; antennes de 25 articles y compris la radicule. Front incliné, excavé à côté des yeux, avec trois proéminences, une supérieure et deux sur un plan plus inférieur ; la supérieure petite, conique, terminée par un sommet obtus et lisse, les deux inférieures de forme triangulaire, mais à côtés curvilignes, le côté supérieur le plus long, aminci, se terminant par un angle pointu dirigé en avant, le côté antérieur concave en avant pour donner dans son milieu insertion au premier article de l'antenne, le côté inférieur tenant au front dans sa plus grande partie, les deux proéminences inférieures un peu plus longues que le second article des antennes. Celles-ci plus longues que la tête et le thorax ; 1^{er} article petit et globuleux, le 2^e gros et oviforme, le 3^e aussi long que large, les suivants minces, diminuant successivement d'épaisseur et de longueur. Bord postérieur de la tête rebordé ; tête excavée en arrière, de manière à emboîter le prothorax.

Thorax gibbeux, légèrement convexe en avant, déclive dans sa partie postérieure, se rétrécissant jusqu'à l'insertion de l'abdomen. Bord antérieur du prothorax mince, caché par la tête, se reliant sur les côtés au mésothorax par deux plaques concaves en avant et se terminant à l'écaillle des ailes. Les trois lobes du mésothorax chagrinés, particulièrement le médian. Ecusson assez grand, post-écusson

trapézoïdal ; de chaque côté deux sillons larges et profonds, avec de fortes rides. Méta-thorax se terminant par un rebord enclavant une partie membranuse et ayant de chaque côté un stigmate. Fémurs, tibias et tarses couverts d'un duvet jaunâtre serré. [Ailes comme il vient d'être dit pour le type]. Abdomen subpétiolé, de 5 segments ponctués uniformément, avec duvet jaune brun sur les côtés ; le 1^{er} en trapèze allongé, déprimé à sa face supérieure sous forme de cupule, lisse près de son insertion à l'abdomen, le 2^e plus grand que les autres, le dernier acuminé. Ventre de 5 segments sans sillons. Noir luisant, couvert d'un léger duvet brun-jaunâtre ; tous les tarses fauves au côté intérieur, surtout les tarses antérieurs ; bord des segments abdominaux 2 à 4 avec un léger liseré brun foncé sur la partie médiane. Taille ♂ : 12^{mm.}» (Jacobs).

Hahni var. solitaria Jac.

PATRIE : Belgique. Capturé au mois d'Août.

REMARQUE. — A ajouter à la Bibliographie des Trigonalides :

MAGRETTI, 1897, Viaggio di Leonardo Fea in Birmania. — Ann. Mus. civ. di Genova (2) vol. 17 p. 308-326.