

Exercitationes
Hymenopterologicæ

Ad illustrandam
Faunam Svecicam,
quas

Venia Ampliss. Facultatis Philos. Acad. Lund.

Proponunt

GUSTAV. DAHLBOM,

Historia Natur. Doc., Societ. Linn. Holm. Membr.

et

N. P. RINGSTRAND, *ref*

Ostro-Gothi.

In Acad. Carolina die xxvii Octobris MDCCCXXXII.

Part. IV.

Londini Gothorum,
Typis BERLINGIANIS.

MDCCCXXXII.



Tiphia abdominalis Panz. Fn. Ins. Germ. 53. tab. 5. certe ♂ figura adprobanda, at directio nervorum in alis non vere delineata, nullum enim vestigium appendicis in area costali ultima detegitur; abdominis segmenta basalia pinxit auctor subcoccinea etsi ferruginea esse debuissent.

Dimorpha abdominalis Panz. Krit. Revis. 11 Bändchen pag. 127 — &c. . . —

Hab. passim rarior, in Ostro-Gothia (ad Lärketorp 26 Julii, ipse) — Westro-Gothia, D. D. Gyllenhal, Schönherr & König; — Oelandia, D. Zetterstedt, — Scania ad Gyllebo, D. Fallén.

D. I. v. *Mas.* & *Fem.* In suo genere maxima. Feminae majori individuo *Pompili viatici* longitudine æqualis. Griseo-tomentosa. Caput, thorax vage punctata et pedes, tota nigra. Palpi fusci; labialium articulus 2:us ceteris articulis latior, obtrigonus, ad angulum apicis externum dilatatus vel productus. Clypeus pro ratione corporis brevissimus, medio convexiusculus, utrinque depressus, apice elevatus. Antennarum articuli basales pilis rigidis nigris adpressis. Facies et frons crebre punctata, hæc medio canaliculata. Vertex, latera capitis pone oculos, prothorax, scutellum et postscutellum nitida, punctis perpaucis adpersa. Tegula fusca. Alæ hyalinae, maris medio subinfuscatæ, feminae apice distincte infuscatæ l. nigricantes; areolæ exterior subquadrata, nervulo connectente externo extrorsum flexo; areolæ interior subpentagona. Postfrænum dorso cancellatum, postice truncatum et fovea subeordata impressum. Femora incrassata; tibiae triplici serie spinosæ; tarsi brunnescetes, spinosi. Abdomen nitidum, subtilissime coriaceum, basi oblique truncatum et impressum ad petiolum; segmentis 1:mo et 2:do totis, 3:tio vel toto vel basi usque ad impressionem undatam ferrugineis l. rufis, reliquis segmentis unacum segmenti 1:mi macula basali violaceo-nigris l. nigro-violacis.

Not. Segmenta abdominis in hac specie impressionibus undatis transversis ita notata, ut, quod in descriptione generis jam allatum, primo obtutu duplicia videantur.

2. *L. pinguis*: nigra, nitida, glabriuscula, alis hyalinis, areolæ exteriori l. oblongo-subquadrata l. subtriangulari, abdomine basi ferrugineo ♀.

Hab. rariss. mense Julio, in Oelandia ad Gårdslösa, Scania ad Esperöd et Kjeslinge; WestroGothia.

♀ Wadff.
26 Jul. 1871

D. I. v. *Femina*. In suo genere minima. Præcedenti affinis, at triplo minor et vere distincta. Nigra, nitida, subglabra, pube fusca brevissima vage et parce adpersa. Caput, thorax et postscutellum sublævia, punctulis paucis impressa. Palpi fusci Mandibulæ rufopiceæ, apice nigricantes, pilis rigidis fuscis ciliatæ. Labrum exsertum oblongo-quadratum, ciliatum, mandibulis concolor. Clypens brevissimus, ciliatus, ut in præcedente constructus. Antennarum articuli basales pilis paucis rigidis fuscis adpressis. Frons et facies medio subtiliter canaliculata. Tegula fusco-brunnea, apice subtestacea. Alæ hyalinæ: areæ costalis ultimæ appendice in rudimento; areolæ et exterior et interior ut in specie præcedente formatæ. Postfrænum dorso subtiliter coriaceum nec ut in *L. gibba* cancellatam, postice (supra petiolum) sublæve nitidum rotundato-truncatum et foveola triangulari impressum. Femora compressa, paullo incrassata; tibiæ et tarsi ut in præcedente, sed parcius spinulosa. Abdomen subtilissime et vix conspicue coriaceum, nitidissimum quasi vernice vel liquore pingui obductum; hinc nomen specificum "*pinguis*" quocum hæc species in museo Dom. Professoris Zetterstedt designata exstat. Segmenta abdominis: 1:um (excepta macula basali nigra) et 2:um, tota, 3:tiumque lato lateribus, ferruginea l. rufa, reliqua violaceo-nigra. Impressiones segmentorum omnino eadem ac in præcedente.

Antennae subgeniculatae, medio parum incrassatae, articulis subcontiguis. Abdomen oblongo-ovalum, basi coarctatum, fere ut in Pompilis. Area costalis ultima oblongo-ovata, non appendicea.

3. *L. tumida*: nigra, nitida, sericeo-subpubescens orbita oculorum interna, lateribus clypei, thoracis abdominisque maculis, flavescente albis; hoc basi pedibusque ferrugineis, tarsis fuscescentibus; alis hyalinis, areolae exteriori subquadrata ♀.

var. a. ♀. Antennarum scapo subtus flavescente albo, articulis reliquis totis nigris.

var. b. ♀. Antennarum scapo articulisque, 9:mo apice, 10:mo, 11:mo et 12:mo totis, subtus flavescente albis.

Pompilus tumidus Panz. Fu. 81. tab. 15: "niger abdomine rufo apice nigro, lunulis duabus pone medium, macula anali flavis. — — — — Abdomen subpedicellatum, elongatum nitidum, segmentis tumidis." &c.

Hab. in Ostro-Gothia et Scania rarius.

D. L. e. *Femina*. Longitudine *Pompili viatici*. Nigra nitida, pube brevissima sericeo-micante adpersa. Caput et thorax subtilissime coriacea, vage punctata. Palpi et mandibulae rufopiceae; hae apice nigricantes. Labrum paullo exsertum, semilanatum, flavum, pilis albidis ciliatum. Clypeus brevis, subplanus, medio serie punctorum transverse impressus lateribus flavescente albus, apice subcastaneus. Orbita oculorum interna ad faciem flavescente alba. Frons, facies canaliculata. Antennae nigrae, radícula brunnescente, scapo subtus flavescente albo; praeterea in varietate b articulis nono apice et reliquis ultimis toto latere inferiore flavescente albis. Vertex ad oculos utrinque macula subcastanea. Prothorax lateribus utrinque lineola arcuata impressus. Tegula brunneo-

testacea. Alae hyalinae l. subhyalinae; areolae exterior major sub-quadrata l. potius rhombiformis, interior trapeziformis. Scutellum macula transversa, ovata flavopictum; serie punctorum, intra suturam qua se jungitur a mesothoracis lobo antico, profunde impressum. Postfrenum medio profunde canaliculatum, canaliculo apicem versus in lineam elevatam terminato; basi longitudinaliter profunde striatum, circa striae triangulo e lineis elevatis punctisque extra lineas profunde impressis inscriptum; postice declive l. oblique rotundato-truncatum, supra petiolum foveolis lineolisque elevatis notatum. Pedes rufocastanei, coxis trochanteribusque nigris. Femorum anteriorum basis, intermediorum linea longitudinalis et posteriorum basis geniculique, nigra; tibiae posticae apice concolores. Tarsi anteriores fusci, postici nigri. Abdomen nitidum, vix conspicue sericeo-pubescent, parce punctatum, subtilissime coriaceum; segmentis paulo convexioribus quam in conspeciebus, minime vero, ut *Panzer* scripsit, tumidis; segmento 1:mo praeter maculam basalem nigram toto rufocastaneo, 2:do concolore et apice utrinque macula introrsum emarginata s. lunula flavescente alba picto, reliquis totis nigris, excepta macula segmenti 5:ti basali flavescente alba.

Obs. Nomen *Panzeri* "tumida" minus aptum videtur, cum segmenta abdominis non magis in hac specie quam in conspeciebus tumida obveniunt; attamen, ne nostro vitio Synonymia crescat, idem retinendum, etsi "*scutellaris*" (nam scutellum flavomaculatum), sub quo nomine hanc speciem in museo Cel. Professoris *Zetterstedt* asservatum lustravimus, forte magis placeret.

4. *L. lunata*: nigra, nitida, sericeo-subpubescent, orbita oculorum interna, lateribus clypei, scutelli abdominisque maculis, flavescente albis; alis hyalinis, areolae exteriori subquadrata; pedibus ferrugineis, tarsis fuscescentibus. ♀.

In Scania ad Esperöd detecta a D. Zetterstedt
in cuius musco "*L. lunata*" denominata invenitur;
in Wadstena-Löf Ostrogothiæ et in campo Kärlinge
Scaniæ non frequenter mense Julio a nobis capta.

D. I. v. *Femina*. Præcedenti maxime affinis ejus-
demque longitudine. Nigra, nitida, pube brevissima
sericeo-micante adspersa. Caput, thorax et postscu-
tellum sublavialia l. subtilissime vix conspicue coria-
cea et parce vage punctata. Palpi fuscii. Mandibula
nigropicea, apice dilutiores. Labrum, clypeus, anten-
næ et orbita oculorum omnino ut in præcedente. Te-
gula nigrobrunnea, apice testacea. Alæ hyalinae, va-
riis coloribus micantes; areolæ exterior major sub-
quadrata; angulo extimo vix tam longe quam in *tumida*
producta; areolæ interior trapeziformis. Post-
frænum ut in *L. tumida* constructum, striis et im-
pressionibus tamen subtilioribus. Pedes rufo-cas-
tanei, coxis trochanteribusque nigris; femoribus basi
nigropiceis, tarsis fuscis. Abdomen nitidum, pun-
ctatum, castaneum, subpubescens; totum nigrum, nec
ut in præcedenti basi rufo-castaneum; segmentis: 2:do
utrinque macula s. lunula apicali et 5:to apice macu-
la undata flavescente albis. — Utraque macula seg-
menti 2:di introrsum juxta segmenti marginem in li-
neam angustam producta, unde quasi unica tantum
macula semilunata exstat; hinc nomen.

B. Mandibula apice acuminata integra, externe
prope basin profunde emarginata, interne uni-
aut bi-denticulata; denticulo interiori majori.
Ocelli parvi in triangulum elongatum disposi-
ti. Area costalis ultima vel appendicea vel
non appendicea. Femora antica subtus pro-
pe basin in maribus emarginata, in femi-
nis integra. Abdomen subconicum basi trun-
catum.

• *Areola gemina* — *Lyrops* Latr.

5. *L. pectinipes*: nigra, nitida, sericeo-subpu-

Sphex *pectinipes*, ♀ *pinus* - *quercus*.
bescens, alis hyalinis, apice infuscatis, areolæ
exteriori subrectangulari, abdomine basi fer-
nigineo. ♂♀.

Mas: oculis pallide viridibus et convergenti-
bus. *Femina*: oculis nigris, magis distantibus.

Sphex pectinipes: Linn. Syst. Nat. 2. 944. 17. ♀.
Fn. Sv. 1654. ♀ certe: "Descr. Minor. Corpus totum
nigrum, læve. Pedes antici extrorsum tibiis valde ci-
liatis. Alæ fuscæ absque puncto marginali. Ab-
dominis tria segmenta priora ferruginea."

Tamquam vera *Sphex pectinipes* Linnæi e collectione
Academiæ Scientiarum Holmiensis a D. Professore Dal-
man ad D. Profess. Zetterstedt missa; cum eodem no-
mine Linnæano in Museo D. Professoris Fallén etiam
designata.

Larra Pompiliformis Panz. Fn. 89. t. 13. ♂.
Hab. in Ostro- & Westro-Gothia, Gottlandia,
Smolandia, Scania, passim frequenter.

D. I. v. *Mas* & *Femina* in copula. Precedente
paullo major, magnitudine tamen variat. Corpus
oculo armato sericeo micans. Caput, collare, meso-
thorax et postscutellum subtiliter coriacea, crebre
punctulata. Palpi fusi. Mandibulæ ciliatæ, nigropi-
cæ, medio versus apicem rufescentes, interne distin-
cte bidentulatæ. Clypeus subsemilunatus, vage et
profunde punctatus, medio convexus, apice depressus.
Facies utrinque depressa, tuberculo gemino supra
scrobes distincto. Frons canaliculata. Tegula fusca,
apice subtestacea. Alæ hyalinæ, variis coloribus mi-
eantes, apice infuscata, area costali ultima appendi-
cea; areolæ exterior subrectangularis, interior trape-
ziformis. Postfrænum coriaceum, postice foveola ob-
longa ad petiolum producta impressum. Pedes nigri;
tarsis dilutionibus. Abdomen impressionibus ita ut
in *L. gibba* et *pingui* notatum: segmentis 1:mo, præ-
ter maculam basos nigram, et 2:do totis 3:tiæque a
basi ultra medium, rufis, reliqua parte abdominis
nigra.

Not. Linnæi tempore, quo paucas species hujusce familiæ sibi cognitâs habuerunt Entomologi, nomen "*pectinipes*" sorte characteristicum fuit; sed hoc tempore, quo quadruplicem specierum numerum cognoscimus, atque in feminis fere omnibus earundem tarsos anticos spinis pectinatos observavimus, idem minus aptum obveniat necesse est. — Attamen, eidem legi, quam inviolatam Celeberr. Zitterstedt in opere suo recentissimo "*Fauna Insectorum Laponica*" servavit religiose addicti, "*nomina primaria et præsertim Linnæana non nisi caute et summa necessitate urgente esse mutanda, ne Synonymia in infinitum augeatur*", nomen illud Linnæanum iterum recepimus. — Panzeri Nomen "*pompiliformis*" huic speciei impositum, eo potius rejiciendum, quod sub eodem duas distinctas *Larvæ* species descripserit Cl. Panzer acil in Fn. Germ. 86. tab. 13. et 106. tab. 17.

6. *L. unicolor*: tota nigra nitida, sericeo-pubescent, alis subhyalinis, areolæ exteriori sub-rhomboidali, abdomine segmentis apice sericeo-micantibus. ♂♀.

Larva unicolor Panz. Fn. 106. 16. "*atra immaculata, abdominis segmentis lucidis*." Pubescentia cinerea l. sericea, qua segmentorum margines et reliquas partes corporis ornantur, in individuo à Cl. Panzer descripto certe detrита fuit. Hoc eo magis credere ausi sumus, quod ipsi legimus individua quibus omnes notas characteristicas, hic infra allatas, applicare potuimus, præter pubem cinereo-micantem quæ maxima ex parte detrита fuit.

Larva Pompiliformis Panz. Fn. 106 t. 17. certe eadem esse videtur: "*atra, cinereo-pubescent, abdominis segmentis cinereo-fasciatis lucidis*."

Lyrops unicolor." ♂. D. Marklin in litteris ad D. Gyllenhal.

Hab. in Bahusia et Scania, rariss. Individuum.

masculum Ad Uddewalla Bahusia a Cl. Marklin detectum, teste Nobil. Gyllenhal, qui propter suam erga Entomologiae cultores solitam benevolentiam et favorem, idem nobis communicavit. — In Scania ad Lomma 26 Junii et ad Kjeslinge 16 Julii utrumque sexum ipsi legimus.

D. I. v. *Mas* et *Femina*. Summa affinitas praecedentis, sed corpore toto nigro distincta. Pube sericeo l. cinereo-micante vestita. Caput et thorax praecedentis. Palpi fuscii. Mandibulae non ciliatae, piceae, medio versus apicem rufescentes, interne obsolete undenticulatae. Clypeus ut in praecedente, sed subtiliter coriaceus parciusque apice punctatus. Frons vix canaliculata, gibba. Tegula maris subtestacea, feminae nigrobrunea. Alae hyalinae, micantes; areae costalis ultima appendice in rudimento; areolae exteriori subrhomboidali, interiori subtrapeziformi. Tarsi basi nigri, apice l. testacei, l. nigri annulis testaceis. Abdomen subconicum, totum nigrum; segmentis margine apicali pube cinerea l. sericea micantibus s. lucidis. — In ceteris praecedentis descriptio mutatis mutandis huic speciei accommodanda.

Areola simplex et petiolata (l. forte rectius, areolae geminae exterior omnino deficiens, interior petiolata). — *Miscopus* Lotr.

7. *L. spuria* tota nigra, nitida, sericeo-pubescentis, alis hyalinis, areola costali ultima ovata, non appendicea, tarsis nigris, abdomine segmentis apice sericeo-micantibus. ♀.

Hab. mensibus Julio et Augusto, in Ostro-Gothia paucim ex. c. ad Wadstena Löt, Medhamra Ång; &c. — Bahusia ad Uddewalla rarior, D. Marklin, testante D. Gyllenhal, a quo specimen unicum sub nomine "*Miscopus unicolor*" nobis transmissum. In Scania ad Kjeslinge minus frequenter obvia.

D. I. v. *Femina*. Magnitudo, structura et color

+ apice
falsus

7 in
Wadst.
Löt.
17 Jul -
22 Aug.

eadem ac speciei proxime præcedentis. Tota nigra, sericeo-pubescent. Alæ hyalinae varie micantes; area costalis ultima ovata, non appendicea. Tarsi nigri. Abdominis segmenta apice, ut in *L. unicol.*, pube cinerea s. sericea micantibus.

Phalanx II. Speculum sub medio areolæ ita insertum ut nervus connectens, qui a costali ultima exiens areolam in duas dividit, fere æqualiter distet ab utroque insertionis puncto in speculo.

Dolichurus.

Spinola Insect. Ligur. Latr. — Dictionn. Class. D'Hist. Nat. par Audouin &c. T. 5. p. 583. *Pison* Latr. *Spinola*.

Caput prothorace antice duplo latius. Antennæ sub lamina faciali producta insertæ. Alæ medium abdominis vix excedentes. Femora clavata. Abdomen conicum.

Corpus mediæ l. minoris magnitudinis, oblongum, pubescens. *Coput* suborbiculatum, prothorace antice duplo latius. *Labium* emarginatum. *Palpi* maxillares angusti, labiales crassiusculi. *Mandibulae* apice bidentatae: dente exteriori majori, acuminato. *Clypeus* medioeris, subtriangularis, medio in carinulam longitudinalem elevatus, utrinque paullo depressus, apice truncatus. *Facies* medio instructa est lamina, quæ, longitudinalis, brevis, marginata, apice truncata, e fronte oritur. *Antennæ* filiformes setaceæ extrorsum attenuatae, sub apice laminæ facialis ad clypeum insertæ: articulis elongatis, scapo reliquis fere triplo crassiore, oblongo, supra deplanato, pedicello subgloboso. *Oculi* medioeres, oblongo-ovati. *Prothorax* antice angustatus, depressus, capite duplo angustior; postice elevatus, subquadratus, utrinque tuberculatus. *Mesothoracis* lobus anticus lineis quatuor scil. duabus longioribus et duabus brevioribus

impressus. *Postfrænum* rugosum, subcancellatum. *Alæ* subhyalinæ. *Pedes* parce et breviter spinulosi femoribus *clavatis*. *Abdomen* subconium, basi truncatum et impressum, 6-segmentatum: segmentis immidis.

Hoc genus, — habitu et directione nervorum in alis *Pompilis*, prothoracis, mandibularum abdominisque forma *Larris* affine, — in limite inter hæc genera non inepte collocatum credidimus.

1. *D. ater*: punctulatus, pubescens, nitidus, alis subhyalinis immaculatis: areolæ exteriori vel trapeziformi vel subquadrata; postfræno bispinoso, pedibus submuticis 39.

Mas: paullo minor, clypeo albo-bimaculato, antennis gracilioribus.

Femina: paullo major, clypeo nigro, antennis crassioribus.

Dolichurus ater Maxim. Spinola Ins. Ligur. Latr. Gen. Crust. & Ins. IV. Add. & Castig. pag. 387. — *Pison ater* Spinol. Ins. Lig. fasc. 4. p. 254. — Latr. Gen. Crust. & Ins. IV. p. 58. — *Pompilus clavipes* Dahlb. monogr. Pompilorum. Svec. 10. 14. *).

*) Hanc speciem in *Monographia Pompilorum Svecia* F. c. sub nomine *P. clavipes* descripsimus, et si ob structuram quarundam partium a *Pompilis* reliquis alienam, jam tunc valde dubiosam existimavimus, Lectoribus querentes "an proprii generis?" — Quam autem in Collectionibus Lundensibus jam "*Pompilus clavipes*" denominata esset, et in Libris Entomologicis, qui hæc in Bibliothecis asservantur, nihil commemorati de hoc Insecto invenire possemus; nos quidem, tunc observationes publici juris prima vice facturi, novum genus ex unica specie condere non ausi sumus. — *Gyllenhalia* igitur Celeberrimo, qui deinde in litteris benevole nobis indicavit, hoc insectum longe antea inter *Insecta Ligurica*, a Comite Spinola descriptum et *Dolichurum* atrum denominatum esse, quam maximam habemus gratiam.

Hab. rarius: in Ostrogothia, Mus. D. Zetterstedt, in Westrogothia, D. D. Gyllenhal et Boheman, qui species utriusque sexus benigne nobis transmiserunt.

"On le trouve en Italie et dans quelques points de la France. *Basoche* l'a souvent rencontré dans le département du Calvados. *Latrille* pense que la femelle dépose ses œufs dans les vieux bois." *Audouin* in Dictionn. Class. 1. c.

D. I. v. *Mas et Fem. Pompilo pulchro* longitudine subæqualis. Corpus totum atrum nitidum. Caput et thorax in mare parcius quam in femina griseo-et fusco-pubescentia, pilis rigidis nigris hinc inde adpersa, profunde et subtiliter parce punctulata. Clypens maris ad carinulam utrinque macula rotundata albo-pictus. Antennæ maris graciliores quam feminae. Alæ subhyalæ, variis coloribus micantes; areolæ maris exterior et interior trapeziformes, — feminae exterior subquadrata, interior trapeziformis; arbolæ interior in utroque sexu major quam exterior; nervuli connectente externus et internus flexi, et intermedius rectus, obveniunt. Postfrænum postice utrinque in spinulam parvam, obtusam productum. Pedes submutici; tibiæ spinulis tantum paucis et brevissimis instructæ, spinis tibiæ ordinariis subtestaceis, tarsis nigrobrunneis. Abdomen nitidissimum, quasi vernice obductum, punctulis paucis impressum, longius robustiusque in femina quam in mare. Stylus feminae analis subexsertus.

Divisio II: *da*: Prothorax arcuatus, ad radicem alarum extensus. Speculum sub medio areolæ ita insertum ut nervus connectens, qui a costali ultima exiens areolam in duas dividit, fere æqualiter distet ab utroque insertionis puncto in speculo. — Abdomen utriusque sexus petiolo brevissimo. — *Pompilii Fallén.*

Pompilus

Latr. Fabr. Fall. &c.

Caput prothorace vix l. parum latius. Alæ apicem abdominis plerumque non excedentes. Abdomen oblongo-ovatum, teres, basi subito-coarctatum.

Corpus mediæ l. minoris magnitudines, oblongum, glabriusculum et pubescens. *Caput* prothorace paullo latius. *Palpi* plerumque penduli, maxillares labialibus duplo longiores. *Lingua* rarius extensa, sæpius capiti adpressa. *Mandibula* apice bidentata: dente exteriori l. acuminato l. obtusato, — interiori brevi acuto, nonnumquam minuto et vix conspicuo. *Labrum* l. extensum, l. sub clypeo retractum. *Clypeus* brevis aut medioeris, convexus, basi linea transversa in foveola laterali utrinque desinente, a facie distinctus. *Facies* juxta antennas impressa medio sæpissime canaliculata. *Antennæ* ut in Sphegibus insertæ, filiformes, longitudine thoracis, articulo ultimo subconico. *Oculi* magni, ovati exserti. *Vertex* et *frons* convexiuscula. *Prothorax* capite parum augustior, duplo latior quam longior, antice plerumque declivis, linea transversa paullo pone marginem anticum ad latera desinente impressus; postice mesothoraci altitudine æqualis; medio plerumque canaliculatus, foveola intra angulum lateralem posticum gibbum impressa. *Mesothorax* et *postscutellum* subtiliter confertimque punctulata, ut in Sphegibus constructa; *Postfrænum* subtiliter coriaceum, medio sæpissime capaliculatum, postice oblique subtruncatum. *Alæ* subhyalinae aut nigricantes, versus abdominis apicem, quam raro excedunt, extensæ. *Pedes* fere ut in Sphegibus. *Abdomen* oblongo-ovatum, teres, basi subito-coarctatum, versus apicem sensim attenuatum, segmentis dorsalibus 6 in utroque sexu.

Motu agilis, celerrime currens, abrupte volans.

Pompilus ab hostibus persecutus, in cuniculum