

des neun und siebenzigsten Hefts.

- Tab. 1. *Coccinella marginepunctata* Fabric.
— 2. *Coccinella sedecimpunctata* Fabric.
— 3. *Coccinella septempunctata* Fabric.
— 4. *Coccinella (Argus Scrib.) undecimmaculata* Fabric.
— 5. *Coccinella septemnotata* Fabric.
— 6. *Coccinella ocellata* Fabric.
— 7. *Cynips megaptera* Panzer.
— 8. *Ichneumon vaginatorius* Fabric.
— 9. *Ichneumon vaginator.* var.
— 10. *Ichneumon nominator* Fabric.
— 11. *Ichneumon deprimator* Fabric.
— 12. *Ichneumon circulator* Panzer.
— 13. *Ichneumon nuncupator* Panzer.
— 14. *Ichneumon fasciatus* Fabric.
— 15. *Chrysis fulgida* Fabric.
— 16. *Chrysis rufa* Panzer.
— 17. *Agrion Virgo* α Fabric.
— 18. *Agrion Virgo* β Fabric.
— 19. *Lygaeus equestris* Fabric.
— 20. *Lygaeus familiaris* Fabric.
— 21. *Lygaeus hyoscyami* Fabric.
— 22. *Lygaeus saxatilis* Fabric.
— 23. *Papilio nymphalis Iris* Fabric.
— 24. *Papilio nymphalis Ilia* Fabric.



Coccinella marginpunctata Fabr.

J. St. fec.

COCCINELLA marginepunctata.

Der am Rande punktirte Marienkäfer.

Coccinella marginepunctata: coleoptris flavis: margine albido, punctis duobus nigris. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. II. p. 268. *Mant. Inf.* T. I. n. 8. p. 52.

Schaller in Act. soc. nat. cur. Hal. T. I. p. 260.

Illiger Kugelann. Inf. Preus. T. I. n. 26. p. 438.

Schneider N. Mag. II. p. 156. c.

Scriba Iourn. II. n. 144. p. 186.

Panzer Entom. germ. I. n. 5. p. 133.


Habitat in Salicibus.

Haec species a cl. *Illiger* l. c. pro matre *Cocc. sedecimpunctat.* *Fab.* habetur, quod negavit cl. *Schneider* l. c. qui *Cocc. sedecimpunctat.* *Fab.* protospeciem *Cocc. marginepunctatae* *Fab.* esse contendit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Neun und siebenzigstes Heft.

E



a

Coccinella sedecimpunctata Fabr.

J. St. fec.

COCCINELLA sedecimpunctata.

Der sechzehnpunktirte Marienkäfer.

Coccinella sedecimpunctata: coleoptris luteis: punctis nigris sedecim, capite quadri-punctato. *Fabric. Ent. syst. T. I. n. 65. p. 280. Spec. Inf. T. I. n. 41.*
p. 100. *Mant. Inf. T. I. n. 59. p. 58.*

Herbst Nat. d. Käf. V. n. 78. p. 322. tab. 57. fig. 10.

— — Archiv IV. n. 11. p. 44. tab. 22. fig. 6.

Illiger Kugelann. Inf. Preuss. T. I. n. 26. b. p. 438.

Schneider N. Mag. II. n. 17. p. 155.

Panzer Entom. germ. I. n. 31. p. 140.

Habitat in Salicibus.

Desunt saepius puncta disci, tunc ad antecedentem refertur; si autem adsint, numerum puncorum *sedecim*, computatis marginalibus complement. Vtraque species hinc mox varietas, mox protospecies esse possit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Coccinella septempunctata Fabr.

J. St. fee.

COCCINELLA septempunctata.

Der siebenpunktirte Marienkäfer. Der Siebenpunkt. La Coccinelle rouge à sept points noires. Geoffr.

Coccinella septempunctata: coleoptris rubris: punctis nigris septem. Fabric. Entom. syst. T. I. n. 41. p. 274. Syst. Ent. n. 13. p. 81. Spec. Inf. T. I. n. 21 p. 96. Mant. Inf. T. I. n. 36. p. 57.

Coccinella septempunctata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 581, ed. XIII. n. 15. p. 1649. Fn. Suec. n. 477.

Geoffr. Inf. T. I. n. 3. p. 321. tab. 6. fig. 1.

Degeer Inf. V. p. 428. n. 4. tab. 10. fig. 14.

Scop. carn. n. 235.

Schrank. austr. n. 98.

Lachard. tyr. Inf. I. n. 3. p. 116.

Rösel Inf. Bel. II. tab. 2.

Sulzer Kennz. d. Inf. p. 6. tab. 3. fig. 13.

Herbst Nat. d. Käf. V. n. 76. p. 317. tab. 57. fig. 8.

Rossi Faun. etrusc. T. I. n. 153. p. 65. ed. Hellwig.

Illiger Kugelann. Käf. Preuß. I. n. 27. p. 440.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 9, fig. 7.

Harrer Beschr. d. Schäff. Inf. I Th. n. 75. p. 79.

Panzer Entom. germ. I n. 18. p. 137.

Vulgatissima ubique plantarum degit. Raro variat. Odontalgiae mederi
plebecula credit, ad instar *Curculion. antiodontalgici* Italor.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Coccinella Argus Scrib.

J. St. fec.

COCCINELLA Argus.

Der Argus-Marienkäfer. La Coccinella Argus. Geoffr.

Coccinella Argus: coleoptris rubris punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato. *Scriba* Iourn. II. n. 148. p. 188. *Beytr.* II. n. 20. tab. 8. fig. 6.

Geoffr. Inf. T. I. n. 9, p. 325.


Coccinella undecimmaculata: coleoptris rubris: punctis nigris undecim; corpore ferrugineo. *Fabric.* Entom. syst. T. I. n. 54. p. 277. *Mant.* Inf. T. I. n. 47. p. 57.

Illiger Kugelann. Käf. Preuf. I. p. 468.

Panzer Entom. germ. I. n. 30 p. 140.

Habitat minus frequens in Salice, Populo.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Coccinella septemnotata Fabr:

J. St. fec.

COCCINELLA septemnotata.

Der siebennotirte Marienkäfer.

Coccinella septemnotata : oblonga coleoptris rubris: punctis septem nigris, thora ci s margine punctisque duobus albis. *Fabric. Ent. syst. T. I. n. 43. p. 275*

Schneider N. Magaz. III. p. 378.

Illiger Kugelann. Käf. Preuf. I. n. 15. p. 426. var. a.

Panzer Entom. germ. I. n. 20. p. 137.

Varietas *Cocc. mutab. Schneid. l. c. aliorumque est, et ad C. sexpunctatam*
demto punto scutellari, proprius accedit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Coccinella ocellata Fabr.

J. St. fee.

COCCINELLA ocellata.

Der Augeu-Marienkäfer. *Coccinella à 15 points noirs.* Degeer.

Coccinella ocellata: coleoptris luteis: punctis nigris quindecim subocellatis. Fabric.
Entom. syst. T. I. n. 64. p. 280. Syst. Ent. n. 27. p. 83. Spec. Inf. T. I.
n. 40. p. 100. Mant. Inf. T. I. n. 58. p. 58.

Coccinella ocellata. Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 582. ed. XIII. n. 23. p. 1654. Faun.
Suec. n. 484.

Degeer Inf. T. V. n. 10. p. 431. tab. II. fig. 1.

Schrantz inf. austr. n. 105.


Laichard. tyr. Inf. I. n. 11. p. 129.

Herbst Nat. d. Käf. V. n. 77. p. 319. tab. 57. fig. 9.

Illiger Kugelann Käf. Preus. I. n. 25. p. 437.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. I, fig. 2.

Harrer Beschr. d. Schäff. Ins. I. Th. n. 82. p. 85.
Panzer Entom. germ. I. n. 29. p. 140.
Habitat in Salicibus, floribus etc. haud infrequens. Variat immaculata.
a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Cynips megaptera Mihi.

J. St. fec.

CYNIPS megaptera.


Die grossflüglische Gallwespe.

Cynips megaptera: nigra abdomine ferrugineo postice fuscescente, pedibus pallidis, alis maculis duabus obsoletis fuscis.

Legi in *Angelica sylvestri* L.

Magna in hoc genere. Caput nigrum ore ferrugineo. Antennae longiusculae fuscae articulo primo ferrugineo articulis 15. Thorax ater nitidus margine parum pubescens. Scutellum elevatum obtusum. Alae corpore maiores hyalinae pungatissimae margine postico ciliatae, disco maculis duabus obsoletis fuscis: inferiores immaculatae. Nervorum venarumque divisio earundemque divisio earundemque conjunctio abludit in huius speciei alis adeo, ut nisi reliqua convenirent, vix ad hoc genus retulerim. Pedes pallidi. An *Cyn. Rosar. F.* affinis?

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta,



Ichneumon vaginatorius Fabr.

J. St. fec.

ICHNEVMON vaginatorius.

Die schwarze gelbausgerandet gebänderte Schlupfwespe.

Ichneumon vaginatorius: scutello albo thorace maculato, abdomine nigro: fasciis quinque albis; tertia interrupta. *Fabric. Entom. syst. T. I. n. 42. p. 143.* *Syst. Entom. n. 19. p. 330.* *Spec. Inf. T. I. n. 19. p. 403.* *Mant. Inf. T. I. n. 23. p. 261.*

Ichneumon vaginatorius. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 932. ed. XIII, n. 15. p. 2680.*
Fn. Suec. n. 1592.

Rossi *Faun. etrusc. T. II. n. 750. p. 38.*

Schäffer *Ic. Inf. Ratisb. tab. 83. fig. 7.*

Legi raro in umbelliferis ad aquarium versuras.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Ichneumon vaginator. Variet. Fabr.

J. St. fee.

ICHNEVMON vaginatorius Varietas.^f

Die schwarze gelb ausgerandet gebänderte Schlupfwespe. Abänderung.

Ichneumon vaginatorius. Fabric. Linn. l. l. c. c.

Schäffer Ic. Ins. Ratisb. tab. 83. fig. 8.

Convenit hoc specimen cum antecedenti in omnibus, excepto segmento antepenultimo abdominis, quod bipunctatum est. An ideo varietas duntaxat transitoria, aut constans sexus sit, haud contendere ausim. Legit eam amicissimus Flessa eodem loco, quo postridie genuinam speciem vidi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Ichneumon nominator Fabr.

J. St. fec.


ICHNEVMON nominator.

Die gelbe schwarzgefleckte Schlupfwespe mit der weissen Makel in den brauen Flügeln.

Ichneumon nominator: luteus nigro maculatus alis fuscis: lunula alba. Fabric.
Entom. syst. T. I. n. 93. p. 155.

Legi quotannis in Corylo: aphidophilos.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Ichneumon deprimator Fabr.

J. St. fec.

ICHNEVMON deprimator.

Die kleine Schlupfwespe mit flachem Uuterleibe.

Echneumon deprimator: ater abdomine depresso piano, pedibus rufis. *Fabric.*
Entom. system. Suppl. p. 227.

Legi saepius in plantis aphidibus infestis.

Alae sunt minime obscurae, sed hyalinae, fascia media subgemina fuscescente. Reliquis convenit. Pedes omnes rufi, femoribus tibiisque posticis apice, tarassisque penitus nigris. Antennae corpore longiores,

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Ichneumon circulator Mihi.

J. St. fec.

ICHNEVMON circulator.


Die gelbbauchigte schwarzgegürtele Schlupfwespe.

Ichneumon circulator: ater thorace immaculato, abdomine cylindrico rufo, segmento secundo tertio apice nigris, pedibus posticis nigro annulatis.

Legi minus frequens inter Aphides.

Antennae porrectae nigrae basi subtusque flavae. Caput et thorax atra omnino immaculata. Abdomen subcylindricum rufum, segmento primo macula trigona nigra; secundo, tertio apice cingulo nigro; quarto, quinto immaculatis; ultimis nigris: aculeo brevi exerto. Pedes rufi; antici immaculati: femora media et postica apice nigra: tibiae posticae medio et apice, tarfisque omnibus nigro annulatis. Alae obscuro hyalinae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Ichneumon nuncupator Mihi.

J. St. fec.

ICHNEVMON nuncupator.

Die rothgelbe Schlupfwespe mit halb schwarzer Brust und Unterleib.

Ichneumon nuncupator: flavescentia, thorace scutelloque rufis, abdomine postice capite antennis pedibusque flavis.

Legi raro in umbelliferis.

Caput flavum, vertice, maculaque occipitali nigra. Mandibulae apice fuscae. Oculi nigri. Antennae flavescentes. Thorax rufus nitidus sub scutello niger. Scutellum rufum. Abdomen subpetiolatum nitidum ferrugineum, basi nigrum; sub nigredine parum pallescens. Pedes flavi, posticis apice tarsisque annulatis nigris. Aculeus brevis exsertus triplex. Alae hyalinae immaculatae.

a. Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Ichneumon fasciatus Fabr.

J. St. fcc.


ICHNEVMON fasciatus.

Die flügelloſe rothe ſchwarz gebänderte Schlupfwespe.

Ichneumon fasciatus: apertus rufus capite abdominalisque fascia nigris. **Fabric.**
Entom. Syſt. T. I. n. 242. p. 191.

Habitat raro in floribus Syngenesiae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Chrysis fulgida Fabr.

J. St. fee.

CHRYYSIS fulgida.

Die schimmernde Goldwespe. La Guepe dorée à corcelet vert, et derniers anneaux du ventre epineux. Geoffr.

Chrysis fulgida: glabra nitida, thorace abdominisque primo segmento caeruleis, reliquis aureis, ano quadridentato. Fabric. Entom. syst. T. I. n. 8. p. 240. Spec. Ins. T. I. n. 7. p. 455. Mant. Ins. T. I. n. 7. p. 283.

Chrysis fulgida. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 948. ed. XIII. n. 7. p. 2746. Faun. Suec. n. 1669.

Geoffr. Ins. T. II. n. 20. p. 382.

Schrantz ins. austr. n. 783.

Rossi Faun. etrusc. Mant. n. 292. p. 133.

Variat ab domine primo et secundo segmento caeruleis, quod cl. Rossi bene observavit.

Nidificat in argillaceis haud infrequens.

a Magnitudo naturalis, b Eadem aucta,



Chrysis rufa Mihi.

J. St. fee.

CHRYYSIS rufa.

Die rothbauchigte Goldwespe.

Chrysis rufa: glabra thorace viridi postice bidentato, abdomine rufo ano integro.
Legi rarissime in argillaceis.

Habitus et statura *Chrysidis regiae* F. Caput obscuro viride, fronte foveolata cyanea. Antennae longiusculae nigrae. Thorax ante cyanens postice viridis uncinque argute dentatus. Abdomen minime aureum sed rufum, seu potius obscure ferrugineum, certo situ parum cupreo micans, hinc vel illinc leviter pubescens. Anus omnino integer. Femora cyanea, postica clavata. Tibiae virides. Tarsi fusci. Alae fuscantes, nervo antico crassiori marginali nigro, venis intermediis pene oblitteratis. Pro *Chryside rosea* Rossi facile habuisse, nisi abdominalis color, huiusque segmentorum inaequalis divisio obstaret.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Agrion Virgo var. α Fabr.

Jac. Sturm fec.

AGRION Virgo.

Die Flussnymphe. Die Wasserungfer. Die Libelle. La Demoiselle.
La Louise. Geoffr.

Agrion Virgo: alis erectis coloratis. **Fabric.** Entom. syst. T. III. n. t. p. 386.
Syst. Entom. n. 1. p. 425. Spec. Inf. T. I. n. 1. p. 526. Mant. Inf. T. I.
n. 1. p. 339.

Libellula Virgo. **Linn.** Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626. Fn.
Suec. n. 1470.

Libellula Virgo: corpore sericeo nitido: alis luteo fuscis: margine immaculatis.
Linn. Faun. Suec. ed. I. n. 756. α .

Libellula corpore viridi-caeruleo nitida, alis medio caerulecentibus, basi et apice
albis, margine immaculato. **Geoffr.** Inf. T. II. n. 1. p. 221. α .

• **Rösel** Inf. Bel. T. II. tab. 9. fig. 7.

Schrantz, inf. austr. n. 600.


Scopoli carn. n. 681. var. 3. ic. 681.

Rossi Faun. etrusc. T. II n. 948. α .

Schaeffer Elem. entom. tab. 78. fig. 1.

— — Ic. Inf. Ratisb. tab. 48. fig. 3.

Frequens ad flavias et ad omnes ubique.



Agrion Virgo var. ♂ Fabr.

Jac. Sturm fec.

AGRION Virgo Varietas β.

Die Flussnymphe. Die Wasserjungfer. Die zweite Abänderung.

Agrion Virgo. Fabric. Linn. I. l. c. c.

Libellula Virgo: corpore sericeo nitido, alis viridi caerulecentibus apice fuscis
marginē immaculatis. *Linn. Faun. Suec. ed. I. n 757. β.*

Habitat cum antecedenti frequens ad fluvies.



Lygaeus equestris Fabr.

J. St. fec.

LYGAEVS equestris.

Die Ritter - Wanze. La Punaise rouge à bandes noires, et taches blanches. Geoffr.

Lygaeus equestris: rubro nigroque maculatus, thorace antice posticeque atro, alis atris albo maculatis. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 43. p. 147. Syst. Ent. n. 104. p. 718. Spec. Inf. T. II. n. 142. p. 362. Mant. Inf. T. II. n. 185. p. 298.

Cimex equestris. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 726. ed. XIII. n. 77. p. 2172. Faun. Suec. n. 946. Mus. Lud. Vlr. 177. It. oel. 155.

Geoffr. Inf. T. I. n. 14. p. 442.

Scop. carn. n. 369. ic. 369.

Schrantz austr. n. 540.

Peda mus. graec. n. 21. p. 59.


Schäffer Elem. ent. tab. 44. fig. 2.

— — Ic. Inf. Ratisb. tab. 48. fig. 8.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1319.

Habitat in montanis editioribus,

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Lygaeus familiaris Fabr.

J. St. fec.

L Y G A E V S f a m i l i a r i s.

Die gesellige Wanze.


Lygaeus familiaris: rubro nigroque variis alis fuscis: puncto baseos albo. *Fabric.*

-*Entom. syst.* T. VI. n. 48. p. 149. *Spec. Inf.* T. II. n. 145. p. 363. *Mant.*
Inf. T. II. n. 190. p. 298.

Rossi *Faun. etrusc.* T. II. n. 1518. p. 238.

Legi saepius in montanis asperis. Alarum limbus quoque albus.

a Magnitudo naturall. b Eadem aucta.



Lygaeus Hyoscyami Fabr.

J. St. fec.

LYGAEVS Hyoscyami.

Die Bilsenkraut-Wanze. La Punaise rouge à croix du Chevalier.
Geoffr.

Lygaeus Hyoscyami: rubro nigroque varius alis fuscis immaculatis. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 47. p. 149. Syst. Entom. n. 105. p. 718. Spec. Inf. T. II. n. 144. p. 362. Mant. Inf. T. II, n. 189. p. 298.

Cimex Hyoscyami. Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 726, ed. XIII. n. 76. p. 2169. Fn. Suec. n. 945. It. oel. 155.

Geoffr. Inf. T. I. n. 12. p. 441.

Degeer Inf. T. III. n. 18. p. 274. tab. 14. fig. 14. 15.

Schrantz. austr. n. 539.


Sulzer Kennz. der Inf. tab. XI. fig. 75.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1321. p. 240.

Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 13. fig. 2.

Habitat frequens in *Hyoscyamo nigra* L. et *Nicotiana Tabacum* L.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Lygaeus saxatilis Fabr.

J. St. fee.

L Y G A E V S *Saxatilis.*

Die Stein-Wanze.

Lygaeus saxatilis: niger thoracis marginē laterali lineaque media rubris, elytris maculis tribus rubris, elytris maculis tribus rubris, alis immaculatis. *Fabric.*
Entom. syst. T. VI. n. 46. p. 148. *Mant. Ins.* T. II. n. 188. p. 298.

Cimex saxatilis. *Linn. Syst. Nat.* n. 81. p. 727. ed. XIII. n. 81. p. 2175.
Scop. carn n. 371. ic. 371. *mala*.

Schrank. austr. n. 538.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1317. p. 238.

Schaeffer Ic. Ins. Ratisb. tab. 13. fig. 11.

Habitat in rupibus saxosis primo vere.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Papilio N. Iris Fabr.

Jac. Sturm sc.

PAPILIO Nymphalis Iris.

Der grosse Changeant oder Schillerfalter. Der Bachweidenfalter.

Le grand Mars changeant.

Papilio Nymphalis Iris: alis dentatis fuscis caeruleo micantibus utrinque fascia albida interrupta ocelloque uno: anticis supra coecis. *Fabric.* Entom. syst. T. IV. n. 339. p. 110. *Syst. Entom.* n. 248. p. 501. *Spec. Ins.* T. II. n. 382. p. 86. *Mant. Ins.* T. II. n. 460. p. 46.

Papilio Nymphalis gemmatus Iris. *Linn. Syst. Nat.* n. 161. p. 775. ed. XIII. n. 161. p. 2307.

Syst. Verz. d. W. Schmett. n. 1. p. 171.

Scopol. carn. n. 403.

Rösel Ins. Bel. III. tab. 42. fig. 2.

Kleemann Beytr. tab. IX. fig. 3. *Chrysal.*

Sulzer Kennz. tab. 14. fig. 86.


Schaeffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 152. fig. 172. OIJIPAP

Esper eur. Schm. T. I. tab. XI. fig. 1. mas. tab. 71. fig. 4. feni.

Borkhausen eur. Schm. I. Th. n. 2. p. 5. et p. 194.

Die Futterpflanze der Raupe dieses Falters, sind fast alle Arten der Weiden, vorzüglich aber liebt sie die wollige Saalweide. Wenn sie sich verwandeln soll, so hängt sie sich nach Art der Dornraupen mit dem Hintertheil ihres Körpers an ein Klümpchen Seide an, und wird zu einer mattgrünen Chrysalide, welche am Kopf zwey und auf der Brust eine scharfe Spitze hat. Nach neun bis vierzehn Tagen entwickelt sich der Falter. Dieser wird in allen warmen Erdstrichen von Europa gefunden. Seine Nahrung sind alle Arten von Feuchtigkeiten. Seine Lieblingsplätze sind Laubwaldungen; besonders gerne hält er sich auf, wo Weiden an sumpfigen Orten stehen, deren ausgeschwitzten Saft er gerne einsaugt. *Borkhausen.*

Den merkwürdigen Farbenwechsel dieses Falters hat *Ledermüller* in seinen mikroskopischen Augenbel. I Th. p. 89. tab. 49. sehr vorzüglich erwiesen.



Papilio N. Ilia Fabr.

Jac. Sturm sc.

PAPILIO Nymphalis Ilia.

Der schwarze Changeant. Le Mars. Geoffr. Le petit Mars changeant.

Papilio Nymphalis Ilia: alis dentatis caeruleo micantibus utrinque fascia alba interrupta: omnibus ocello unico. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 340. p. 110.*
Mant. Ins. T. II. n. 461. p. 46.

Syst. Verz. d. W. Schmett. n. 2. p. 172.

Geoffr. Ins. T. II. n. 29. p. 61.

Espér eur. Schm. 1 Th. tab. 37. fig. 1. müß. tab. 11. fig. 2. fem.

Borkhausen eur. Schm. 1 Th. n. 2 b. p. 8 p. 195.

Flugzeit, Aufenthalt und Lebensart hat dieser Falter mit dem vorhergehenden gemein, doch fliegen beyde Arten nicht miteinander. Es gibt Gegenden, wo die eine Art häufig ist, man aber die andere ganz vermisst. Das Weibchen ist ohne Schiller, übrigens aber vollkommen wie das Männchen gezeichnet,