

Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

17^e Mémoire (1)

HYMÉNOPTÈRES

Planches 3 et 4.

Par ROBERT DU BUYSSON et T. A. MARSHALL.

Séance du 11 mars 1891.

Parmi les nombreux Insectes que M. Eugène Simon a rapportés de son intéressant voyage d'exploration au Venezuela, il se trouve une jolie série d'Hyménoptères en outre des Formicides déjà publiés par M. C. Emery. L'aimable voyageur a eu la générosité de me les abandonner pour les déterminer et en fournir le catalogue devant faire suite aux différents mémoires déjà parus sur d'autres ordres d'Insectes récoltés également par lui dans la même région.

Étant peu versé dans la connaissance des Hyménoptères exotiques, du moins en dehors des *Chrysididae*, qui sont ma spécialité, et n'ayant pas de riche bibliothèque à ma portée, j'ai dû, pour répondre au désir de M. E. Simon, recourir à plusieurs spécialistes, à M. le professeur J. Pérez pour les Apiaires, à M. le général O. Radoszkowsky pour d'autres familles, et, enfin, à M. T. A. Marshall, qui a habité Trinitad, et dont la plume expérimentée complétera avantageusement mon travail.

Il me reste encore quelques individus qu'il m'a été impossible d'identifier. Je n'ai pas voulu les éléver au rang d'espèces nouvelles, craignant qu'ils aient déjà été décrits par des auteurs dont les descriptions, quoique très brèves, me laissent quelques doutes à l'égard de ces vénézuéliens litigieux.

(1) Voir 15^e mémoire (*Coléoptères — Lamellicornes*, par le Dr E. Candèze), Annales 1891, p. 329. On y trouvera la liste des quatorze autres mémoires qui précèdent. — 16^e mémoire (*Arachnides : Chernetes (Pseudoscorpiones)*, par L. Balzan), Annales 1891, p. 497, pl. 9, 10, 11 et 12.

Je tiens à exprimer à M. E. Simon, au nom des entomologistes français, mes plus sincères félicitations sur l'heureux résultat de son exploration dans un pays encore bien neuf pour la science et aussi mes plus vifs remerciements pour le don généreux de ces curieux Hyménoptères.

R. DU BUYSSEN.

—
Fam. APIDÆ.

1. BOMBUS ATERRIMUS Sichel, ♀ ♀. — San-Esteban, Caracas.
2. TRIGONA STIGMA Sm., variété. — San-Esteban, Colonia Tovar.
3. TRIGONA DORSALIS Sm. — San-Esteban.
4. TRIGONA RUFICRUS Latr. — San-Esteban, Corozal.

5. **Trigona apiformis**, n. sp., ♀. — Corps robuste, épais, entièrement noir ; tête et thorax couverts d'épais poils bruns, dressés ; des poils fauves plus longs sur les mésopleures et le métathorax ; clypeus finement ponctué-coriacé, les intervalles des points très finement chagrinés. Abdomen avec de gros poils courts, raides, noirs, assez épais, les segments 2-5 bordés d'une frange fauve, de poils fins ; ventre avec des poils fauves. Dessous des tarses couvert de poils roux ; écailles roussâtres, scarieuses ; ailes légèrement enfumées à nervures roussâtres. — Long. 10 mill. — Colonia Tovar.

6. **Trigona ochrotrichus**, n. sp., ♀. — Corps petit, grêle, noir. Vertex et dorsulum avec quelques poils noirs, assez gros ; tout l'épistome et le scape des antennes jaunâtre scarieux à ponctuation effacée, peu apparente ; mandibules roussâtres ; thorax couvert de points serrés, coriacés, ruguleux, médiocres ; écailles marron ; ailes assez enfumées, à nervures peu épaisses, brun clair. Dessous du corps couvert de poils jaunâtres. Abdomen recouvert d'une épaisse couche de poils plumeux entremêlés de poils simples, d'un beau jaune. Tarses roussâtres. — Long. 6 mill. — Colonia Tovar.

7. EULÆMA SURINAMENSIS Sm., variété. — San-Esteban.

8. **Tetralomia pygialis**, n. sp., ♂. — Entièrement noir : tête et thorax à poils cendrés, assez longs, épais ; clypeus noir, légèrement caréné longitudinalement dans son milieu, très finement chagriné avec quelques points plus forts disséminés ça et là ; labre blanc d'ivoire, ruguleux avec quelques points épars, bord apical garni de longs cils

blancs. Antennes aussi longues que le corps. Abdomen avec le 1^{er} segment garni antérieurement de longs poils cendrés et sur le reste, ainsi que sur les segments 2 et 3, de fins poils noirs, couchés, très peu épais ; 3^e segment avec son bord apical garni de poils fins couchés, peu épais, d'un beau jaune vif, les autres segments couverts de semblables poils couchés, peu épais, jaune vif ; segments du ventre frangés de poils fauves. — Long. 12 mill. — San-Esteban.

9. *AGAPOSTERNON NASUTUS* Sm. — Caracas.

10. *ANGOCHLORA VESTA* Sm. — Caracas.

11. *HALICTUS CLAVATUS* Pérez, *in litt.*, ♂. — Corps étroit, allongé, entièrement d'un beau vert avec des taches bronzées sur le front, le mésonotum et la moitié apicale de chaque segment abdominal et parfois sur les pattes. Antennes marron, rousses en dessous, 1^{er} article vert. Écailles subscarieuses, roussâtres ; ailes hyalines avec l'extrémité noirâtre. Tarses testacés, couverts de poils blanchâtres. Thorax couvert de petits points, profonds, assez serrés. Abdomen en forme de massue, à ponctuation presque nulle, avec quelque petits poils peu abondants blanchâtres ; ventre noirâtre. — Long. 7 mill. — Colonia Tovar.

12. *Exomalopsis neglectus*, n. sp., ♂. — Corps petit, trapu, noir couvert de poils blancs, peu épais. Antennes marron, rousses en dessous ; thorax lisse, brillant, à points médiocres épars ; écailles scarieuses, testacées, grandes ; ailes hyalines à nervures rousses ; pattes marron roussâtre avec d'épais et longs poils blancs. Abdomen court, à points médiocres, profonds, peu serrés, couvert de poils blancs, courts, fins et couchés, les segments 1 et 2 avec une bande de poils bruns sur le milieu du bord apical. — Long. 6 1/2 mill. — Caracas.

13. *CHRYSANTHEDA SMARAGDINA* Sm., ♀. — Caracas.

14. *ANTHIDIUM BUYSSONI* Pérez, *in litt.*, ♂. — Corps de petite taille : tête jaune avec le front noir, couvert de gros points subréticulés ; antennes jaunes, brunies dans le fouet. Thorax plan en dessus, couvert de points gros, serrés, réticulés. Angles postérieurs du pronotum jaunes ; mésopleures tachées de jaune ; bords latéraux du mésonotum, les parapsides et le bord postérieur de l'écusson jaunes. Écailles jaune roux ; ailes enfumées, avec toute la bordure antérieure noire. Pattes jaunes, les cuisses et les articulations jaune roux. Abdomen avec la base de chaque segment noirâtre et la moitié apicale marron : 1^{er} seg-

ment avec deux grandes taches jaunes se rejoignant presque en dessus, transversales et situées entre le noir et le marron ; 2^e segment avec une tache jaune de chaque côté ; segments 3, 4 et 5 avec une bande jaune transversale située également entre le noir et le marron ; 6^e segment tout noir avec une tache discoïdale et une autre de chaque côté beaucoup plus petite jaunes ; 7^e segment noir, largement bordé par une marge scarieuse, translucide, testacé très clair, arrondie subtransversale, avec une forte dépression au milieu près du bord antérieur ; ponctuation grosse, espacée. Ventre noirâtre. Quelquefois, la couleur marron de l'abdomen s'obscurcit et devient noire, le 6^e segment peut également porter une bande jaune élargie au milieu. — Long. 7 mill. — Caracas.

15. *CERATINA MACULIFRONS* Sm. — San-Esteban.

16. *CERATINA VIRIDULA* Sm. — Valencia.

17. *XYLOCOPA ÆNEIPENNIS* Degeer. — San-Esteban.

Fam. **SPHEGIDÆ.**

18. *TRIPOXYLON FUGAX* F. — Caracas.

Fam. **POMPILIDÆ.**

19. *PEPSIS CINCTIPENNIS*. — Colonia Tovar.

Fam. **SCOLIIDÆ.**

20. *DIELIS VARIEGATA* F. — Caracas.

Fam. **MUTILLIDÆ.**

21. *SPHOEROPHTALMA ARMATA* Kl., ♀. — San-Esteban.

22. **Sphœrophtalma Simoni**, n. sp., ♀. — Taille médiocre, noir foncé avec les côtés du métathorax, le bord apical du 1^{er} segment abdominal, une petite tache au milieu du bord antérieur et deux grandes transversales vers le milieu sur le 2^e segment abdominal, et le bord apical de tous les autres segments abdominaux garnis de poils blancs soyeux. Pattes et antennes roussâtres, ces dernières brunies à l'extrémité ; thorax avec les angles antérieurs saillants et cornés, les côtés du thorax garnis de longues dents parfois un peu hyalines ; le 2^e segment abdominal avec une légère gibbosité de chaque côté antérieurement,

ces gibbosités couvertes d'appendices subunciformes dirigés en arrière ; les deux grandes taches du 2^e segment abdominal décolorées blanc jaunâtre. Ponctuation générale grosse, profonde, réticulée. — Long. 7 mill. — Corozal.

Var. **nigripes**, v. n., ♀. — Diffère par les pattes noir brun, les antennes sombres, simplement tachées de roussâtre en dessous ; le milieu du métathorax couvert de fins poils blancs, les côtés dépourvus de poils blancs. — San-Esteban.

23. **Sphœrophtalma uncifera**, n. sp., ♀. — Corps de taille presque grande, allongée, un peu grêle, noir foncé avec le vertex, une tache réniforme transversale sur le thorax, le bord postérieur des segments abdominaux 1, 3, 4, 5 garni de poils blancs soyeux. Antennes et pattes presque noires. Thorax avec quelques aspérités obtuses sur les côtés ; 2^e segment abdominal avec deux taches jaunes cireuses sur le disque, ce même segment couvert d'aspérités unciformes, couchées et dirigées en arrière, situées sur la moitié antérieure y compris les taches jaunes. Ponctuation générale grosse, profonde, réticulée. — Long. 13 mill. — Colonia Tovar.

24. **Sphœrophtalma fraterna**, n. sp., ♀. — Très voisine de *S. diadema* Bl., dont elle diffère par les mandibules courtes, simples et obtuses, le vertex avec le diadème interrompu au milieu ; par le thorax beaucoup plus court et plus convexe, avec les lignes blanches latérales plus larges et se continuant jusque près des angles antérieurs ; par le 2^e segment abdominal sans tache cireuse au bord antérieur, les deux grandes placées obliquement, ovales et plus petites, le milieu du bord postérieur de ce même segment sans point blanc ; les autres segments abdominaux simplement avec une petite tache au bord postérieur de chaque côté et figurant, ainsi réunies, deux lignes blanches se réunissant à l'extrémité de l'abdomen ; le ventre porte seulement quelques longs poils blancs subdressés et très peu abondants. — Long. 14 mill. — San-Esteban.

25. **Sphœrophtalma crocata**, n. sp., ♀. — Corps de taille médiocre, entièrement jaune avec le bord antérieur du thorax, un point suivi d'une ligne de chaque côté également du thorax, deux taches sur le disque et tout le bord apical du 2^e segment abdominal noir vif. Antennes avec le fouet un peu bruni ; les angles antérieurs du thorax aigus, subspiniformes. Ventre avec le bord apical des segments 2 et 3 noirci. Ponctuation médiocre. — Long. 7 mill. — San-Esteban.

26. *MUTILLA CRUCIATA* Bl., ♀. — San-Esteban.

27. *MUTILLA LINEOLA* F., ♀. — San-Esteban.

Var. *punctata*, var. nov., ♀. — Diffère du type par le thorax taché en son milieu de deux points noirs et d'un autre sur le milieu du métathorax. — San-Esteban.

28. ***Mutilla Stephana***, n. sp., ♀. — Corps de petite taille, robuste. Tête noire avec un cercle de poils blancs sur le vertex, la ponctuation petite, serrée, profonde, subcoriacée. Thorax roux garni d'aspérités sur les côtés, la ponctuation médiocre, réticulée, devenant de plus en plus grosse sur la tranche métathoracique qui est assez abrupte. Abdomen noir vif : 2^e segment avec deux taches juxtaposées, transversales sur le disque ; le bord apical des derniers segments avec des poils blancs argentés. Pattes brun noirâtre. — Long. 6 mill. — San-Esteban.

29. *MUTILLA SCRUEA* Say, ♂. — Caracas.

30. ***Mutilla cincta***, n. sp., ♀. — Corps de petite taille. Tête jaune, l'épistome roux brun ; thorax noirâtre avec les côtés roussâtres, formant deux taches de même couleur vers le milieu, les côtés garnis de fortes épines. Pattes rousses. Abdomen jaune : 1^{er} segment avec une troncature dans la partie antérieure roussâtre, sans poils et renflée en un léger bracelet d'aspérités obtuses ; 2^e segment avec deux larges taches noirâtres occupant chacune presque un quart de la partie antérieure. Ventre noir brun. Ponctuation assez grosse et profonde. — Long. 6 mill. — San-Esteban.

31. ***Mutilla signata***, n. sp., ♀. — Corps de très petite taille, entièrement roux ; le 2^e segment abdominal noir avec une grande croix rousse, la couleur noire occupant seulement les quatre coins du disque. Thorax avec les côtés garnis de longues épines testacé clair ; la partie lisse des métapleures imponctuée, glabre et brun roussâtre. — Long. 4 mill. — San-Esteban.

32. ***Mutilla lamellifera***, n. sp., ♀. — Corps de taille médiocre, allongé, brun avec le dessus de la tête, le bord apical des segments abdominaux 2-6 et deux taches parallèles sur le disque du 2^e segment garnis de poils couchés, fauve doré, soyeux. Antennes et pattes rousses. Thorax étroit, roux au milieu dans une grande partie de sa longueur ; le haut du métathorax portant une lamelle droite, transversale ; 1^{er} segment abdominal petit, subrectangulaire, à côtés parallèles, noirâtre en

avant, couvert sur le reste de fins poils blanchâtres soyeux. Ponctuation générale médiocre, profonde, serrée. — Long. 6 mill. — San-Esteban.

Fam. **VESPIDÆ.**

33. POLYSTES VERSICOLOR F. — Colonia Tovar.
34. POLYSTES RUFIDENS Sauss. — Colonia Tovar.
35. POLYSTES CINERASCENS Sauss. — Colonia Tovar.
36. POLYSTES ANNULARIS L. — Caracas.
37. POLYBIA ANGULICOLLIS Spin. — Caracas, Colonia Tovar.
38. POLYBIA OCCIDENTALIS Oliv. — Caracas.
39. MISCHOCYTTARUS LABIATUS. — Caracas.

Fam. **EUMENIDÆ.**

40. ZETHUS HILARIANUS Sauss. — Caracas.

Fam. **TRIGONALIDÆ.**

41. **Trigonalis Simoni**, n. sp., ♂. — Corps de taille moyenne. Tête noire, brillante, lisse, imponctuée, couverte de poils très fins, noirâtres, dressés ; face convexe ; antennes fusiformes, les premiers et les derniers articles marron roussâtre. Pronotum, mésonotum, mésopleures, écurosson, paropsides et postécusson noirâtres à ponctuation petite, irrégulière, subcoriacée ruguleuse. Métathorax marron roussâtre, finement ponctué-coriacé. Écailles roussâtres, scacieuses. Ailes hyalines avec toute la partie antérieure très fortement enfumée. Pattes marron roussâtre. Abdomen noir brun, couvert d'une fine pubescence blanchâtre qui donne un aspect pruineux ; ponctuation fine, coriacée. — Long. 9 1/2 mill. — Caracas.

Fam. **TENTHREDIDÆ.**


42. **Synairema Simoni**, n. sp., ♀. — Taille moyenne, entièrement fauve jaunâtre, excepté la tête, le dessous des mésopleures et les quatre derniers segments abdominaux qui sont noirs. Tête entièrement noir brillant ; labre noir ; palpes fauve jaunâtre ; antennes noires. Ailes jaunâtres avec l'extrémité enfumée noirâtre ; stigma et nervure costale jaunes. Troisième et quatrième articles des tarses noircis. — Long. 9 mill. — Colonia Tovar.

Fam. FORMICIDÆ.

43. PSEUDOMYRMA GRACILIS Fabr., ♀. — Colonia Tovar.

44. GLYPTOMYRMEA DILACERATUM Forel, ♂. — Caracas.

Je dois la détermination de ces deux Fourmis à M. Ernest André.



Enumérations de Quelques Hyménoptères du Venezuela

ET

DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES

—

Le Venezuela possède, en raison de sa position géographique, une faune qui se lie et se fond d'un côté avec celle de l'Amérique centrale, et, de l'autre, avec celle du Brésil ; elle a été jusqu'ici peu exploitée par les naturalistes, et les nouveautés qu'elle nous promet en fait d'entomologie sont bien propres à exciter la curiosité. C'est pourquoi j'aurais désiré que la série des Hyménoptères de cette région que j'ai sous les yeux fût plus nombreuse ; car les descriptions isolées, faites souvent d'après un seul exemplaire, quel que soit le soin mis à leur rédaction, amènent des erreurs inévitables. Engagé à ne point reculer devant ces obstacles, j'ai pris le seul parti qui me fût possible, en apportant un soin scrupuleux dans l'examen des documents déjà publiés, et des espèces qui sont à déterminer, et j'ose espérer qu'aucun des noms spécifiques donnés comme nouveaux ne sera convaincu plus tard d'être un double emploi. Les Hyménoptères qui m'ont été confiés pour leur détermination sont au nombre de 27, savoir : 1 Evaniide, 14 Ichneumonides, 2 Bracónides, 7 Chalcidides, 2 Proctotrypides et 1 Pompilide.

T. A. MARSHALL.

—

Fam. EVANIIDÆ.

45. EVANIA NITIDA Cameron, ♀. — Pl. 4, fig. 1; 1a (aile); 1b (thorax vu de côté). — Cameron, Biol. Centr. Amer., Pt. LX, p. 431, pl. xviii, fig. 1, ♂. — Schletterer (Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden), Annalen des K. K. naturh. Hofmuseums ; Bd IV, Wien, 1889, p. 326, ♂.

Les auteurs cités connaissaient seulement le mâle de cette espèce ; l'exemplaire pris par M. Simon est une femelle, qui ne diffère de l'autre sexe que par ses antennes claviformes, et la présence d'une tarière à peine exserte. — Venezuela : San-Esteban.

Fam. ICHNEUMONIDÆ.

46. ICHNEUMON NIGROCÆRULEUS Cresson, ♀. — Pl. 1, fig. 2. — Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. of Philadelphia, 1873, p. 104, ♀.

Appartient à la section *Patroclus*, qui comprend un petit nombre d'espèces ayant les crochets des tarses pectinés. L'Insecte actuel est d'un beau bleu noirâtre avec les ailes d'un brun foncé et les antennes ornées d'un anneau jaunâtre. — Étiqueté de Corozal ; trouvé originairement près d'Orizaba, au Mexique, par le professeur Sumichrast.

47. MESOSTENUS SARTOR Fab., ♀. — Pl. 1, fig. 3. — *Cryptus sartor* Fab., Piez., 80, 39 (non de Spinola, Ann. Soc. Ent., IX, 158), ♀. — *Mesostenus sartor* Brullé, Lepell. Hym., IV, 217, ♀.

Cet exemplaire correspond sous tous les rapports à la description de Brullé, excepté la couleur du pétiole, qui est noir en dessus, au lieu d'être brun ou ferrugineux. — Caracas ; on l'a rapporté aussi de Cayenne.

48. MESOSTENUS FERRUM-EQUINUM Brullé, ♀. — Brullé, Lepel., Hym., IV, 219, ♀.

Caracas ; trouvé aussi à Rio-Janeiro.

49. MESOSTENUS MACER Cresson, ♀. — Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. of Philadelphia, 1873, p. 144, ♂ ♀.

Appartient à la section *Polycyrtus* Spin., comprenant certaines espèces qui ont les trois lobes du mésonotum convexes, et une épine conique au-dessus des antennes ; leur forme est aussi plus svelte que chez la plupart des *Mesostenus*. — San-Esteban ; le professeur Sumichrast l'a pris aussi à Cordova, en Mexique.

50. **Mesostenus Simonis**, n. sp. — Pl. 1, fig. 4. — *Rufus abdome pedibusque nigris, antennarum semiannulo lato segmentisque abdominis posterioribus albis, alis fusco bifasciatis, metathorace fortiter bispinoso. Terebræ longitudo corporis quadranti æqualis. — Mas latet.* — Long. 12 mill.; alar. exp. 20 mill.

De forme robuste pour le genre ; tout le corps alutacé, mat. Point de

corne frontale entre les antennes ; celles-ci filiformes, de 32 articles, presque aussi longues que le corps, noires, avec les articles 6-11 blancs en dessus. Mandibules d'un jaune sale, brunâtres à l'extrémité. Épistome non discret, faiblement pointillé sur le bord antérieur ; deux lignes faiblement enfoncées, partant des angles supérieurs de l'épistome, se dirigent vers la base des antennes. Vertex et occiput un peu noirâtres. Palpes bruns. Thorax entièrement rouge, excepté les épines thoraciques, qui sont blanches. Les trois lobes du mésonotum peu ou point élevés, à sillons distincts mais peu profonds. Métathorax de même largeur que le mésothorax, sans aréoles, traversé seulement par une carène qui limite la région basale et descend le long du côté intérieur des aréoles pleurales ; armé postérieurement de deux fortes épines un peu courbées ; presque tronqué en arrière. Ailes légèrement enfumées, avec une bande brun foncé avant le milieu, et une autre plus large dessous le stigma, qui est très étroit ; 2^e cellule cubitale petite, pentagonale, en partie hyaline, sa nervure extérieure décolore ; l'extrémité de l'aile a une légère teinte brunâtre. Abdomen aussi long que la tête et le thorax pris ensemble, sa partie postérieure assez épaisse, pyriforme ; 1^{er} segment rougeâtre, faisant à peu près le tiers de la longueur totale de l'abdomen ; pétiole presque de même largeur depuis la base jusqu'aux tubercules, qui sont peu saillants ; côtés du condyle parallèles ; segments 2-4 noirs ; 5^e segment blanc avec la base noire ; les segments suivants blancs. La longueur de la tarière, mesurée de sa base, 5 mill. ; la partie exserte est de 3 mill. — Mâle inconnu. — Le seul exemplaire est de Colonia Tovar.

Les genres des Cryptides, tant exotiques qu'européens, sont purement artificiels, et si vaguement limités, que l'emplacement de telle ou telle espèce de transition ne peut être que provisoire. L'espèce actuelle ne diffère pas essentiellement des *Cryptus* ; mais en l'attribuant au genre *Mesostenus*, je crois avoir suivi les vues des entomologistes américains, puisque son aréole est excessivement petite, et les antennes sont nullement épaissies vers l'extrémité.

51. **Phygadeuon caracacensis**, n. sp., ♀. — *Caput et thorax nigra ; abdomen et pedes omnino rufa. Antennæ validæ, prælongæ, filiformes, albo-cinctæ. Metathorax nitidus, superne lævis, apicem versus rugoso-punctatus, areolis completis. Pedes validi, femoribus tibiisque extus subtiliter setulosis. Abdomen lævissimum, terebra segmenti primi longitudinem paulo superante. — Mas incognitus. — ♀. Long. 6 mill. ; alar. exp. 14 mill.*

Forme des espèces européennes *P. profligator* et *vagabundus*. Tête et thorax noirs ; abdomen et pattes rouges en entier. Tête petite, moins large que le thorax ; épistome discret ; mandibules roussâtres à l'extrémité ; palpes d'un testacé obscur. Antennes épaisses, filiformes, un peu plus longues que la tête et le thorax pris ensemble, recoquillées après la mort, presque tricolores ; articles 1-7 noirs ; le 1^{er} rouge en dessous ; articles 8-13 d'un blanc jaunâtre avec la base de l'article 8^e et le sommet du 13^e bruns. Métathorax luisant, presque lisse sur le dos, rugueux et fortement ponctué en bas vers le sommet ; ses aréoles bien déterminées ; aréole supéro-médiane allongée, à côtés parallèles, les angles postérieurs émoussés ; stigmates en ovale allongé ; partie déclive légèrement concave, lisse dans le milieu, avec quatre carènes longitudinales, et les vestiges de deux épines. Ailes hyalines ; nervures et stigma bruns ; aréole pentagonale, complète. Pattes très fortes, hérissées, entièrement rouges, y compris les hanches. Abdomen lisse et luisant ; pétiole du 1^{er} segment linéaire, rebordé, brusquement élargi avant les tubercules, qui sont peu saillants ; extrémité du condyle deux fois plus large que le pétiole, impressionné d'un court sillon longitudinal. Tarière un peu plus longue que le 1^{er} segment. — Mâle inconnu. — ♀. Caracas.

52. Hemiteles erasmius, n. sp., ♀. — *Nigro, rufo, albo varius, antennis et abdomine albo-cinctis. Alæ hyatinæ, fusco bifasciatæ. Metathorax haud areolatus, bituberculatus, tuberculis albis. Terebra abdominalis trienti æqualis. — Mas ignotus.* — ♀. Long. 5 mill.; alar. exp. 9 mill.

Corps alutacé, mat. Tête noire, avec les orbites faciales et verticales, l'épistome, la base des mandibules, l'extrémité des joues et les palpes, blancs, ces derniers noirs au sommet ; vertex transversal, plus large que le thorax ; yeux très gros. Antennes de 25 articles, grêles, filiformes, aussi longues que le corps, noires ; scape rouge en dessous, ainsi que la base du funicule ; articles 6-10, et base de l'article suivant, blancs en dessus. Prothorax blanc ; une tache noire sur le prosternum. Mésothorax sans sillons, pointillé, noir, excepté la partie postérieure du mésosternum, qui est rouge ; mésopleures finement striolées ; une petite tache blanche dessous l'origine des ailes. Scutellum blanc. Métathorax rouge, ponctué-rugueux, plus grossièrement sur le disque ; sans aréoles ; muni de deux forts tubercules blancs, coniques. Ailes hyalines avec l'extrémité enfumée, et une bande de même teinte au milieu ; nervures et stigma bruns, celui-ci avec un point jaune à la base ; radicule blanche. Pattes rousses avec les quatre hanches antérieures jaunâtres ; hanches de derrière rousses avec une tache noire au sommet en

dessus ; trochanters de devant jaunâtres, les quatre postérieurs noirâtres ; quatre cuisses antérieures rayées de noir sur leur tranche supérieure ; cuisses de derrière noires à l'extrémité ; quatre tibias antérieurs d'un testacé obscur, ceux du milieu blanchâtres à l'extrême base ; tibias de derrière rouge avec la base blanche ; tous les tarses noirâtres. 1^{er} segment de l'abdomen luisant, sans sculpture ; tubercules peu remarquables ; pétiole brun, condyle blanc rougeâtre ; le reste de l'abdomen est mat par suite d'une ponctuation excessivement fine ; 2^e segment noir avec le tiers apical blanc ; 3^e blanc, un peu roussâtre à la base, avec une large bande médiane noire ; 4^e roux avec une tache noire à l'extrémité ; 5^e noir ; les suivants blancs en entier ; tous les segments sont un peu roussâtres sur les côtés, et le ventre est entièrement roux. Tarière très forte, subulée ; la partie exserte aussi longue que le tiers de l'abdomen.

— Mâle inconnu. — San-Esteban.

Il existe une foule d'espèces qui présentent presque les mêmes caractéristiques et la même répartition des couleurs que celle-ci ; on les a distribuées dans les genres *Mesostenus* et *Hemiteles*.

53. **Hemiteles pothinus**, n. sp., ♀. — *Niger abdomine toto ferrugineo, antennis medio et infra rufescens. Pedes ferruginei. Alæ subangustæ, hyalinæ; anteriores late nigro bifasciatæ, posteriores fascia unica. Metathorax areolatus, rugosus, tuberculis lateralibus nullis. Terebra abdominis bessi fere longitudine æqualis.* — *Mas latet.* — ♀. Long. 5 mill.; alar. exp. 8 mill.

Corps assez luisant. Tête noire, parsemée de poils courts blanchâtres et assez serrés. Antennes filiformes, grêles, plus courtes que le corps, de 26 articles, dont les 6 premiers noirâtres, les 7-9 d'un rougeâtre pâle, les suivants brunâtres en dessus, rougeâtres en dessous. Thorax hérissé en dessous de poils blanchâtres ; mésonotum un peu ponctué en avant le long des deux sillons ; ceux-ci crénelés, et bordés intérieurement de points et de courtes stries transversales, lesquelles sont assez profondes et, à partir du milieu du disque, se dirigent en arrière, s'allongeant jusqu'à la base du scutellum. Ce dernier est étroit, triangulaire, fortement rebordé, convexe et lisse sur le dos. Métathorax grossièrement rugueux ou irrégulièrement réticulé, partagé en aréoles bien distinctes, dont la supéro-médiane en hexagone allongé ; point de tubercules latéraux ; vers le bas et sur les côtés, le métathorax est hérissé de longs poils blanchâtres. Ailes hyalines, les antennes ornées de deux bandes noirâtres, dont la basilaire la plus petite, en ovale un peu obliquement placé ; la seconde bande, de couleur plus foncée, est beaucoup

plus large et presque en carreau, laissant l'extrémité de l'aile hyaline ; les ailes inférieures n'ont qu'une seule bande sombre, mal déterminée, et située près de l'extrémité, qui est un peu brunâtre. Pattes entièrement ferrugineuses ; les tibias de derrière un peu amincis et sinués à la base, où leur teinte est plus pâle ; on y distingue aussi la trace d'un anneau sombre ; les cuisses de la même paire ont leur extrémité étroitement noirâtre. Abdomen de la même couleur que les pattes, entièrement lisse et luisant, garni de quelques poils blanchâtres ; 1^{er} segment très poli, s'élargissant insensiblement jusqu'à l'extrémité, qui est quatre fois aussi large que la base. Tarière aussi longue que les deux tiers de l'abdomen. — Mâle inconnu. — La Guayra.

D'après l'analogie d'une espèce voisine, *Thyridopterygis* Riley, dont je possède les deux sexes, il doit différer tout à fait de la femelle. Du reste, cette espèce reproduit d'une manière frappante les proportions et les couleurs des *H. pulchellus*, *areator* et *bicolorinus* de l'Europe.

54. PANISCUS RUFUS Brullé, ♀. — Brullé, Lepel., Hym., IV, 455, ♂ ♀.

Espèce sujette à de légères variations, mais, à ce qu'il paraît, non susceptible de division. Elle est assez répandue dans l'Amérique tropicale ; les localités signalées par Brullé sont : le Mexique, la Guyane, le Brésil, le Chili et l'île de Cuba. — Colonia Tovar.

55. XIPHOSOMA AZTECA Cresson, ♀. — Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. of Philadelphia, 1873, p. 381, ♀.

On lit dans l'ouvrage cité *Eiphosoma*, erreur manifeste pour *Xiphosoma*, laquelle est due apparemment à la ressemblance de la lettre Ξ des Grecs à l'E des langues modernes. Quoique ce nom exprime bien l'apparence de l'abdomen, en forme de cimenterre, on ne pourra pas l'adopter définitivement, à cause de sa préoccupation en Ichthyologie. Les espèces de *Xiphosoma* ont presque la même physionomie que les *Anomalon* de l'Europe, et sont fort difficiles à séparer. — San-Esteban ; j'ai trouvé la même espèce près de San-Fernando, à la Trinidad.

56. EPIMECIS BICOLOR Brullé, ♀. — Pl. 3, fig. 6. — Brullé, Lepel., Hym., IV, 443, ♀.

Cet Insecte magnifique est propre aux parties les plus chaudes de l'Amérique, depuis le Mexique jusqu'au Brésil. — San-Esteban.

57. Pimpla argiopes, n. sp. — *Nigra*, *nitida*; *facies alba*, *macula media nigra*; *orbitæ albæ*; *prothorax albus*, *disco nigro*; *mesothorax*

Ann. Soc. ent. Fr., 1892. — Juillet 1892.

undique rufus, lineis duabus humeralibus, scutelli apice cum postscutello, flavidis; metathorax niger, maculis duabus ad latera magnis oblongis, totidemque minoribus apud angulos posticos, flavidis. Pedes albidi, nigro varii. Metathoracis spiracula circularia, minuta; areolæ obsoletæ, superomedia carinulis duabus lateralibus imperfectis vix indicata. Tarsorum posticorum articulus ultimus triplo longior quam penultimus; unguiculæ lobulis perparvis utrinque auctæ. Abdominis segmenta subquadrata; segmentum secundum longius quam latius. Terebra segmentorum trium ultimorum longitudine. — Mas latet. — Long. 9 mill.; alar. exp. 12,5 mill.

Noire, assez luisante. Face blanche, portant dans le milieu une tache noire ; orbites verticales et internes blanches, ainsi que les palpes. Antennes moins longues que le corps, filiformes, noirâtres, de 30 articles. Prothorax blanc, noir en dessus ; mésothorax rouge, tant en dessous qu'en dessus ; deux lignes humérales, le sommet du scutellum et le postscutellum, d'un blanc jaunâtre ; métathorax noir, ayant de chaque côté une grande tache oblongue blanc jaunâtre, et deux autres taches plus petites, de la même couleur, sur les angles postérieurs, qui sont proéminents et émoussés ; le métathorax est sans aréoles, l'aréole supéro-médiane seule étant faiblement indiquée par deux carènes parallèles ; les ouvertures stigmatisques sont petites et circulaires. Ailes hyalines ; nervures et stigma bruns ; aréole assez grande, irrégulière, quadrangulaire. Pattes d'un blanc jaunâtre, y compris les hanches ; un point noir sur le côté interne des trochanters, près de la base ; la tranche supérieure de toutes les cuisses est occupée par une tache noire allongée, qui n'atteint pas l'extrémité ; les quatre pattes postérieures ont leurs tibias blancs au milieu, noirs aux deux bouts, et les articles de leurs tarses noirs à leur extrémité ; le dernier article des tarses de derrière est trois fois aussi long que le précédent ; les ongles sont à peine appendiculés. Abdomen trois fois aussi long que la tête et le thorax réunis, noir, luisant, ayant la sculpture ordinaire du genre ; les segments sont à peu près carrés, le 2^e seul est un peu plus long que large. Tarière de la longueur des trois derniers segments. — Mâle inconnu. — Indiqué de Caracas.

Élevé du cocon de l'Arachnide *Argiope argentata* Fab., qui se trouve en plusieurs pays du Nouveau Monde, depuis la Pensylvanie jusqu'au Brésil ; c'est une Araignée très commune à la Martinique. D'après les caractères que je viens de signaler, non moins que par sa manière de vivre, on verra que ce parasite nouveau a beaucoup d'analogie avec *P. oculatoria* Fab.

58. **Pimpla Simonis**, n. sp. — *Nigra nitida thorace rufo, prothorace supra albo, infra nigro; metathorace obtuse bispinoso, lateribus albis, dorso partim fusco; abdominis incisuris, maculisque segmentorum singulorum lateralibus, albis; pedibus anticis testaceis, posterioribus sordide flavo-albidis, nigro variis. Metathoracis areolæ omnino nullæ, spiracula circularia. Tarsorum posticorum articulus ultimus quadruplo longior quam penultimus. Unguiculæ lobatæ. Abdominis segmenta, primo excepto, transversa; segmentum secundum latius quam longius. Terebra abdominis triente paulo longior.* — *Mas latet. — ♀. Long. 7 mill.; alar. exp. 10 mill.*

Noire, assez luisante. Tête parsemée d'une ponctuation éparsé et irrégulière ; occiput lisse. Palpes blanchâtres. Antennes grêles, filiformes, un peu plus courtes que le corps, de 27 articles ; radicule blanche ; funicule d'un rouge obscur, noirâtre dans le milieu. Thorax rouge ; prothorax blanc sur le dos et les côtés, noir en dessous ; mésonotum éparsément pointillé, rouge, ainsi que le scutellum et le postscutellum ; métathorax lisse, sans aréoles, ses angles postérieurs assez saillants en forme de deux tubérosités ou d'épines émuossées ; il est rouge, noirâtre dans le milieu du dos, blanc sur les côtés et les proéminences postérieures. Ailes hyalines ; stigma et nervures noirâtres ; aréole en pentagone irrégulier assez grand, dont la nervure extérieure effacée. Pattes de devant testacées ; quatre cuisses et tibias postérieurs d'un blanc sale un peu jaunâtre ; hanches de derrière blanches avec une tache noire sur le côté externe ; leurs cuisses noires avec un large anneau blanc dans le milieu ; tibias de la même paire blancs avec l'extrémité noire, ainsi qu'un anneau près de la base ; les quatre tarses postérieurs noirâtres avec la base blanche ; dernier article des tarses de derrière quatre fois aussi long que l'avant-dernier ; ongles appendiculés. Abdomen sculpté comme d'ordinaire, noir, luisant, ponctué, à peu près trois fois aussi long que la tête et le thorax réunis ; 1^{er} segment plus long que large, les suivants transversaux ; segments 2-5 étroitement blancs à la base, cette couleur s'élargissant de chaque côté pour former sur les angles de devant une tache blanche assez grande. Ventre blanchâtre. Tarière un peu plus longue que le tiers de l'abdomen. — Mâle inconnu. — Caracas.

59. **Polysphincta dichroa**, n. sp. — *Nigra, mesothorace rufo, vitta lata humerali utrinque albida, metathoracis lateribus rufis. Antennæ (mutilatæ) basi subtus albæ. Alarum cellula radialis triangularis, longius ante apicem alæ clausa; abscissa ejus 1^a quam 3^a duplo brevior, 2^a omnino nulla. Pedes una cum coxis sordide albicantes, subpellucidæ; tibix*

posticæ apice nigræ; tarsi postici nigri, articulo 1° basin versus albido. Terebra abdominis segmento 1° brevior. — Mas ignotus. — ♀. Long. 5 mill.; alar. exp. 8 mill.

Lisse et luisante, ayant les formes et presque les couleurs de *P. percontatoria* Grav., seulement les antennes sont un peu plus longues. Tête noire, y compris les parties orales. Palpes d'un blanc impur. Antennes (mutilées) noirâtres, le dessous du scape et des deux premiers articles du funicule, blanc. Mésothorax rouge, tant en dessous qu'en dessus, le disque limité de chaque côté par une bande humérale blanchâtre ; métathorax sans aréoles, noir en dessus, rouge sur les côtés. Ailes hyalines ; écaille et côte d'un testacé sale ; stigma et nervures bruns ; cellule radiale en triangle aigu, terminée assez loin du bout de l'aile ; 1^{re} abscisse de la nervure radiale de moitié moins longue que la 3^e ; 2^e abscisse nulle ; l'état des ailes postérieures ne permet pas (non plus que dans les deux espèces précédentes) de constater la direction de la nervure discoïdale, caractère de premier ordre chez les Pimplides ; chez *Physphincta percontatoria*, cette nervure est sans flexure ; chez d'autres espèces, elle est brisée et émet de son angle un rameau accessoire. Pattes blanchâtres, presque pellucides, y compris toutes les hanches ; tibias de derrière noirs au sommet ; les tarses de la même paire sont aussi noirs, à l'exception de la base du 1^{er} article, qui est blanchâtre. Abdomen entièrement noir, sculpté comme chez les espèces européennes. Tarière plus courte que le 1^{er} segment de l'abdomen. — Mâle inconnu. — Colonia Tovar.

Fam. BRACONIDÆ.

60. **Bracon hæmobaphes**, n. sp., ♀. — *Saturate sanguineus, lævis, impunctatus, antennis nigris, pedibus ex parte nigricantibus; abdominis incisuris profundioribus, segmenti primi disco elevato. Terebræ pars exserta fere abdominis longitudine. Alæ fuscæ. — Mas ignotus. — ♀. Long. 6 mill.; alar. exp. 12,5 mill.*

D'un rouge vif, tirant un peu sur le jaune vers l'extrémité du métathorax et sur les hanches de derrière. Palpes noirs. Mandibules noirâtres au sommet. Tête rétrécie derrière les yeux ; face d'un roussâtre pâle, finement ridée et mate. Antennes noires (mutilées). Thorax entièrement lisse et luisant ; métathorax, ainsi que l'abdomen, garni sur les côtés de poils blanchâtres. Ailes étroites, allongées, brunes sans tache ; nervures et stigma d'un brun plus foncé, celui-ci un peu roussâtre dans le milieu ; écaille d'un rouge vif ; 2^e cellule cubitale de même lon-

gueur que la 3^e. Les quatre pattes antérieures sont noires, avec les hanches, le 2^e article des trochanters et les tarses rouges, ces derniers noirs au sommet; pattes de derrière rouges, le 1^{er} article de leurs trochanters, la base et l'extrémité des cuisses, le sommet des tibias et les tarses, noirs. Abdomen aussi long que la tête et le thorax réunis, et un peu plus large, à la base du 2^e segment, que le thorax; de là, il se rétrécit insensiblement jusqu'à l'anus; le 1^{er} segment présente une plaque médiane élevée, limitée de chaque côté par un sillon; le 2^e porte, aux angles antérieurs, deux dépressions où sont situés les stigmates; toutes les sutures sont profondément creusées, et non crénelées. Abdomen obliquement tronqué au sommet; la tarière est aussi longue que lui, mais naissant du bas de la troncature, elle ne laisse apercevoir que sa moitié au delà de l'anus. — Mâle inconnu. — Colonia Tovar.

61. Rhogas xanthus, n. sp. — *Testaceus, mellicolor; oculis, stemmatico, tarsorum articulo ultimo, terebræ valvis, nigricantibus. Corpus totum subtilissime granulatum, opacum, abdominis segmentis apicalibus a quarto inde læviusculis. Mesothoracis sulculi distincti; metathorax parum convexus, medio obsolete carinatus. Alæ hyalinæ stigmate nervisque testaceis, cellula cubitali secunda duplo latiore quam longiore, extus parum angustata, quam discoidalis postica non longiore; alarum posticarum nervo radiali extincto. Abdomen capitis thoracisque fere longitudo; segmentum primum apice quam basi duplo latius, in medio obsoletissime carinatum; secundum per paulo latius quam longius, carina longitudinali magis distincta; tertium transversum, haud carinatum, margine postico læviusculo. Terebra subexserta.* — *Mas ignotus.* — ♀. Long. 5 mill.; alar. exp. 11 mill.

Testacé, ou jaune de miel avec les yeux, le stemmaticum, le dernier article des tarses, et le fourreau de la tarière, noirs. Corps mat, très finement granulé, avec l'extrémité du 3^e segment de l'abdomen, et les segments suivants en entier, lisses et un peu luisants. Extrémité des mandibules brune. Yeux légèrement échancrés en dedans. Antennes épaisses, filiformes, noirâtres (mutilées; il en reste cependant 36 articles). Sillons du mésothorax assez distincts; les deux lobes latéraux sont élevés en arrière; le métathorax est peu convexe et porte au milieu le vestige d'une carène longitudinale; il est poileux sur les côtés. Ailes hyalines; stigma et nervures testacés; 2^e cellule cubitale deux fois aussi large que longue, un peu rétrécie extérieurement, pas plus longue que la cellule discoïdale postérieure; nervure radiale des ailes de derrière effacée. Pattes fortes, ayant les cuisses et les tibias de la troisième paire

épaisseur. Abdomen environ de la longueur de la tête et du thorax réunis ; 1^{er} segment deux fois aussi large à l'extrémité qu'à la base, faiblement caréné dans le milieu ; 2^e un peu plus large que long, avec une carène longitudinale plus distincte ; 3^e transversal, sans carène. Tarière visible, à peine exserte ; ses valves noires et épaisses. — Mâle inconnu. — Caracas.

Fam. CHALCIDIDÆ.

62. SMICRA CAPTIVA Smith, ♀. — Pl. 4, fig. 1. — Smith, Tr. Ent. London, 3^e ser., t. I, 1862, p. 49, ♀. — Cresson, Tr. Amer. Ent. Soc. Philadelphia, 1872, p. 58, ♀.

Corozal ; indiqué originairement de Panama.

63. SMICRA PALLENS Cresson, ♀. — Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia, 1870, p. 96, ♀. — Cresson, Tr. Amer. Ent. Soc. Philadelphia, 1872, p. 54, ♀.

C'est par un effet de pur hasard que je suis tombé sur une description applicable à cet Insecte ; du reste, on ne doit pas avoir une confiance entière dans les déterminations des *Chalcidides* faites d'après un seul exemplaire. L'espèce appartient à une section qui présente une rangée de très petites denticules égales tout le long des cuisses de derrière. J'avoue que je rencontre de grandes difficultés dans l'étude des genres *Smicra* et *Chalcis*. Ils sont très nombreux en espèces ; les descriptions éparses échappent aisément aux recherches les plus énergiques, et, quand on les aurait toutes groupées, le manque de coupes convenables et d'homogénéité rend leur interprétation au dernier degré fastidieuse et incertaine. Le mémoire de M. Cresson est pourvu, il est vrai, d'une table dichotomique, mais le nombre des espèces du genre *Smicra* qui y sont classées est fort restreint, car l'auteur ne traite que celles qui ont été trouvées dans le cercle des États-Unis. — Colonia Tovar.

64. CHALCIS OVATA Say, ♀. — *C. ovata* Say, Keating's narrative of an expedition... under the command of major Long, 1823 ; Appendix, t. II, p. 326, Philadelphia, 1824. — *C. annulipes* Walk., Ent Mag., II, p. 29, ♂♀. — *C. incerta* Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia, 1865, p. 101.

Espèce vulgaire et répandue, indiquée comme provenant des Antilles, du Mexique et des États-Unis. Si elle n'est pas identique à *C. mi-*

nuta L., du moins ses rapports avec cette espèce européenne sont très intimes. — Colonia Tovar.

65. SCHIZASPIDIA FURCATA Fab. — *Eucharis furcata* ♀ et *flabellata* ♂ Fab., Piez., 158, 4, 5 (1804). — *Schizaspidia furcata* Westwood, Proc. Zool. Soc. (1835), p. 69, ♀. — *Eucharis furcata* Walker, Mon. Chal., II, p. 65, ♂♀ (1839). — *Chirocerus furcatus* Brullé, Lepel., Hym., IV, pl. xxxviii, fig. 5, 5a, 5b (antenne), ♂ (1846). — *Schizaspidia furcata* Haliday in Walker's « Notes on Chalcidiæ », p. 66, fig. 2, ♀ (1871).

L'Insecte mâle que j'ai sous les yeux ne suffit pas, à lui seul, pour une identification, mais je le regarde comme appartenant très probablement à l'espèce ci-dessus citée. On trouve assez fréquemment les Insectes de ce genre, voisin des *Eucharis*, dans les parties chaudes de l'Amérique. Walker et Westwood ont indiqué jusqu'à seize espèces de *Schizaspidia*, lesquelles ne peuvent pas être bien entendues sans une étude des deux sexes. Les mâles se distinguent par leurs antennes flabellées, et par le pétiole, qui est aussi long que le reste de l'abdomen ; chez les femelles, les antennes sont simples et le pétiole n'a que le tiers de la longueur du reste de l'abdomen. Plusieurs femelles que j'ai trouvées à la Trinidad ne diffèrent du mâle provenant de Venezuela que sous les rapports sexuels, et parce que leurs antennes sont testacées ; elles pourraient bien être *Schizaspidia flavigornis* Walker. — Caracas.

66. *Prionopelma basilica*, n. sp. — Pl. 4, fig. 2. — *Cæruleo-viridis, splendida, hic illic purpureo varia; antennis nigris, radicula mandibulisque rufis; abdominis dimidio basali pedibusque rufis, femoribus anticis cærulantibus, mediis infuscatis, curvatis; tibiis mediis apice cum tarsis suis infuscatis, calcare uno fortiore instructis; tibiis posticis nigris, calcaribus duobus minutis; tarsis posticis infuscatis; terebra quam corpus plus quadruplo longiore. — Mas ignotus. — ♀. Long. 8 mill.; alar. exp. 45 mill.; terebræ longitudo 35 mill.*

Espèce des plus grandes et la plus belle que je connaisse dans le groupe des *Cleonymidæ*. Pubescente, d'un vert bleuâtre brillant, en partie pourpre. Tête d'un vert doré, hérissée de poils gris, plus serrés en avant et en dessous ; vertex et front densément pointillés, paraissant écailleux, moirés de taches bleues, vertes et pourpres ; la fossette frontale derrière les antennes est entièrement empourprée ; yeux rouges ; face et épistome un peu ridés à travers ; mandibules rouges avec deux dents noires dont l'extérieure la plus forte. Les palpes manquent à cet

exemplaire. Antennes aussi longues que la tête et le thorax réunis, noires avec la radicule rouge ; les articles sont en apparence au nombre de onze, mais le dernier, qui a deux fois la longueur du précédent, semble être double, quoique la division soit à peine sensible ; le scape est aussi long que les trois articles suivants ; annelets distincts, petits, cyathiformes ; articles 4-5 de longueur égale ; le 5^e un peu plus épais ; le 6^e moins long que le 5^e ; les suivants filiformes, diminuant progressivement de longueur jusqu'à l'avant-dernier. Thorax oblong, plus long et plus large que l'abdomen, d'un vert bleuâtre métallique, paraissant pourpre dans un certain jour, ponctué ; prothorax court, distinct, fortement échancré en arrière ; sillons mésothoraciques assez profonds ; scutellum ovalaire, ponctué ; parapères pourpres ; métathorax de même couleur, sans ponctuation ni aucune aréole. Ailes relativement étroites, aussi longues que la tête et le thorax, légèrement teintées de brunâtre, avec le bord postérieur marqué d'une nubécule de couleur plus foncée ; écaille rouge ; côté et rameau radial brunâtres, celui-ci renflé à l'extrémité et portant en avant un petit bec d'où part un pli qui, en se dirigeant vers le bout de l'aile, indique obscurément une cellule radiale allongée ; d'autres cellules sont vaguement dessinées par de semblables traînées, le rameau marginal est quatre fois aussi long que le rameau radial. Pattes rouges ; cuisses de devant en grande partie bleuâtres ; celles du milieu minces, arquées, assombries dans le milieu, ainsi que l'extrémité de leurs tibias et leurs tarses ; les tibias de cette paire de pattes n'ont qu'un seul éperon, plus fort que les autres ; tibias de derrière noirs, armés de deux éperons très minimes, leurs tarses noirâtres. Abdomen sessile, plus étroit et moins long que le thorax, comprimé sur les côtés, vu d'en haut cylindrique, en dos d'âne sur la ligne médiane, rétréci subitement en cône à l'extrémité ; les deux premiers segments rouges et fort longs, occupant presque les deux tiers de l'abdomen ; le 1^{er} beaucoup plus long que le 2^e ; celui-ci est coupé obliquement sur les côtés et se prolonge en angle aigu sous le ventre, formant une large ouverture où sont emboîtés les segments suivants ; ces derniers sont d'un vert bleuâtre comme le thorax, et cette couleur se voit à travers la pellicule diaphane du prolongement des deux segments basilaires. Tarière plus de quatre fois aussi longue que le corps.

— Mâle inconnu. — San-Esteban.

Le genre *Prionopelma* fut fondé par le professeur Westwood (Tr. Ent. Soc. Lond., 1836, p. 498) sur une espèce du Brésil, *P. viridis* Westw. depuis cette époque, on en a ajouté quelques autres, propres à la région du fleuve Amazone. Elles sont d'une beauté éclatante, et présentent, au

premier coup d'œil, une analogie trompeuse avec les *Callimome* de la tribu des *Torymidæ*. Walker les a associées provisoirement avec les *Cleonymidæ*, mais leurs caractères demandent, à ce qu'il paraît, l'établissement d'une division à part.

67. **Lælaps Callisto**, n. sp. — Pl. 4, fig. 3. — *Nigra; thorace supra obscure subviridiæneo, punctato-ruguloso, parum nitido; prothoracis lateribus rufis; abdomine polito, nigro, segmentis ultimis terebræque valvis elongatis, testaceis; antennis fusiformibus, subclavatis, corpore paulo brevioribus, nigris, basi testacea, articulis tribus ultimis, cum præcedentis apice, albis; alis leviter infumatis, spatio pone medium subhyalino, fascia maculisque quatuor nebulosis fuscescentibus; pedibus pallide ochraceis.* — *Mas ignotus.* — ♀. Long. 5,5 mill.; alar. exp. 11 mill.

Noire; thorax d'un verdâtre très sombre en dessus, ponctué-rugueux, peu luisant; abdomen noir, poli, en partie rougeâtre sur les côtés et en dessous vers l'extrémité. Tête noire, transversale, peu épaisse relativement à sa hauteur, un peu plus large que le thorax; front brusquement déclive; face finement ridée à travers, avec un espace lisse et élevé dans le milieu; parties orales d'un roux foncé; vertex excavé, striolé à travers. Antennes insérées dans le milieu de la face, grèles, presque aussi longues que le corps, subclaviformes, finement hérissées, de 12 articles, noires avec les deux premiers article testacés, les trois derniers et la plus grande partie du 9^e, blancs; scape grêle, linéaire, de même longueur que le 3^e article; 2^e aussi long que le quart du scape; articles 4-5 linéaires, 6-12 insensiblement raccourcis et épaissis, en masse fusiforme. Thorax ovalaire; prothorax distinct, transversal; sillons mésothoraciques faiblement tracés; angles postérieurs du mésothorax élevés en tubercules avant le scutellum; celui-ci assez grand, triangulaire, les parapères bien déterminés; métathorax court, étroit, fortement strié en longueur. Ailes supérieures étroites, allongées, légèrement enfumées, plus claires au delà du milieu, et traversées par une fascie brunâtre courbée qui se compose de trois taches nébuleuses; cette fascie est précédée d'une autre semblable tache sur le bord antérieur; *ramus stigmaticus* arqué, sans renflement terminal distinct. Pattes entièrement d'un jaune d'ocre pâle; les tarses pentamères. Pétiole court, épais, striolé, inséré dans un prolongement du métathorax; le reste de l'abdomen lisse, luisant, pyriforme, rétréci insensiblement vers l'extrémité, qui est fort allongée et acuminée; le 2^e segment est de beaucoup le plus grand, occupant plus de la moitié de l'abdomen; les trois suivants sont très courts, annuliformes; le 6^e plus long, atténué en arrière,

testacé à l'extrémité, le 7^e encore plus allongé et atténué, couvrant par sa prolongation la base de la tarière, qui paraît sortir de l'extrémité même, mais, en réalité, elle prend naissance sous le ventre, du fond de la courte fente anale ; ce prolongement des segments apicaux est testacé, ainsi que la tarière et ses valves ; celle-ci sont noirâtres au sommet, raides, épaisses et hérissées, formant par leur réunion un fourreau solide où repose la tarière. — Mâle inconnu. — Colonia Tovar.

Le genre *Lelaps* [rectius (1) *Lælaps*] est peu connu ; il fut fondé par Haliday d'après une espèce provenue de l'île Saint-Vincent (Ann. and Mag. Nat. Hist., 1843, t. XII, p. 46). Une autre espèce est figurée par le même auteur dans l'« Entomologist », et encore par Walker, « Notes on Chalcidiæ », p. 74. Darwin rapporta cet Insecte des îles Galapagos, et la description se trouve « Monogr. Chalc. », t. II, p. 93, où, par quelque inexactitude, Walker l'a attribué à son genre *Merostenus*, dont il ne peut pas être ici question ; la même erreur a été copiée par Brullé, Lepel., Hym., IV, p. 592. Deux autres espèces de *Lelaps* me sont connues ; je les ai prises près de San-Fernando à la Trinidad, et j'avais l'intention de les publier ici, avec plusieurs autres Hyménoptères inédits, mais, en ce moment, le manque de loisir m'oblige de les renvoyer à une autre occasion.

Fam. PROCTOTRYPIDÆ.

68. ***Scelio venezuelensis*, n. sp.** — Pl. 4, fig. 4. — *Niger, subopacus; pedibus rufo-testaceis, coxis nigris; antennarum clava fusiformi, articulis a tertio inde sensim incrementibus; capite, pro- et mesothorace, cum scutello, crasse reticulatis; metathorace longitudinaliter cancellato. Alæ infumatæ, nervis (excepto ramo stigmatico) spuriis, hoc incrassato; abdomine quam caput et thorax multo longiore, regulariter striato, segmentorum marginibus posticis levibus.* — *Mas ignotus.* — ♀. Long. 4,6 mill.; alar. exp. 6 mill.

Noir ; pattes d'un testacé rougeâtre, hormis les hanches. Mandibules bidentées. Antennes insérées près de la bouche, un peu plus longues que la tête, de 12 articles ; scape épais, cylindrique, presque aussi long que le funicule ; 2^e article obconique, plus long et plus large que le 3^e ; les suivants sont insensiblement épaisse jusqu'à l'extrémité ; ils sont courts et assez serrés, constituant une massue allongée, fusiforme. Les deux ocelles postérieurs s'éloignent l'un de l'autre, étant situés près du bord interne des yeux. Thorax et scutellum élevés, couverts, comme

(1) Transcription du grec λαῖλαψ, ouragan, ou nom de chien de chasse.

la tête, d'une rugosité uniforme, réticulée ; sillons du mésothorax effacés ; métathorax court, déprimé, rebordé de chaque côté. Ailes enfumées, présentant le même système de nervures décolorées que les ailes des *Scelio* de l'Europe, avec le rameau stigmatical épaisse et chitineux. Tibias armés d'un seul éperon ; celui des tibias de devant est plus long que les autres et falqué. Abdomen beaucoup plus long que la tête et le thorax réunis ; il est sessile, un peu rétréci à la base, déprimé, convexe en dessous, pointu à l'extrémité, régulièrement strié en longueur, avec le bord postérieur des segments lisse ; le 1^{er} segment est court, rugueux, séparé du suivant par une suture profondément creusée, arquée et crénelée ; les sutures 2-4 sont aussi un peu crénelées, presque droites et bien marquées ; 2^e segment plus court que le 1^{er} ; 3^e et 4^e égaux, aussi longs que les deux premiers pris ensemble et bien plus larges qu'eux ; les suivants plus courts et plus étroits, diminuant insensiblement jusqu'à l'anus. — Mâle inconnu. — Caracas.

La collection de M. Simon possède cinq individus de cette espèce, lesquels sont tous du même sexe, et parfaitement semblables. Leur analogie avec un Insecte que je rencontrais jadis en Corse est si intime, qu'en les rangeant tous de côté, je ne puis signaler aucune différence, sinon que le scape des antennes chez l'exemplaire européen est en grande partie testacé, au lieu d'être noir. Quelques modifications dans les antennes et dans la largeur relative du premier segment de l'abdomen m'avaient tenté à proposer pour l'Insecte corse un nouveau genre, et il figure sous le nom de *Aleria flavibarbis* (Entom. Monthly Magazine, X, p. 208) ; si l'on était tenu à adopter rigoureusement le système de Förster, une telle coupe paraîtrait indispensable ; mais j'ai eu occasion de remarquer si souvent les inconvénients qui s'attachent à la multiplication démesurée des genres, que je préférerais, à l'heure qu'il est, supprimer mon genre *Aleria*, et considérer tous ces Insectes comme faisant partie de l'ancien genre *Scelio*.

69. Prosacantha bæiformis, n. sp. — Pl. 2, fig. 5, 5a. —
Nigra, parum nitida, capite et thorace confertim punctatis, abdomine concinne striolato. Antennæ testaceæ, clava nigra. Pedes testacei, coxis, femoribusque quatuor anterioribus, nigris. Alarum nervus costalis subcostalisque testacei. — Mas incognitus. — ♀. Long. 1 mill.; alar. exp. 2 mill.

Tête très grande, vue d'en haut transversale et courte, partout fortement ponctuée ; vertex aplati et assez large ; aucun vestige d'ocelles ; yeux relativement petits, ovalaires, après la mort blanchâtres. Antennes

dépassant un peu la hauteur de la tête, de 12 articles ; scape aussi long que les deux tiers du funicule, cylindrique, assez épais, un peu courbé ; 2^e article petit, obconique, un peu plus épais et aussi long que le 3^e ; le 4^e et suivants jusqu'au 7^e grossissent insensiblement ; les 5 derniers prennent un grossissement plus considérable, formant une massue allongée ; le dernier article est conique et pointu. Thorax subglobuleux ; prothorax caché ; mésothorax élevé, convexe, couvert de points oblongs, confus ; sillons mésothoraciques effacés. Pleures luisantes, profondément striées. Scutellum grand, aplati, déclive, arrondi en arrière, ayant le milieu du bord postérieur rebordé par une ligne luisante. Métathorax très court, fortement strié en longueur. Ailes antérieures présentant deux nervures, la costale et la sous-costale, lesquelles se réunissent avant le milieu de l'aile, en émettant un court rameau oblique ; on aperçoit aussi, sous un certain jour, l'ombre d'une 3^e nervure longitudinale, vers la base de l'aile. Abdomen largement sessile, déprimé, beaucoup moins haut que le mésonotum, un peu plus court et presque aussi large que le thorax, arrondi à l'extrémité, présentant en dessus 5 segments et l'extrême bout du 6^e ; tous les segments transversaux ; le 1^{er} profondément et régulièrement strié en longueur ; les stries n'atteignent ni la base ni l'extrémité, qui sont lisses et luisantes ; 2^e segment une fois et demie plus long que le 1^{er}, et régulièrement strié comme lui, mais les stries sont moins profondes ; elles n'atteignent pas le bord postérieur ; 3^e segment presque de même longueur que le 1^{er}, plus finement strié, et seulement vers la base ; les suivants sont plus courts, un peu scabreux ou ponctués dans le milieu. Tarière cachée. — Mâle inconnu. — Caracas.

C'est non sans regret que j'ai dû renoncer à la détermination des deux Insectes qui restent dans cette collection intéressante, savoir, d'un Ptéromalide et d'un Pompile ; mais situé, comme je le suis, à une distance des grandes collections et des bibliothèques, je n'ai pu rien découvrir à leur égard. Si je les avais décrits comme nouveaux, ce qui du reste serait facile, j'aurais peut-être augmenté le nombre des espèces contestables et inventé des noms exposés à faire double emploi.
