

## Nota sobre algunos Crisídidos de Siria

POR

D. RICARDO GARCÍA MERCET.

Entre los insectos recogidos por el Sr. Martínez de la Escalera durante la expedición que, en 1898, hizo al occidente de Asia, figura una serie de crisídidos que hoy forma parte de las colecciones de nuestro Museo de Historia natural y que, por este motivo, he tenido ocasión de estudiar y clasificar detenidamente.

La mayor parte de las especies que componen dicha serie eran conocidas y estaban citadas de la región en que las capturó el Sr. Escalera. Sin embargo, como entre ellas observo algunas particularidades que deben conocerse, comunicaré á la SOCIEDAD la lista completa de los insectos que constituyen aquella serie, contribuyendo así, siquiera sea de un modo modesto, al estudio de la interesante fauna de Siria.

Hé aquí, ahora, la relación de los crisídidos asiáticos á que estoy refiriéndome:

*Notozus productus* var. *vulgatus* Buys.—Localidad: Alexandretta.

*Ellampus politus* Buys.—Marache.

— *auratus* L. var. *abdominalis* Buys.—Alexandretta y Marache.

*Holopyga gloriosa* F. var. *amænula* Dth.—Marache. Esta variedad no estaba citada de Siria.

*H. ferrvida* F. var. *Buyssoni* var. nov.—Difiere esencialmente del tipo fabriciano por la puntuación gruesa, desigual y rugosa del abdomen, que también conserva el mismo carácter, excepto la rugosidad, en el tórax. La coloración del cuerpo se asemeja mucho á la del tipo, pero el área media del mesonoto es bronceado verdosa en su mitad posterior. Las mesopleuras son azulado verdosas, con una mancha dorada sobre todo el borde anterior. En los tarsos se observan tres uñas de la forma y disposición típicas. ♀.—Localidad: Alexandretta.

Dedico esta variedad al eminente entomólogo francés M. Roberto du Buysson, como testimonio de agradecimiento á las muchas deferencias que de él tengo recibidas desde que le

consulté algunas dudas y dificultades que me ha venido ofreciendo la revisión de los crisídidos de España en que actualmente estoy ocupándome.

El Sr. Buysson, á quien comuniqué esta variedad después de haberla estudiado, me manifiesta que es muy interesante, porque establece, dentro de la *H. fervida* F., el tipo de la *H. gloriosa* F. var. *punctatissima* Dah.

Este hecho, y otros de orden análogo, pero inverso, que he tenido ocasión de observar en la *H. gloriosa* F., tipo, demuestran que la puntuación no tiene en este grupo de insectos el carácter específico que se le venía dando. En efecto, la *H. punctatissima* Dah., que se conservaba en las monografías de crisídidos como especie buena, la considera ya el Sr. Buysson como una simple variedad de la *H. gloriosa* F.

*Hedychrum lucidulum* F.—Marache.

*Chrysis pustulosa* Ab. var. *orientalis* Buys., Akbés y Aghir.—Los ejemplares que han servido al Sr. Buysson para establecer esta variedad procedían de Jaffa.

*Ch. Joppensis* Buys.—Bimbogha Dahg.

*Ch. angustifrons* Ab.—Akbés.

*Ch. Leachi*, Shuck.—Marache.

*Ch. bidentata* L. var. *maculifrons* Buys, Marache.—Esta variedad no ha sido hasta ahora citada de Siria.

*Ch. splendidula* Dah. var. *asiatica* Mocs.—Akbés. Tampoco esta variedad estaba citada de Siria.

*Ch. mutabilis* Buys.—Marache y Akbés.

*Ch. incisa* Ab., Buys.—Akbés. El único ejemplar ♂ que figura en la serie en que estoy ocupándome, difiere de todos los demás de esta especie que he examinado por la puntuación gruesa de todo el cuerpo y ligeramente por la coloración, que es algo más dorada.

*Ch. Grohmanni* Dah. var. *singula* Rad. ♀ Akbés.—Esta bella variedad solo estaba citada por su autor, el general Radoszkowsky, como de la provincia transcaspiana.

La descripción se hizo sobre ejemplares ♀, como el capturado por el Sr. Escalera. El ♂ continúa siendo desconocido.

*Ch. Grohmanni* Dah. var. *Bolivari*, var. nov.—Menos robusta; más estrecha y alargada que el tipo; del que difiere, además, por la coloración verdosa de la cabeza y tórax, con un tinte amarillo dorado sobre el borde anterior del pronoto y el escu-

deté. El abdomen es también de color distinto, pues el primer segmento es verde, con dos manchas doradas á los lados; el segundo dorado anaranjado con una mancha triangular verde azulada que arranca de la base y ocupa el centro del anillo, en dos tercios de su extensión, y el tercero también dorado anaranjado con el borde apical azul verdoso. El vientre es de color verde dorado, con el segundo segmento manchado y bordeado de negro. La puntuación es más apretada, sobre el pronoto y mesonoto principalmente, que en la forma típica. Longitud 7 mm. ♂. Localidad: Marache.

Dedico esta variedad á mi antiguo maestro D. Ignacio Bolívar, á cuya gran ilustración y entusiasmo por las ciencias naturales se debe, indudablemente, el que no se haya perdido en España la afición á los estudios entomológicos.

**La *Santolina oblongifolia* B., de Sierras de Gredos, Béjar y Gata**

POR

D. MARCELO RIVAS MATEOS.

El acentuado polimorfismo que presenta la *Santolina oblongifolia* Boiss. hace que algunos ejemplares sean de difícil clasificación ó por lo menos se necesite para ello un atento estudio por parte del naturalista.

La mencionada especie es muy abundante en la Sierra de Gredos y más en las de Béjar y Gata; ordinariamente no sube á mucha altura y suele quedar formando rodales en los ribazos de las montañas, en sitios expuestos al Mediodía. Sin embargo de lo dicho, nosotros hemos recogido ejemplares en la Sierra de Gredos, un poco antes de llegar á la Laguna y á una altitud que no bajaría seguramente de 1.500 metros.

Los caracteres esenciales de la *Santolina oblongifolia* Boiss., son los siguientes: de dos decímetros á un metro de longitud, sufruticosa y muy ramificada; tallos ascendentes ó poco rastroeros, cubiertos en la mitad superior de un tomento blanquecino y sedoso. Hojas lineares y mucronadas las de los ramos floridos, oblongas y festonadas las de los estériles. Receptáculo hemisférico. Hojas del involucreo empizarradas y con tomento blanquecino. Aquenios tetrágonos, á veces de contorno triangular y desnudos.