

Eine neue Goldwespen-Art und -Varietät aus Deutschland,
beschrieben von Alexander Mocsáry in Budapest.

***Ellampus puncticollis* n. sp.**

Mediocris, elongatus, viridi-cyaneus vel cyaneus, parcerinereo-alboque pilosus; vertice post stellata, pro- et mesonoti disco, scutello postscutelloque plus minusve violascen- tibus; cavitate faciali profunda, laevi ac polita, viridi-aurata, lateribus faciei dense punctulato-coriaceis; temporibus subtus irregulariter subtiliterque subtransverse striatis; antennis tenuibus, nigro-fuscis, articulis duobus primis viridi-auratis, tertio proportionaliter brevi, quarto dimidio longiore, quarto quintoque simul sumptis breviore, genis brevibus, linearibus; fronte dense subtiliter, vertice post stellata sat sparsim valde leviter punctatis, pronoti disco punctis profundis sparsis, magnitudine inaequalibus interstitiisque laevibus, mesonoti lobo medio antice laevi ac polito postice lobisque lateralibus valde sparsim, illo sat profunde, his leviter, scutello crassius punctatis, postscutello gibbo-convexo punctato-reticulato; abdominis segmentis dorsalibus laete viridibus, splendidis, tertio viridi-subaurato, secundo disco macula magna aeneo-nigra notato, segmentis duobus primis subtilissime, haud visibiliter, valde sparsim, lateribus evidentius, tertio densius crassiusque punctulatis, hoc margine apicali tenuiter nigro-aeneo, centro sat profunde triangulariter exciso; ventre viridi-subaurato; femoribus tibiisque laete viridibus, tarsis fuscis; alis fortiter infumatis, iridescentibus, basi hyalinis, tegulis aeneo-nigris, laevibus. — ♂ ♀; long. 5 mm.

var. *atratus* mihi.

Stirpi magnitudine, sculptura coloreque ex parte similis; sed facie mesopleurisque aeneo viridibus, fronte, vertice, pronoto, mesonoto, scutello, postscutello, abdominis seg- mento primo dorsali secundoque maxima parte atro-aeneis.

Ellampo aeneo Panz. similis et affinis; sed pronoti disco punctis profundis sparsis magnitudine inaequalibus, mesonoti lobo medio postice lobisque lateralibus quoque valde sparsim punctatis, non vero his partibus laevibus; var. *atratus* vero coloreque ex parte atro-aeneo, distinctus.

Diese neue Art und Varietät wurde von Herrn Franz Sickmann bei Iburg, Provinz Hannover, im Juli und August, von den Blättern des Ribes rubrum et Vitis vinifera in zahl- reichen Exemplaren gesammelt und mir zur Beschreibung gütigst überlassen.