

CHRYSIDIDES INÉDITES

Par R. DU BUYSSON.

Cleptes Abeillei sp. nov.

♀. Corpore robusto ; capite, prothorace, mesothoracis dorsulo, scutello postscutelloque cupreo vel igneo-auratis splendidis ; antennarum scapo, pedibus tegulisque piceis plus minusve aterrimis ; alio sordidis, haud fasciatis ; pronoto postice serie punctorum transversa et secundum longitudinem in medio sulcato ; abdomine brevi ; abdominis primo secundoque segmentis testaceo-rufis, tertio et quarto aterrimis, tertio tantum antice testaceis maculis duabus ornato. — Long., 6-7 mill.

Corps robuste, entièrement couvert de poils noirs dispersés et dressés. Antennes noires à pubescence blanchâtre, 1^{er} article bleu, 3^e article long comme deux fois le 4^e, les 6 ou 8 derniers fortement déprimés en dessous dans le milieu qui est roussâtre. Tête grosse ; yeux grands, assez saillants, à pubescence moins sombre et plus serrée ; cavité faciale noir de poix, fortement et densément ponctuée, sillon longitudinal bien visible. Front, vertex, prothorax, dorsulum du mésothorax, écusson et plateforme du postécusson doré-fermé-métallique ; écusson et postécusson presque toujours avec une teinte cuivrée. Prothorax plus large que chez les *Cl. semiaurata*, *nitidula* et *Putoni*, ayant une ligne transversale de points à la base et au sommet, comme cela se voit chez le *Cl. semiaurata* ; de plus un sillon longitudinal très caractéristique part du milieu de la base et s'avance jusqu'à la marge antérieure. Ponctuation du prothorax et du postécusson assez serrée, celle du mésothorax et de l'écusson moins forte et plus espacée. Écailles noir roussâtre. Dessous de l'avant-corps, métathorax, cuisses et tibias entièrement bleu vif. Tarses roussâtres, les postérieurs plus sombres. Ailes enfumées, sans fascies apparentes. Abdomen court, ovale, peu déprimé, à ponctuation fine assez serrée ; bordure de chaque segment lisse comme chez les autres espèces ; 1^{er} et 2^e segment rouge testacé ; 3^e et 4^e noir très foncé et très brillant ; le 3^e porte deux taches rouge testacé sur ses côtés dans la partie antérieure. Oviscape roux pâle. — Long., 6-7 mill.

Espèce rappelant beaucoup le *Cl. semiaurata* L., mais en différant par son corps plus robuste, la forme de son prothorax, le sillon médian de ce dernier, par sa face entièrement noire ainsi que les antennes, le 1^{er} article excepté, par la ponctuation qui est plus forte et plus serrée, par son abdomen moins allongé, moins déprimé et enfin par les derniers articles des antennes qui sont fortement déprimés en dessous.

Je suis heureux de dédier cette espèce à l'auteur de l'excellent *Synopsis critique et synonymique des Chrysidés de France*. J'ai pris le *Cl. Abeillei* au nombre de trois exemplaires ♀, butinant sur des ombelles de *Pimpinella saxifraga* L. et de *Peucedanum cervaria* Lap., les premiers jours d'août 1886, dans les environs du Vernet (Allier).

Cleptes afra Luc.

Cette espèce étant peu connue et décrite d'une manière peu détaillée, on me saura peut-être gré d'une description complète.

♀. Corps de grande taille (9 mill.), assez robuste, entièrement couvert de longs poils blanchâtres, hérissés. Tête grosse, entièrement d'un noir assez brillant à reflets violets, une légère macule verte sur le vertex ; sillon longitudinal de la cavité faciale bien marqué ; ponctuation formée de points assez serrés et profonds. Yeux petits, peu saillants. Antennes fortes, noires, à pubescence blanchâtre ; 1^{er} et 2^e articles à reflets quelque peu violets comme sur la tête ; 3^e article deux fois aussi long que le 4^e, les 5 ou 6 derniers articles roussâtres en dessous. Prothorax doré-feu, simplement marginé antérieurement, ponctuation forte et profonde ainsi que sur le mesothorax. Ce dernier noir sombre, peu convexe. Écusson et postécusson noirs à reflets violacés, et à ponctuation moins profonde et plus espacée. Écailles et pattes brunâtres ; tarsi et tibias de la 1^{re} paire antérieure roux. Métathorax bleu ; mesosternum de même couleur mais avec quelques reflets verts ; angles du métathorax très obtus et courts. Ailes très enfumées, non fasciées, à cellule radiale plus allongée. Abdomen court, assez déprimé, ovale, rouge-testacé ; bord postérieur du 3^e segment noir, cette teinte atteignant à peine la moitié inférieure, un léger reflet feu-métallique est répandu sur presque tout ce segment mais principalement sur les côtés ; 4^e segment entièrement feu. Ponctuation abdominale fine, mais assez serrée. Les deux derniers segments du ventre sont noirs, les autres sont rouge-testacé. Oviscape noir très brillant.

Le mâle de cette magnifique espèce était jusqu'à présent inconnu. Nous en devons la découverte à M. E. Abeille de Perrin, qui en a pris

deux exemplaires à Nazareth, sur des euphorbes. La description de la ♀ a été faite sur un individu capturé à Caïffa (Syrie).

♂. Taille légèrement plus grande ; corps un peu plus allongé. Ponctuation de l'avant-corps un peu moins profonde ; antennes plus longues (caractère sexuel), 1^{er} et 2^e articles verts ; tête verte avec une teinte bleue sur le vertex ; prothorax, dorsulum du mésothorax et écailles vert vif ; côtés du mesosternum et métathorax bleus ; cuisses bleu verdâtre ; tibias des deux dernières paires de pattes avec des reflets verts, le reste comme chez la ♀. Abdomen plus allongé ; ponctuation plus forte ; deux premiers segments rouge testacé, les deux suivants noirs recouverts d'une teinte dorée, très vive sur le 4^e segment ; segment anal noir avec quelques reflets indigo. Les segments noirs du ventre portent chacun une tache, verte sur le 3^e et dorée sur le 4^e. Pubescence moins longue et sombre sur le dessus du corps.

Cleptes syriaca sp. nov.

Charmante petite espèce que M. E. Abeille de Perrin a rapportée de Nazareth.

♂. Corpore minore, elongatulo ; capite et antennarum scapo viridicyanescentibus ; thorace, sterno tegulisque cyaneis ; antennis piceis ; labro brevissimo, truncato, viridi-aureo ; capitis lateribus facialibus antice parallelo-elongatis ; prothorace angusto ; alis subhyalinis ; femoribus cyaneis, tibiis tarsisque fusco-brunneis, sed testaceis in pedibus anterioribus ; abdominis primo secundoque segmentis rufo-testaceis, tertio aterrimo lateribus maculis auratis, quarto violaceo aurato. — Long., 5 mill.

Cette espèce est voisine (du moins pour le sexe masculin) du *Cl. ignita* Fabr., dont elle diffère par sa petite taille, la forme étroite de son corps et de son prothorax, par la ponctuation formée de points plus enfoncés, son labre tronqué, très court, ses yeux moins saillants, ses joues avancées et parallèles, ce qui donne à sa face une forme rectangulaire. Elle diffère encore de l'espèce Fabricienne par ses ailes subhyalines, ses écailles franchement bleues, le 3^e article des antennes moins allongé et enfin par l'abdomen dont le 3^e segment est entièrement noir au lieu d'être roux-testacé au moins dans la moitié, et le 4^e segment qui est entièrement doré avec quelques reflets violets surtout au milieu.

J'ajouterai, pour compléter la description, que l'abdomen est ovale, légèrement déprimé, que les trois derniers segments du ventre sont noirs (cette couleur s'étendant un peu sur le suivant) et que les poils qui recouvrent le corps sont comme chez le *Cl. ignita* ♂ plus ou moins blanchâtres.
