

Gen. PYRACMON, Holmg. pp. 373 et 787.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante :

Pyracmon incomplet. *Pyracmon incompletum*, n. sp.

♀ - Long. .41 pec. Noir avec l'abdomen roux. Tête grosse, en carré, très épaisse ; les mandibules, le scape en dessous, les palpes, d'un roux blanchâtre sale. Antennes longues, brunes. Thorax assez court, gibbeux en avant, décline postérieurement, le métathorax strié transversalement sur sa face postérieure ; les écailles alaires noires. Ailes légèrement enfumées, les nervures et le stigma, noir, l'aréole avec la nervure postérieure effacée par des bulles d'air. Pattes rousses, y compris les hanches et les trochanters, les tarsi postérieurs brunâtres. Abdomen roux, poli, brillant, étroit, allongé, sans aucune tache, à pédicelle allongé et grêle, comprimé seulement à l'extrémité ; tarière à peine sortante, ses valves noires.—Ottawa (Guignard).

Espèce bien remarquable par son aréole incomplète.

Gen. PODOGASTER, Brull. p. 375.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Podogastre sillonné. *Podogaster sulcatus*, n. sp.

♀—Long. .40 pec. Roux varié de noir ; la tête très grosse, rappelant celle des Pyracmons. La face au dessous des antennes, les Jones, les mandibules, le scape en dessous, avec les 4 trochanters antérieurs, jaune-pâle, le reste de la tête roux avec une grande tache noire sur le vertex touchant les yeux et les antennes ; vertex très finement ponctué, creusé postérieurement. Antennes longues, roussâtres, noires à la base et brunes à l'extrémité. Le dos du métathorax, l'écusson avec le métathorax excepté à la base, roux, le reste noir y compris la poitrine, les flancs avec une grande bande rousse partant des écailles alaires et aboutissant aux hanches intermédiaires. L'écusson et le métathorax avec un petit sillon au milieu, le dernier tout couvert de petites alvéoles formées par des rides irrégulières et prolongé en pédicelle au dessus des hanches postérieures. Ailes hyalines, légèrement enfumées, avec les nervures noires, pâles à la base ; point d'aréole ; stigma roussâtre, très étroit ; cellule discoïdale contractée à la base. Pattes rousses, grêles, les postérieures longues, le premier

article de leurs tarsees aussi long que les suivants réunis; les hanches postérieures avec leurs trochanters et l'extrémité de leurs jambes, noir; les tarsees jaunes avec l'extrémité noire. Abdomen manquant, mais que nous avons tout lieu de croire roux varié de noir et comprimé fortement à l'extrémité.—Ottawa (Gnignard).

Ce bel insecte, malheureusement privé de son abdomen, se rapproche des *Pyracones* par sa grosse tête, mais ne porte pas d'aréole à ses ailes; son écusson sillonné le rapprocherait des *Porizon*, mais son métathorax pédiculé le range incontestablement parmi les *Podogastres*.

Gen. PORIZON, Fallen, p. 377.

Dans la description du genre, p. 377, ligne 2e, au lieu de: "les 2 nervures inférieures," il faut lire: *les 2 nervures antérieures*.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante:

4. Porizon allongé. *Porizon elongatum*, n. sp.

♂ ♀—Long. 29 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen d'un roux sombre. Antennes allongées, filiformes, brunes, roussâtres à la base en y comprenant le scape. Thorax peu allongé, assez robuste, le métathorax finement ponctué avec une petite aréole allongée sur le dos. Ailes hyalines, les nervures et le stigma noir, la nervure cubito-discoïdale s'unissant au radius sans laisser place à une nervure transverse pour diviser les 2 cellules cubitales. Hanches postérieures noires à la base. Abdomen grêle, allongé, à peine plus épais à l'extrémité, poli, brillant, d'un roux brunâtre, les 2 premiers segments noirs; tarière redressée, de la moitié de l'abdomen environ.—Bécancour, Cap Rouge.

Se distingue surtout du *rugosum* par son métathorax.

Gen. THERSILOCHUS, Holmg. pp. 379 et 789.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes:

Face postérieure du métathorax non entourée
d'une carène..... 1. *micans*.
Face postérieure du métathorax entourée d'une
carène;

Pattes et hanches jaune pâle uniforme..... 2. **pallipes**.
Hanches postérieures noires;

Écusson strié transversalement..... 3. **maturus**, n. sp.

Écusson non strié, à peine ponctué.. 4. **errabundus**, n. sp.

3. **Thersiloque mûr**. *Thersilochus maturus*, n. sp.

♀ — Long. 22 pcc. Noir foncé, avec les pattes roussâtres. Tête en carré, plus large que le prothorax, à face très finement ponctué. Antennes moyennes, filiformes, le scapo en dessous avec les mandibules, roussâtres. Thorax gros et court, le métathorax rugueux, arrondi. Ailes hyalines, sans aréole, ou plutôt avec une aréole manquant de ses nervures extérieures. Pattes d'un roux brumâtre sale, les 4 hanches postérieures noires. Abdomen ovale-oblong, poli, brillant, les segments 2 et 3 roux, le pédicule long; tarière de la longueur de l'abdomen, redressée.—Hull (Guignard).

Jolie espèce bien remarquable par sa coloration.

4. **Thersiloque errant**. *Thersilochus errabundus*, n. sp.

♀ — Long. 28 pcc. Noir avec l'abdomen roux. Tête grosse, en carré, la face très finement ponctué. Antennes longues, noires. Thorax déclive postérieurement, le métathorax à lignes soulevées bien distinctes, dessinant un petit sillon sur le dos, aréole manquant de ses nervures extérieures; le stigma grand et épais. Pattes rousses avec les hanches noires. Abdomen à pédicule grêle, assez large, comprimé à partir du 2^e segment, roux avec les premiers et les derniers segments noirs.—Ottawa (Harrington).

Espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. EXETASTES, Grav. pp. 333 et 794.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Exétaste à-ailes-fasciées. *Exetastes fascipennis*,
Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 275.

♀ — Long. 45 pcc. D'un beau roux clair dans toutes ses parties. Mandibules brunes à l'extrémité. Antennes longues, brunes avec un anneau pâle au milieu, le scapo roux en dessous. Thorax très finement ponctué, le métathorax avec une ligne brune au milieu; écusson soulevé, inerme, ses environs noirs. Ailes

hya
brun
gran
du c
les
tariè
brun
ailes

1(6)
2(4)
3(3)
4(1)
5(9)
6(12)
7(8)
8(7)
9(5)
10(11)
11(10)
12(6)
13(4)
14(23)
15(22)
16(21)
17(20)
18(19)
19(18)

hyalines jaunâtres avec l'extrémité enfumée et une autre bande brune à l'endroit du stigma et de l'aréole, celle-ci triangulaire, grande, la nervure cubito-discoïdale arquée. Pattes de la couleur du corps, sans aucune tache, les tarsi antérieurs plus longs que les jambes. Abdomen poli, brillant, contracté à l'extrémité, à tarière d'environ le quart de sa longueur, les valves de celle-ci brunes et plus à larges l'extrémité.—Ottawa (Guignard).

Cette belle espèce se distingue de toutes les autres par ses ailes tachées et l'anneau pâle de ses antennes.

Gen. MESOLEPTUS, Grav. pp. 394 et 704.

Aux 28 espèces décrites, ajoutez les 8 qui suivent :

- 1(69) Antennes grêles, filiformes, plus minces à l'extrémité;
 2(43) Thorax noir;
 3(34) Ecuison noir;
 4(13) Abdomen noir;
 5(9) Une aréole aux ailes;
 6(12) Antennes sans anneau pâle;
 7(8) Aréole pentagonale; tarière longue.... 1. *sericeus*, 395.
 8(7) Aréole triangulaire, tarière à peine sortante..... 29. *angustus*, *n. sp.*
 9(5) Point d'aréole aux ailes.
 10(11) Hanches et cuisses postérieures jaunes.. 2. *decens*, 396.
 11(10) Hanches et cuisses postérieures noires.. 30. *cinctipes*, *n. sp.*
 12(6) Antennes avec un anneau pâle 31. *perditus*, *n. sp.*
 13(4) Abdomen plus ou moins jaune ou roux;
 14(23) Antennes avec un anneau pâle;
 15(22) Poitrine noire;
 16(21) Face noire;
 17(20) Jambes postérieures noires; stigma noir.
 18(19) Hanches postérieures rousses; abdomen cylindrique 32. *rufomixtus*, *n. sp.*
 19(18) Hanches postérieures noires; abdomen filiforme..... 33. *filiformis*, *n. sp.*

- 20(17) Jambes postérieures rousses, noires à l'extrémité seulement; le stigma roussâtre..... 4. *annulatus*, 397. 41(4)
- 21(16) Face jaune-pâle, toutes les hanches noires. 3. *Moyeni*, 396. 45(5)
- 22(15) Poitrine jaune-pâle; le collier blanc. 2. *albopleuralis*, 397 46(5)
- 23(14) Antennes sans anneau pâle; 47(5)
- 24(33) Ailes avec une aréole; 48(4)
- 25(26) Abdomen noir avec une tache triangulaire jaune sur chaque segment.. 6. *triangularis*, 398. 49(4)
- 26(25) Abdomen roux, sans taches noires sur les côtés; 50(4)
- 27(28) Lobes latéraux du mésothorax tachés de jaune..... 7. *interruptus*, 398. 51(5)
- 28(27) Lobes latéraux du mésothorax sans taches; 52(5)
- 29(30) Face ♀ et ♂ blanche 8 *inceptus*, 399. 53(4)
- 30(29) Face ♀ noire; 54(5)
- 31(32) Aréole triangulaire, sessile; chaperon à pubescence argentée 34. *barbatus*, *n. sp.*
- 32(31) Aréole très petite, pédiculée; chaperon nu 35. *largus*, *n. sp.* 55(5)
- 33(24) Ailes sans aréole 9. *depressus*, 399 56, 45
- 34(3) Écusson jaune ou roux; abdomen ou rouge et noir, ou jaunâtre; 57(58)
- 58, 57
- 35(36) Antennes avec un anneau pâle; ♀ avec la face blanche..... 27. *variabilis*, 795. 59(62)
- 60(61)
- 36(35) Antennes sans anneau pâle; 61(60)
- 37(38) Face noire; tarière presque aussi longue que l'abdomen..... 10. *rufipes*, 399. 62(59)
- 38(37) Face blanche; tarière à peine sortante; 63(64)
- 39(40) Antennes entièrement noires, hauches noires..... 36. *nigricornis*, *n. sp.* 64, 63
- 40(39) Antennes plus ou moins jaunes ou rousses; 65(68)
- 41(42) Écusson roux; aréole triangulaire, oblique, pédiculée..... 13. *Laurentianus*, 401. 66(67)
- 42(41) Écusson et post-écusson, jaune-pâle; aréole subpédiculée..... 15. *flavicornis*, 401. 67(66)
- 43(2) Thorax plus ou moins taché de jaune, de blanc ou de roux; 68(65)

- 44(45) Thorax noir, taché de blanc ou de
jaune-pâle; abdomen noir, annelé de
blanc..... 11. **muliebris**, 400.
- 45(56) Thorax noir taché de roux;
- 46(53) Flancs noirs, sans taches;
- 47(50) Une aréole aux ailes;
- 48(49) Aréole pentagonale, les 4 pattes anté-
rieures blanches..... 27. **peregrinus**, 794.
- 49(48) Aréole triangulaire; pattes rousses.... 14. **lucens**, 401.
- 50(47) Ailes sans aréole;
- 51 52) Tête noire; métathorax sans taches.... 22. **lætus**, 404.
- 52(51) Tête plus ou moins rousse; métathorax.
souvent taché de roux..... 23. **fucatus**, 404.
- 53(46) Flancs plus ou moins roux;
- 54(55) Stigma jaunâtre, sans tache pâle; abdo-
men plus ou moins obscur à la base et
à l'extrémité..... 16. **rufulus**, 402.
- 55(54) Stigma brun, avec une tache pâle à la
base; abdomen roux, sans taches... 17. **discolor**, 402.
- 56 45) Thorax roux, quelquefois taché de noir;
- 57(58) Antennes avec un anneau pâle..... 12. **honestus**, 400.
- 58 57) Antennes sans anneau pâle;
- 59(62) Ailes sans aréole;
- 60(61) Métathorax à carènes distinctes; abdo-
men noir à l'extrémité..... 24. **erectus**, 404.
- 61(60) Métathorax à carènes oblitérées; abdo-
men sans taches..... 25. **uniformis**, 405.
- 62(59) Ailes avec une aréole;
- 63(64) Sutures du thorax noires..... 20. **seminiger**, 403.
- 64 63) Thorax entièrement roux;
- 65(68) Aréole sessile, triangulaire;
- 66(67) Abdomen fusiforme, rétréci aux 2 ex-
trémités..... 19. **concolor**, 403.
- 67 66) Abdomen claviforme, s'élargissant de la
base à l'extrémité..... 18. **unicolor**, 402.
- 68(65) Aréole longuement pédiculée, triangu-
laire, oblique..... 21. **canaliculatus**, 403.

69(1) Antennes renflées au delà du milieu.....26. *rhopalocerus*, 405.

29. Mésolepte étroit. *Mesoleptus angustus*, n. sp.

♂—Long. 30 péc. Noir avec les pattes rousses : la face, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, un point de chaque côté sur le vertex, les joues au-dessous des yeux, une tache en coin sur les lobes latéraux du mésothorax, les écailles alaires, une petite ligne en avant avec une autre au-dessous, blanc. La face avec une bande médiane noire dilatée vers le chaperon. Antennes longues, brun-foncé. Métathorax finement ponctué, avec une aréole longitudinale peu distincte sur le dos. Thorax court et robuste. Ailes hyalines, iridescentes, à nervures noires, stigma brun ; aréole très petite, en triangle avec la nervure extérieure à peine visible. Pattes rousses, les postérieures noires avec les hanches et la moitié basilaire des cuisses, roux. Abdomen noir, allongé, peu élargi vers le milieu, les segments médians avec la marge apicale obscurément roussâtre.

♀—A aréole des ailes plus grande ; la face, en outre des lignes orbitales, n'a que 2 points blancs au-dessous des antennes. Tarière à peine sortante.—Ottawa (Harrington).

30. Mésolepte à pieds-coints de-blanc. *Mesoleptus annulatipes*, n. sp.

♂—Long. 28 péc. Noir ; la face au dessous des antennes, les mandibules, l'extrémité des joues, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, une petite ligne en avant, une tache sur les lobes latéraux du mésothorax, les 4 hanches antérieures, tous les trochanters avec un large anneau aux tarses postérieurs, jaune-pâle. Antennes presque aussi longues que le corps, noires avec un anneau blanc au delà du milieu. Tête assez grosse, large, transversale. Métathorax avec lignes soulevées distinctes, formant une petite aréole en carré à la base. Ailes légèrement enfumées, les nervures noires, le stigma noir avec un point blanc à la base ; point d'aréole. Pattes noires, les jambes antérieures avec leurs tarses plus ou moins jaune-pâle, les tarses postérieurs avec les articles 2, 3 et 4 blancs. Abdomen déprimé, finement ponctué, le 1er segment rétréci à la base.—Sherbrooke.

L'anneau de ses antennes avec ses pattes noires le distinguent à première vue du *decens*.

Mésolepte égaré. *Mesoleptus perditus*, n. sp.

♂—Long. 40 pœ. Noir ou brun foncé; la face au-dessous des antennes, le labre, les mandibules, les lignes orbitales remontant jusque sur le vertex, les écailles alaires avec les 4 jambes antérieures et leurs tarsi, jaune-pâle. Antennes très longues, avec un large anneau pâle au-delà du milieu. Les lobes latéraux du mésothorax avec la pointe jaune en avant, le métathorax avec 2 petites carènes au milieu bordant un canal longitudinal très distinct. Toutes les hanches, les cuisses excepté à l'extrémité, avec les jambes postérieures excepté à la base, noir ou brun foncé; les cuisses antérieures jaunes en avant, les tarsi postérieurs noirs avec un petit anneau jaune à la base du premier article et les articles 3 et 4 blancs. Abdomen à pédicule long et grêle, subcylindrique dans le reste, noir, les segments terminaux à pubescence jaunâtre. Ailes hyalines, à aréole petite, en triangle irrégulier, sessile.—Ottawa (Guignard).

32. Mésolepte mêlé-de-roux. *Mesoleptus rufomixtus*, n. sp.

♀—Long. 32 pœ. Noir avec l'abdomen en partie roux. La face très finement ponctuée avec le bord du chaperon roussâtre. Antennes filiformes, noires, avec un bel anneau blanc au-delà du milieu. Thorax sans aucune tache, écusson proéminent, métathorax déclive, avec lignes soulevées distinctes formant une aréole étroite et allongée au milieu. Ailes hyalines, à nervures noires, l'aréole sessile, triangulaire, droite. Pattes brun-roussâtre, les deux antérieures plus pâles, tous les tarsi blancs avec l'extrémité noire, les hanches postérieures noires avec taches rousses en dessus et en dessous, leurs cuisses brunâtres et leurs jambes noires. Abdomen allongé, étroit, peu élargi postérieurement, noir avec les segments 3 et 4, la moitié apicale du 2^e et le sommet du premier d'un roux sale.

♂—Avec la face jaune, les mandibules blanches et les pattes d'un roux clair sans aucune tache; pour le reste semblable à la ♀.
—Ottawa (Harrington), Cap-Rouge.