

„Rovartani Lapok. XVII, 1910, p. 186.“


## Új hangya Új-Guineából.

Irta : SZABÓ JÓZSEF.

Daczára annak, hogy BIRÓ LAJOS új-guineai gyűjtéséből a hangyák legnagyobb részét már EMERY feldolgozta, mindamellettt akad még egy-egy új faj mint az alább leírt *Cryptopone*, melyet MOCSÁRY SÁNDOR nemzeti múzeumi igazgató-őr úr tiszteletére neveztem el.

### *Cryptopone Mocsáryi* SZABÓ n. sp. (fig.)

*Operaria* : Flava, paulo nitida, antennis, mandibulis pedibusque pallidioribus. Capite confertim, thorace abdomineque rarius punctatis. Corpore dense et brevissime pubescente, clypeo margine ciliato, abdomine postice piloso. Capite elongato, latitudine circiter quarta parte longiore, antrorsum aliquantum angustiore, postice truncato, angulis posticis rotundatis. Oculis minutis ad  $\frac{1}{5}$  longitudinis laterum



*Cryptopone Mocsáryi* n. sp. a latere et caput a fronte viso.  
(Az állat teste oldalról és feje elülről nézve).

capitis sitis. Mandibulis brevibus, apice dentibus tribus majoribus, posterioribus obtusis armatis. Antennarum scapo brevi, fere ad  $\frac{2}{3}$  partes longitudinis capitis extenso, funiculo basi tenui, articulis ante clavam quadriarticulatam et valde incrassatam brevissimis. Thorace dorso subrecto, pronoto rotundato, superne viso in regione suturae meso-epinotalis vix coarctato, sutura pro-mesonotali distincta, meso-epinotali obsoleta, angulo inter paginam basalem et declivem distincto, epinoti pagina paulo sinuosa. Petioli squama superne vix attenuata, paginis antica posticaque subparalellis. Abdominis segmentum postpetiolare antice leviter concavum. Long. 1—1.2 mm.

*Cr. tenui* Em. proxima, sed differt : corpore minore, antennarum scapo brevior, segmento postpetiolari antice leviter concavo.

Nova-Guinea : Friedrich-Wilhelmshafen. (Legit L. BIRÓ 1901 ; Coll. Mus. Nat. Hung.)