

STILBUM CALENS, Fabr., *Syst. Piez.*, p. 171, n° 4; Spinol, etc.

(Commun dans toute l'Afrique.)

PYRIA REICHERI, Spinola, *Ann. Soc. ent. de France*, t. VII, p. 448.

(Égypte, Sénégal, Abyssinie.)

CHRYSIS MIONII, Guér., *Rev. zool.*, 1844, p. 149.

(Sénégal et Abyssinie.)

FAMILLE DES HÉTÉROGYNES.

MYRMICE DU TIGRÉ. Pl. VII, F. 7.

MYRMICA TIGRENSIS.

M. nigra, capite thoraceque opacis, villosis, abdomine basi valde coarctato, postice lato, brevier ovali; alis hyalinis, costae leviter infuscata, stigmata fusca.

L. 0,0095; env. 0,019.

Noir, tête petite, finement rugueuse, comme le thorax, deux ocelles saillants au sommet de la tête; antennes d'un brun peu foncé, aussi longues que la tête et le thorax; ce dernier, un peu plus large que la tête et couvert comme elle d'une villosité d'un brun roussâtre assez serrée; mutique en arrière; écusson élevé, arrondi. Abdomen large, court, arrondi en avant et sur les côtés, pointu en arrière, lisse, d'un noir luisant, couvert de poils roux couchés, épars: les deux premiers noeuds aussi longs que l'abdomen, rugueux. Ailes hyalines très-faiblement enfoncées le long de la côte; stigmaté d'un brun pâle. Pattes d'un brun foncé, tibias antérieurs roussâtres.

Nous n'avons vu qu'un mâle très-mutilé de cette espèce, provenant d'Abyssinie, mais nous en avons reçu d'autres en bon état pris au Port-Natal.

PONÈRE D'ABYSSINIE. Pl. VII, F. 6.

PONERA ABYSSINICA.

P. elongata, atra, subnitida, pube grisea, brevis, dense oblecta, tenuissime punctulata, pilis longioribus sparsis hirsuta, abdomine brevis.

L. 0,014; l. 0,002.

Allongée, noire, assez brillante, mais couverte d'une pubescence grise, extrêmement courte, serrée et de poils hérissés, peu serrés : tout le corps est très-finement pointillé. Tête sensiblement rétrécie en arrière. Prothorax très-étroit, ayant en avant un faible sillon longitudinal. Corps de l'abdomen ovale, aussi arrondi en avant, très-décliné en arrière. Pattes assez longues, grêles, tarses postérieurs deux fois aussi longs que le tibia.

Cette espèce et notre *P. gagates* (*Leon. Reg. An.*, texte, p. 423) forment les seules espèces africaines, car nous croyons que M. de Saint-Fargeau s'est trompé en donnant le Sénégal pour patrie de la *P. tarsata*, que nous avons toujours reçue de Cayenne. Notre espèce d'Abyssinie diffère de la *gagates* par sa taille plus petite, sa forme plus allongée, sa surface unie, simplement pointillée et par la forme de l'abdomen, qui est court, arrondi en avant et non pas coupé brusquement.

MUTILLA DE BRUCE. Pl. VI, F. 8.

MUTILLA BRUCEI.

M. caput et thorax supra rufo-ferruginea, vixide rugosa, abdomen nigro-velutinum, maculis quatuor testaceo-flavis, setis (1, 2, 1); pilis longis nigris obiecta: subtrius cum pedibus nigra.

L. 0,009; l. 0,002.

Forme de la *M. macura*. Tête et thorax fortement rugueux, antennes épaisses d'un brun rougeâtre foncé; tête et thorax d'un ferrugineux rougeâtre, noirs en dessous. Abdomen ovale, rétréci aux deux bouts, d'un noir velouté, couvert de poils roides, couchés, semblables à des épines; quatre taches d'un jaune presque orangé, la première se prolongeant en avant sur le pédicule de l'abdomen; une de chaque côté au milieu, une avant l'extrémité; dessous de l'abdomen noir avec les bandes blanches aux derniers segments. Pattes noires; tarses foussetés; tout le corps couvert de poils roides, hérissés, assez longs, peu serrés.

DORYLUS NIGRICANS, Illig., *Mag. d'Ent.*, t. I, 1, 183, 18; Fab.,

Syst. ptes., p. 427, 2.

(De Guinée, du Sénégal et d'Abyssinie.)

FAMILLE DES FOUSSEURS.

SCOLIA NIGRITA, Fabr., *Ent. syst.*, t. II, p. 229, n° 3.

(Sénégal, Abyssinie, Natal, etc.)

SCOLIA NURICORNIS, Fabr., *Ent. syst.*, t. II, p. 230, n° 9.

(Sénégal et Abyssinie.)